



# EL SALVADOR

## Encuesta Nacional de Salud 2014

## Resultados principales

*Abril, 2015*



# TABLA DE CONTENIDOS

---

MICS NOMBRE DE LA ENCUESTA A PRIMERA VISTA	1
MORTALIDAD INFANTIL	2
NUTRICIÓN	3
SALUD INFANTIL	5
AGUA Y SANEAMIENTO	7
SALUD REPRODUCTIVA	8
DESARROLLO INFANTIL	10
ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN	11
PROTECCIÓN INFANTIL	12
VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL	14
ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/ COMUNICACIÓN	16
BIENESTAR SUBJETIVO	16
CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL	17
NOTAS	18

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), lanzada en El Salvador, como Encuesta Nacional de Salud fue llevada a cabo en 2014 por el Ministerio de Salud-Instituto Nacional de Salud (MINSAL-INS), en colaboración con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), como parte del programa global de MICS. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) brindó apoyo técnico. UNICEF y Banco Mundial, Banco Interamericano y Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo proporcionaron asistencia financiera.

UNICEF desarrolló en el decenio de 1990 el programa global de MICS, como programa internacional de encuestas de hogares para recopilar datos comparables internacionalmente de un amplio rango de indicadores sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres. Las encuestas MICS miden los principales indicadores que permiten que los países generen datos para su uso en políticas y programas y monitoreen el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros compromisos acordados internacionalmente. En El Salvador, se realizó la encuesta con el objetivo de monitorear las tendencias de los indicadores de salud y sus determinantes sociales, con énfasis en la salud de las niñas y los niños menores de 5 años y la salud sexual y reproductiva, a fin de retroalimentar las políticas públicas en el marco de la Reforma de Salud. El objetivo de este informe consiste en facilitar la difusión oportuna y el uso de los resultados de MICS-Encuesta Nacional de Salud antes de que se dé a conocer el contenido completo de las tablas y el informe final de la encuesta, que contendrá información detallada sobre todos los hallazgos de la encuesta según características demográficas, sociales, económicas y culturales. Se espera que el informe final de la encuesta se publique a más tardar en septiembre, 2015.

No cabe esperar cambios en los resultados presentados en este informe, por lo que se consideran definitivos. Para obtener más información sobre los indicadores y el análisis realizado en el informe final completo, puede visitar [mics.unicef.org](http://mics.unicef.org).

---

#### Referencia sugerida:

Ministerio de Salud – Instituto Nacional de Salud, DIGESTYC y UNICEF 2015. *Encuesta Nacional de Salud 2014 - Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014, Resultados Principales*. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud e Instituto Nacional de Salud.

# MICS ENCUESTA NACIONAL DE SALUD A PRIMERA VISTA

<b>Implementación de la encuesta</b>			
<b>Marco de la muestra</b>	Censos de Población 2007	<b>Cuestionarios</b>	Hogar
- Actualizado	Diciembre 2013 a Junio 2014		Mujeres (15-49 años de edad) Niños/as menores de cinco años
<b>Capacitación de los entrevistadores</b>	Febrero, 2014	<b>Trabajo de campo</b>	Marzo a Septiembre, 2014
<b>Marco de la muestra</b>			
Hogares		Niños/as menores de cinco	
- Muestreados	14,160	- Elegibles	7,716
- Ocupados	13,423	- Madres/ cuidadoras entrevistadas	7,340
- Entrevistados	12,507	- Tasa de respuesta (porcentaje)	95.1
- Tasa de respuesta (porcentaje)	93.2		
Mujeres			
- Elegibles para las entrevistas	14,865		
- Entrevistadas	13,350		
- Tasa de respuesta (porcentaje)	89.8		

<b>Población de la encuesta</b>			
Tamaño medio del hogar	3.9	<b>Porcentaje de población que vive en</b>	
<b>Porcentaje de población menor de:</b>		- Áreas urbanas	61.9
- 5 años de edad	8.8	- Áreas rurales	38.1
- 18 años de edad	34.8	- Occidente	21.0
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron al menos un nacido vivo en los 2 últimos años	13.7	- Central	21.1
		- Metropolitana	25.2
		- Para Central	12.8
		- Oriental	19.8

<b>Características de la vivienda</b>	
<b>Porcentaje de hogares con</b>	
- Electricidad	95.1
- Piso acabado	82.4
- Techo acabado	99.6
- Paredes acabadas	83.9
Número promedio de personas por habitación utilizadas para dormir	2.31

<b>Bienes personales o del hogar</b>	
<b>Porcentaje de hogares que poseen</b>	
- Un televisor	87.7
- Una refrigeradora (nevera)	69.0
- Tierra de uso agrícola	14.4
- Animales de granja/ganado	33.8
<b>Porcentaje de hogares en los que al menos un miembro tiene o posee</b>	
- Teléfono celular	93.1
- Auto o camioneta	20.6


# MORTALIDAD INFANTIL

## Mortalidad en la primera infancia

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor <sup>A</sup>
1.1	Tasa de mortalidad neonatal	Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.	11
1.2	<b>ODM 4.2</b> Tasa de mortalidad infantil	Probabilidad de morir antes de cumplir el primer año.	17
1.3	Tasa de mortalidad post-neonatal	Diferencia entre las tasas de mortalidad infantil y mortalidad neonatal.	6
1.4	Tasa de mortalidad de niños/as	Probabilidad de morir entre el primer y el quinto aniversario.	3
1.5	<b>ODM 4.1</b> Tasa de mortalidad de niños/as menores de 5 años	Probabilidad de morir entre el nacimiento y al cumplir el quinto año.	20

<sup>A</sup> Los valores del indicador son de 1.000 nacidos vivos y se refieren al periodo de cinco años anterior a la encuesta.

**Figura 1: Tasas de mortalidad en la primera infancia, Encuesta Nacional de Salud, 2014**




Nota: los valores del indicador corresponden a 1.000 nacidos vivos

# NUTRICIÓN

Estado nutricional <sup>i</sup>			
Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.1a 2.1b	ODM 1.8 Prevalencia de bajo peso (a) moderada y grave (b) grave	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que (a) están por debajo de menos dos desviaciones estándar (moderada y grave) (b) están por debajo de menos tres desviaciones estándar (grave) con respecto al peso mediano por la edad del estándar de la OMS.	5.0 0.9
2.2a 2.2b	Prevalencia de baja talla para la edad (a) moderada y grave (b) grave	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que (a) están por debajo de menos dos desviaciones estándar (moderada y grave) (b) están por debajo de menos tres desviaciones estándar (grave) con respecto a la altura mediana por la edad estándar de la OMS.	13.6 2.7
2.3a 2.3b	Prevalencia de emaciación (a) moderada y grave (b) grave	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que (a) están por debajo de menos dos desviaciones estándar (moderada y grave) (b) están por debajo de menos tres desviaciones estándar (grave) con respecto al peso mediano por la altura estándar de la OMS.	2.1 0.4
2.4	Prevalencia de sobrepeso	Número de niños/as menores de 5 años que están por encima de dos desviaciones estándar con respecto al peso mediano por la altura estándar de la OMS.	6.4

**Figura 2: Bajo peso, baja talla para la edad, emaciación y sobrepeso en niños/as menores de 5 años (moderada y grave), Encuesta Nacional de Salud, 2014**



## Alimentación de leche materna y alimentación de infantes

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.5	Niños que alguna vez fueron lactados	Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los 2 últimos años que lactaron en cualquier momento a su último hijo/a nacido vivo.	96.1
2.6	Iniciación temprana con alimentación de leche materna	Porcentaje de mujeres que tuvieron un nacido vivo dentro de los 2 últimos años y que lactaron al recién nacido dentro de la hora de haber nacido.	42.0
2.7	Lactancia exclusiva antes de los 6 meses	Porcentaje de infantes menores de 6 meses de edad que lactan exclusivamente <sup>ii</sup> .	46.7
2.8	Lactancia predominante en infantes menores de 6 meses	Porcentaje de infantes de menos de 6 meses que lactan como fuente predominante de alimentación durante el día anterior <sup>iii</sup> .	58.0
2.9	Lactancia continua hasta el 1er año de edad	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 15 meses alimentados con leche materna el día anterior.	74.1
2.10	Lactancia continua hasta los 2 años de edad	Porcentaje de niños/as de entre 20 y 23 meses alimentados con leche materna el día anterior.	57.0
2.11	Duración mediana de la lactancia	La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños/as de entre 0 y 35 meses no recibió leche materna durante el día anterior.	22.8
2.12	Lactancia materna apropiada para la edad	Porcentaje de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados apropiadamente durante el día anterior <sup>iv</sup> .	65.7
2.13	Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos	Porcentaje de infantes de entre 6 y 8 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior.	90.3
2.14	Frecuencia de alimentación con leche en niños/as que no reciben leche materna	Porcentaje de niños/as de entre 6 y 23 meses que no reciben lactancia materna y que recibieron al menos 2 tomas de leche durante el día anterior.	82.8
2.15	Frecuencia mínima de comidas	Porcentaje de niños/as de entre 6 y 23 meses que reciben alimentos sólidos, semisólidos y blandos (y niños/as no lactados que además son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces o más durante el día anterior.	86.4
2.16	Diversidad alimentaria mínima	Número de niños/as de 6 a 23 meses que recibieron alimentos de 4 o más grupos de alimentos durante el día anterior <sup>vi</sup> .	78.3
2.17a	Alimentación mínima aceptable	(a) Porcentaje de niños/as amamantados de 6 a 23 meses de edad que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior	67.3
2.17b		b) Porcentaje de niños/as no amamantados de 6 a 23 meses de edad que recibieron al menos 2 tomas de leche y que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima sin incluir alimentos lácteos y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior.	66.3
2.18	Alimentación con biberón	Porcentaje de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados con biberón durante el día anterior.	47.5


## Bajo peso al nacer

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.20	Recién nacidos con bajo peso al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2.500 gramos al nacer.	8.8
2.21	Recién nacidos pesados al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron pesados al nacer.	98.1

## SALUD INFANTIL

Vacunaciones			
Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.1	Cobertura de vacunación contra la tuberculosis	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la vacuna BCG antes de cumplir el primer año.	97.7
3.2	Cobertura de vacunación contra la polio	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna OPV (OPV3) antes de cumplir el primer año.	89.1
3.3 3.5 3.6	Cobertura de vacunación contra la difteria, la tos ferina y el tétanos (DPT) la hepatitis B (HepB) y la haemophilus influenzae tipo B (Hib) (Pentavalente)	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna Pentavalente antes de cumplir el primer año.	91.8
3.4	<b>ODM 4.3</b> Cobertura de vacunación contra el sarampión	Porcentaje de niños/as de entre 24 y 35 meses que recibieron la vacuna contra el sarampión antes de cumplir el segundo año.	96.1
3.8	Cobertura completa de vacunaciones	Porcentaje de niños/as de entre 24 y 35 meses que recibieron todas <sup>vii</sup> las vacunas recomendadas en el calendario nacional de vacunación antes de cumplir el primer año (contra el sarampión antes de cumplir el segundo año).	80.2

**Figura 3: Vacunaciones antes de cumplir 12 meses (contra el sarampión y refuerzo de neumococo antes de cumplir 24 meses), Encuesta Nacional de Salud, 2014**



## Tétanos toxoide

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.9	Protección contra el tétanos neonatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que recibieron al menos dos dosis de la vacuna toxoide contra el tétanos dentro del intervalo apropiado antes de dar a luz.	80.9

## Diarrea

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños/as con diarrea	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas.	13.3
3.10	Búsqueda de atención por diarrea	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en un centro de salud o proveedor.	62.9
3.11	Tratamiento de la diarrea con sobres de sales de rehidratación oral (SRO) y zinc	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron SRO y zinc.	25.2
3.12	Tratamiento de la diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y alimentación continuada	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron TRO (paquete de SRO, SRO líquido pre-ensado, líquidos recomendados elaborados en casa o líquidos incrementados) y alimentación continuada durante el episodio de diarrea.	72.2

## Síntomas de infecciones respiratorias agudas (IRA)

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños/as con síntomas de infecciones respiratorias agudas (IRA)	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de IRA en las 2 últimas semanas.	7.1
3.13	Búsqueda de atención para niños/as con síntomas de IRA	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de IRA en las 2 últimas semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en un centro de salud o por parte de un proveedor.	79.7
3.14	Tratamiento con antibióticos para niños/as con síntomas de IRA	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de IRA en las 2 últimas semanas que recibieron antibióticos.	42.3


## Uso de combustibles sólidos

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.15	Uso de combustibles sólidos para cocinar	Porcentaje de miembros del hogar en hogares que utilizan combustibles sólidos como fuente primaria de energía doméstica para cocinar.	23.1

## AGUA Y SANEAMIENTO

Agua y saneamiento				
Indicador de MICS	Indicador		Descripción	Valor
4.1	<b>ODM 7.8</b>	Uso de fuentes de agua mejoradas para beber	Porcentaje de miembros del hogar que usan fuentes mejoradas de agua para beber.	95.2
4.2		Tratamiento de agua	Porcentaje de integrantes del hogar que usan agua no mejorada para beber y que utilizan un método de tratamiento apropiado.	28.6
4.3	<b>ODM 7.9</b>	Uso de saneamiento mejorado	Porcentaje de integrantes del hogar que usan instalaciones de saneamiento mejoradas que no están compartidas.	77.0
4.4		Eliminación segura de las heces de los niños/as	Porcentaje de niños/as entre 0 y 2 años cuya última deposición se eliminó de manera segura.	41.8
4.5		Lugar para el lavado de manos	Número de hogares con un lugar específico para el lavado de manos donde se dispone de agua, jabón u otro agente para la limpieza.	91.3
4.6		Disponibilidad de jabón u otro agente para la limpieza	Porcentaje de hogares que tienen jabón u otro agente para la limpieza.	92.3

**Figura 4: Uso de agua y saneamiento mejorados en áreas urbanas y rurales, Encuesta Nacional de Salud, 2014**



## SALUD REPRODUCTIVA


### Anticoncepción y necesidad no satisfecha

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor	
-	Tasa global de fecundidad	Tasa global de fecundidad <sup>A</sup> de mujeres de entre 15 y 49 años de edad.	2.3	
5.1	<b>ODM 5.4</b>	Tasa de natalidad entre adolescentes	Tasa de fecundidad específica <sup>A</sup> en mujeres de entre 15 y 19 años para el año antes de la encuesta.	74
5.2		Embarazos en edad temprana	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que tuvieron al menos un nacido vivo antes de los 18 años.	18.2
5.3	<b>ODM 5.3</b>	Tasa de prevalencia de anticonceptivos	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo (moderno o tradicional).	71.9
5.4	<b>ODM 5.6</b>	Necesidad no satisfecha	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que actualmente están casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los nacimientos o limitar la cantidad de niños/as que tengan y que actualmente no usan anticonceptivos.	11.1

<sup>A</sup> La tasa de fecundidad específica para cada grupo de edad se define como el número de nacidos vivos en un grupo de edad específico durante un periodo de tiempo determinado, dividido por el número promedio de mujeres en ese grupo de edad durante el mismo lapso de tiempo, expresado por 1.000 mujeres. La tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años de edad se denomina también tasa de natalidad entre adolescentes.

La tasa global de fecundidad (TGF) se calcula sumando las tasas de fecundidad para cada grupo de edad calculadas para los cinco grupos de edad de mujeres desde los 15 hasta los 49 años. El TGF denota el número promedio de niños/as a los que una mujer habrá dado a luz al final de su edad reproductiva (a los 50 años de edad) si prevalecen las tasas actuales de fecundidad.

**Figura 5: Uso de anticonceptivos, Encuesta Nacional de Salud, 2014**



<b>Métodos modernos</b>	
Esterilización femenina	36.8
Esterilización masculina	0.3
DIU	2.2
Inyectables	19.8
Implantes	0.2
Píldora	4.2
Condón masculino	3.9
Condón femenino	0.0
Diafragma/espuma/lubricante	0.0
MELA	0.2
Otro modernos	0.2

<b>Métodos tradicionales</b>	
Abstinencia periódica	2.3
Retiro	1.7
Otro tradicionales	0.1

**Cualquier método** **71.9**

**Sin método** **28.1**

## Atención materna y del recién nacido

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor	
5.5a 5.5b	ODM 5.5 ODM 5.5	Cobertura de atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron atendidas durante su último nacido vivo (a) al menos una vez por alguna persona capacitada (b) al menos cuatro veces por algún proveedor.	96.1 90.1
5.6		Contenido de atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y a las cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras de orina y sangre durante el último embarazo que tuvo como resultado un nacido vivo.	94.8
5.7	ODM 5.2	Asistencia en el parto por alguna persona capacitada	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que fueron asistidas durante el alumbramiento de un nacido vivo por personal de salud capacitado.	97.7
5.8		Partos institucionales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo durante los 2 años anteriores a la encuesta y que dieron a luz en algún centro de salud.	97.5
5.9		Cesárea	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años cuyo último nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta nació por medio de una cesárea.	31.5

## Controles de salud post-natales

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor	
5.10		Estancia post-parto en un centro de salud	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que permanecieron en un centro de salud por 12 horas o más después del parto de su último nacido vivo en los últimos 2 años.	98.9
5.11		Chequeos post-natales para el recién nacido	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en casa después del parto, o un chequeo post-natal durante una visita dentro de los 2 días posteriores al nacimiento.	96.9
5.12		Chequeos post-natales para la madre	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en casa después del parto o un chequeo post-natal durante una visita dentro de los 2 días posteriores al nacimiento de su último nacido vivo en los 2 últimos años.	93.6


## DESARROLLO INFANTIL

<b>Desarrollo infantil</b>			
<b>Indicador de MICS</b>	<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
6.1	Asistencia a educación infantil temprana	Porcentaje de niños/as de entre 36 y 59 meses que asisten a un programa de educación infantil temprano.	24.8
6.2	Apoyo al aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad con los cuales algún adulto ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover su aprendizaje y prepararlos para la escuela.	59.2
6.3	Apoyo paterno para el aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad cuyo padre biológico ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	7.9
6.4	Apoyo materno para el aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad cuya madre biológica ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	39.9
6.5	Disponibilidad de libros infantiles	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen tres o más libros infantiles.	18.3
6.6	Disponibilidad de juguetes	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen dos o más juguetes.	61.6
6.7	Cuidado inadecuado	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que fueron dejados solos o al cuidado de otro niño/a de menos de 10 años de edad durante más de una hora al menos en la última semana.	3.5
6.8	Índice de desarrollo infantil temprano	Porcentaje de niños/as entre 36 y 59 meses que presentan un desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del aprendizaje.	81.0

## ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN

Alfabetización y educación <sup>viii</sup>			
Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
7.1	ODM 2.3	Tasa de alfabetización entre mujeres jóvenes	96.6
7.2		Preparación para la escuela	93.1
7.3		Tasa neta de ingreso escolar en educación primaria	90.5
7.4	ODM 2.1	Tasa de asistencia neta a la escuela primaria (ajustada)	95.8
7.5		Tasa de asistencia neta a la escuela secundaria (ajustada)	63.3
7.6	ODM 2.2	Niños/as que alcanzan el último grado de la escuela primaria	85.6
7.7		Tasa de terminación de primaria	98.2
7.8		Tasa de transición a la escuela secundaria	92.4
7.9	ODM 3.1	Índice de paridad de géneros (escuela primaria)	1.01
7.10	ODM 3.1	Índice de paridad de géneros (escuela secundaria)	1.03

**Figura 6: Indicadores de educación por género, Encuesta Nacional de Salud, 2014**



Nota: todos los valores de indicador constan en porcentajes

## PROTECCIÓN INFANTIL

### Registro del nacimiento

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.1	Registro de nacimiento	Porcentaje de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado.	98.5


### Trabajo infantil

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.2	Trabajo infantil	Porcentaje de niños/as de entre 5 y 17 años que realizan trabajo infantil <sup>ix</sup> .	19.3

### Disciplina del niño/a

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.3	Disciplina violenta	Porcentaje de niños/as de entre 1 y 14 años que experimentaron agresión psicológica o castigo físico durante el último mes anterior a la encuesta.	52.0

**Figura 7: Método de disciplina del niño/a, niños/as de edades comprendidas entre 1 y 14 años, Encuesta Nacional de Salud, 2014**



## Matrimonio temprano y poligamia

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.4	Matrimonio antes de los 15 años	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años de edad.	7.0
8.5	Matrimonio antes de los 18 años	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años de edad.	29.1
8.6	Jóvenes de entre 15 y 19 años que están actualmente casados o en unión	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 19 años actualmente casados o en unión.	21.0
8.7	Poligamia	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años en una unión polígama.	3.3
8.8a 8.8b	Diferencia de edad entre los esposos	Porcentaje de mujeres jóvenes actualmente casadas o en unión cuyos esposos son 10 años o más mayores que ellas. (a) en mujeres de entre 15 y 19 años (b) en mujeres de entre 20 y 24 años	15.0 18.3

## Actitudes hacia la violencia doméstica

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.12	Actitudes hacia la violencia doméstica	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que declaran que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue a la mujer en al menos una de las siguientes circunstancias: (1) sale sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3) discute con él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) quema la comida.	7.7

## Entorno familiar de los niños/as

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.13	Entorno familiar de los niños/as	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad que no viven con ninguno de los padres biológicos.	9.9
8.14	Prevalencia de niños/as con uno o ambos padres muertos	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con uno o ambos padres biológicos muertos.	5.5
8.15	Niños/as con al menos uno de los padres viviendo en el extranjero	Porcentaje de niños/as de 0-17 años de edad con al menos uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero.	11.7

## VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL

### Conocimientos y actitudes sobre el VIH/SIDA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Ha oído hablar del SIDA	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han oído hablar del SIDA.	98.7
9.1	<b>ODM 6.3</b> Conocimiento sobre la prevención del VIH entre los jóvenes	Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente dos formas de prevenir la transmisión sexual del VIH* y que rechazan las concepciones erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH <sup>xi</sup>	31.1
9.2	Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que identifican correctamente los tres medios de transmisión del VIH <sup>xii</sup> de madre a hijo.	60.0
9.3	Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que expresan aceptar actitudes para las cuatro preguntas <sup>xiii</sup> sobre las personas que viven con el VIH.	17.9

### Prueba del VIH

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.4	Personas que saben dónde hacerse la prueba del VIH	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que han declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del VIH.	88.6
9.5	Personas que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que se hicieron la prueba del VIH durante los 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado.	16.7
9.6	Jóvenes sexualmente activos que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido relaciones sexuales durante los 12 meses antes de la encuesta, que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado.	28.7
9.7	Consejería sobre el VIH durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan haber recibido asesoramiento sobre el VIH durante dichos cuidados.	51.7
9.8	Prueba del VIH durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan que se les ofreció y aceptaron hacerse una prueba del VIH durante la atención prenatal y que recibieron los resultados.	84.1

## Comportamiento sexual

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.9	Jóvenes que nunca han mantenido relaciones sexuales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que nunca se han casado/unido que nunca han mantenido relaciones sexuales.	69.8
9.10	Relaciones sexuales antes de los 15 años en personas jóvenes	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad.	10.6
9.11	Mezcla de edades de las parejas sexuales	Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta con un compañero que era 10 años o mayor.	14.6
9.12	Parejas sexuales múltiples	Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que mantuvieron relaciones sexuales con más de un compañero en los 12 últimos meses.	1.3
9.13	Uso del preservativo durante la relación sexual con varios compañeros sexuales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que informan haber tenido más de un compañero sexual en los 12 últimos meses y que también informan de haber usado un preservativo la última vez que mantuvieron relaciones sexuales.	23.1
9.14	Relaciones sexuales con parejas sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres sexualmente activos de entre 15 y 24 años que han mantenido relaciones sexuales con un compañero que no es su esposo/a o pareja habitual en los 12 últimos meses.	17.3
9.15	<b>ODM 6.2</b> Uso del preservativo con compañeros sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que informan haber usado un preservativo durante la relación sexual con su último compañero sexual que no era su esposo/a o pareja habitual, en los 12 últimos meses.	42.0

## Huérfanos

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.16	<b>ODM 6.4</b> Tasa de asistencia a la escuela por parte de huérfanos frente a la asistencia a la escuela por parte de niños no huérfanos	Proporción que asiste a la escuela entre niños/as de 10 a 14 años de edad que han perdido a ambos padres dividida por la proporción de los niños/as de 10 a 14 años de edad que asisten a la escuela y cuyos padres están vivos y que viven con uno de los padres o con ambos.	(*)

(\*) Cifra que se basan en menos de 25 casos no ponderados.

## ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

### Acceso a los medios de comunicación

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
10.1	Exposición a los medios de comunicación	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 49 años que, por lo menos una vez a la semana, leen un diario o revista, escuchan la radio y ven la televisión.	28.8

### Uso de tecnologías de la información/comunicación

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
10.2	Uso de computadoras	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 24 años que usaron una computadora durante los últimos 12 meses.	62.0
10.3	Uso de internet	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 24 años que usaron internet durante los últimos 12 meses.	66.7

## BIENESTAR SUBJETIVO

### Bienestar subjetivo

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
11.1	Satisfacción con la vida	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 24 años que están muy satisfechos o algo satisfechos con sus vidas en general.	95.1
11.2	Felicidad	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 24 años que son muy felices o algo felices.	90.6
11.3	Percepciones de una vida mejor	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 24 años cuyas vidas habían mejorado durante el último año, y que esperan que sus vidas mejorarán en un año.	43.8

## CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

### Consumo de tabaco

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
12.1	Consumo de tabaco	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 49 años que fumaron cigarrillos, o usaron un producto de tabaco fumable o sin humo un día o más durante el último mes.	1.6
12.2	Consumo de tabaco antes de los 15 años de edad	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 49 años que fumaron un cigarrillo entero antes de los 15 años de edad.	2.9

### Consumo de alcohol

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
12.3	Consumo de alcohol	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 49 años que consumieron al menos una bebida alcohólica un día o más durante el mes anterior a la encuesta.	5.4
12.4	Consumo de alcohol antes de los 15 años de edad	Porcentaje de mujeres de entre 15 a 49 años que consumieron al menos una bebida alcohólica antes de los 15 años de edad.	3.1

## NOTAS

---

- <sup>i</sup> Las mediciones de peso y de estatura/talla se completaron con éxito para el 93.9 y el 93.9 por ciento de los niños/as menores de 5 años, respectivamente.
- <sup>ii</sup> Infantes alimentados con leche materna y que no reciben ningún otro líquido o alimento, con excepción de solución oral rehidratante, vitaminas, suplementos minerales y medicamentos.
- <sup>iii</sup> Infantes que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de frutas, fluidos rituales, solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos), pero que no reciben nada más (en particular, leche de fórmula y fluidos a base de alimentos).
- <sup>iv</sup> Infantes de entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños/as de entre 6 y 23 meses que reciben leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos y blandos.
- <sup>v</sup> Niños/as lactantes: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, dos veces para los infantes de 6-8 meses de edad, y tres veces para los niños/as de 9-23 meses de edad. Niños/as que no estén siendo lactados: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, o alimentación con leche, cuatro veces para niños/as de 6 a 23 meses de edad.
- <sup>vi</sup> El indicador se basa en el consumo de cualquier cantidad de alimentos de al menos 4 de los siguientes 7 grupos de alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y frutos secos, 3) productos lácteos (leche, yogurt, queso), 4) alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado/ órganos de carnes), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en vitamina-A, y 7) otras frutas y verduras.
- <sup>vii</sup> La vacunación completa incluye lo siguiente: BCG, Polio 1, 2, 3, Pentavalente 1,2,3, Neumococo 1,2, Rotavirus 1, 2 antes de los 12 meses y Sarampión antes de los 24 meses.
- <sup>viii</sup> Los indicadores de educación, siempre que sean aplicables, se basan en información sobre asistencia escolar reportada (en cualquier momento a lo largo del año escolar) como proxy de matriculación.
- <sup>ix</sup> A los niños/as involucrados en el trabajo infantil se les define como los niños/as que participan en actividades económicas en o por encima de los umbrales específicos de la edad, niños/as que participan en las tareas del hogar en o por encima de los umbrales específicos para la edad, y niños/as involucrados en trabajos peligrosos.
- <sup>x</sup> El uso de condones y mantener relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada.
- <sup>xi</sup> Las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH se incluyen en el cálculo del indicador: i) Picadura de mosquito y ii) Compartir comida con alguien con SIDA.
- <sup>xii</sup> Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia.
- <sup>xiii</sup> Personas (1) que creen que a una maestra con el virus del SIDA se le debe permitir enseñar en una escuela, (2) que le comprarían verduras frescas al dueño de una tienda o a un vendedor que tiene es VIH-positivo, (3) que no querrían mantenerlo en secreto si un miembro de la familia es VIH-positivo, y (4) que estarían dispuestas a cuidar en su propia casa a un miembro de la familia con SIDA.