



# Cuba

## Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 2014

### Resultados principales

*Enero, 2015*



# TABLA DE CONTENIDOS

---

MICS ENCUESTA DE INDICADORES MÚLTIPLES POR CONGLOMERADOS A PRIMERA VISTA 1

NUTRICIÓN 2

SALUD INFANTIL 3

AGUA Y SANEAMIENTO 5

SALUD REPRODUCTIVA 6

DESARROLLO INFANTIL 8

PROTECCIÓN INFANTIL 9

VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL 11

CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL 13

NOTAS 14

La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés) fue llevada a cabo en el 2014 por la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública, en colaboración con UNICEF, como parte del programa global de MICS. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) brindó apoyo técnico y asistencia financiera.

UNICEF desarrolló en el decenio de 1990 el programa global de MICS, como programa internacional de encuestas de hogares para recopilar datos comparables internacionalmente de un amplio rango de indicadores sobre la situación de los niños, las niñas y las mujeres. Las encuestas MICS miden los principales indicadores que permiten que los países generen datos para su uso en políticas y programas y monitoreen el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y otros compromisos acordados internacionalmente.

Los objetivos específicos de Cuba con la aplicación de MICS5 son:

- Fortalecer las acciones nacionales de monitoreo y la base de evidencias acerca de la situación de infancia, la adolescencia y las mujeres.
- Incrementar el número de indicadores disponibles para reportar progresos en las metas de los ODM, con datos actualizados y desagregados.
- Mejorar la disponibilidad de líneas de base para la implementación del nuevo Plan de Acción de Programa de País acordado entre el gobierno de Cuba y UNICEF para el período 2014-2018.

El objetivo de este informe consiste en facilitar la difusión oportuna y el uso de los resultados de MICS Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados de Cuba antes de que se dé a conocer el contenido completo de las tablas y el informe final de la encuesta, que contendrá información detallada sobre todos los hallazgos según características demográficas, sociales, económicas y culturales. Se espera que el informe final de la encuesta se publique entre febrero y marzo de 2015.

No cabe esperar cambios en los resultados presentados en este informe, por lo que se consideran definitivos. Para obtener más información sobre los indicadores y el análisis realizado en el informe final completo, puede visitar [mics.unicef.org](http://mics.unicef.org) y [childinfo.org](http://childinfo.org).

---

Referencia sugerida:

Dirección de Registros Médicos y Estadísticas de Salud, Ministerio de Salud Pública. 2015. *Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2014, Resultados clave*. La Habana, Cuba: Ministerio de Salud.

# MICS ENCUESTA DE INDICADORES MÚLTIPLES POR CONGLOMERADOS A PRIMERA VISTA

<b>Implementación de la encuesta</b>			
<b>Marco de la muestra</b>	2013 y Población atendida por el Médico y la Enfermera de la Familia	<b>Cuestionarios</b>	Hogar Mujeres (15-49 años de edad) Hombres (15-49 años de edad) Niños/as menores de cinco años
- Actualizado	Mayo 2013		
<b>Capacitación de las entrevistadoras</b>	Diciembre, 2013	<b>Trabajo de campo</b>	Febrero-Septiembre 2014
<b>Marco de la muestra</b>		Niños/as menores de cinco	
Hogares		- Elegibles	5, 758
- Muestreados	9, 958	- Madres/ cuidadoras entrevistadas	5, 667
- Ocupados	9, 582	- Tasa de respuesta (porcentaje)	98.4
- Entrevistados	9, 494		
- Tasa de respuesta (porcentaje)	99.1		
<b>Mujeres</b>		<b>Hombres</b>	
- Elegibles para las entrevistas	9, 232	- Elegibles para las entrevistas	3, 837
- Entrevistadas	8, 995	- Entrevistados	3, 636
- Tasa de respuesta (porcentaje)	97.4	- Tasa de respuesta (porcentaje)	94.8

<b>Población de la encuesta</b>			
Tamaño medio del hogar	2.8	<b>Porcentaje de población que vive en</b>	
<b>Porcentaje de población menor de:</b>		- Áreas urbanas	78.2
- 5 años de edad	3.9	- Áreas rurales	21.8
- 18 años de edad	18.3	- Occidente	22.6
Porcentaje de mujeres de 15 a 49 años de edad que tuvieron al menos un nacido vivo en los 2 últimos años	7.1	- La Habana	20.0
		- Centro	25.8
		- Oriente	31.6

## NUTRICIÓN

Los datos sobre el estado nutricional a partir de medidas antropométricas están siendo analizados en mayor profundidad y serán presentados en el informe final.

Alimentación de leche materna y alimentación infantil			
Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.5	Niños que alguna vez fueron lactados	Porcentaje de mujeres con un nacido vivo en los 2 últimos años que lactaron en cualquier momento a su último hijo/a nacido vivo.	96.2
2.6	Iniciación temprana con alimentación de leche materna	Porcentaje de mujeres que tuvieron un nacido vivo dentro de los 2 últimos años y que lactaron al recién nacido dentro de la hora de haber nacido.	47.9
2.7	Lactancia exclusiva antes de los 6 meses	Porcentaje de infantes menores de 6 meses de edad que lactan exclusivamente <sup>i</sup> .	33.2
2.8	Lactancia predominante en infantes menores de 6 meses	Porcentaje de infantes de menos de 6 meses que lactan como fuente predominante de alimentación durante el día anterior <sup>ii</sup> .	39.3
2.9	Lactancia continua hasta el 1er año de edad	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 15 meses alimentados con leche materna el día anterior.	39.1
2.10	Lactancia continua hasta los 2 años de edad	Porcentaje de niños/as de entre 20 y 23 meses alimentados con leche materna el día anterior.	24.0
2.11	Duración mediana de la lactancia	La edad en meses en que el 50 por ciento de los niños/as de entre 0 y 35 meses no recibió leche materna durante el día anterior.	10.5
2.12	Lactancia materna apropiada para la edad	Porcentaje de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados apropiadamente durante el día anterior <sup>iii</sup> .	37.4
2.13	Introducción de alimentos sólidos, semisólidos o blandos	Porcentaje de infantes de entre 6 y 8 meses que recibieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior.	91.1
2.14	Frecuencia de alimentación con leche en niños/as que no reciben leche materna	Porcentaje de niños/as de entre 6 y 23 meses que no reciben lactancia materna y que recibieron al menos 2 tomas de leche durante el día anterior.	90.9
2.15	Frecuencia mínima de comidas	Porcentaje de niños/as de entre 6 y 23 meses que reciben alimentos sólidos, semisólidos y blandos (y niños/as no lactados que además son alimentados con leche) la cantidad mínima de veces o más durante el día anterior <sup>iv</sup> .	77.0
2.16	Diversidad alimentaria mínima	Número de niños/as de 6 a 23 meses que recibieron alimentos de 4 o más grupos de alimentos durante el día anterior <sup>v</sup> .	80.3
2.17a	Alimentación mínima aceptable	(a) Porcentaje de niños/as amamantados de 6 a 23 meses de edad que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior	49.7
2.17b		(b) Porcentaje de niños/as no amamantados de 6 a 23 meses de edad que recibieron al menos 2 tomas de leche y que tuvieron al menos la diversidad alimentaria mínima sin incluir alimentos lácteos y la frecuencia mínima de comidas durante el día anterior.	60.3
2.18	Alimentación con biberón	Porcentaje de niños/as de entre 0 y 23 meses que fueron alimentados con biberón durante el día anterior.	76.3


## Bajo peso al nacer

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
2.20	Infantes con bajo peso al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que pesaron menos de 2.500 gramos al nacer.	5.3
2.21	Infantes pesados al nacer	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron pesados al nacer.	98.6

# SALUD INFANTIL

Vacunaciones			
Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.1	Cobertura de vacunación contra la tuberculosis	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la vacuna BCG antes de cumplir el primer año.	99.6
3.2	Cobertura de vacunación contra la polio <sup>vi</sup>	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna OPV (OPV3) antes de cumplir el primer año.	60.8
3.3	Cobertura de vacunación contra la difteria, la tos ferina y el tétanos.	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna DPT (DPT3) antes de cumplir el primer año (incluye pentavalente).	96.8
3.4	<b>ODM 4.3</b> Cobertura de vacunación contra el sarampión	Porcentaje de niños/as de entre 24 - 35 meses que recibieron la vacuna contra el sarampión al cumplir los 12 meses de edad.	87.4
3.5	Cobertura de vacunación contra la hepatitis B.	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la hepatitis B (HepB3) antes de cumplir el primer año (incluye pentavalente).	96.6
3.6	Cobertura de vacunación contra la haemophilus influenzae tipo B (Hib)	Porcentaje de niños/as de entre 12 y 23 meses que recibieron la tercera dosis de la vacuna contra la Hib (Hib3) antes de cumplir el primer año (incluye pentavalente).	96.6
3.8	Cobertura de vacunaciones completa	Porcentaje de niños/as de entre 24 - 35 meses que recibieron todas <sup>vii</sup> las vacunas recomendadas en el calendario nacional de vacunación antes de cumplir el primer año (dos años para el sarampión)	49.9

**Figura 3: Vacunaciones a los doce meses (contra el sarampión, antes de cumplir los 24 meses), Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2014**



## Tétanos toxoide

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
3.9	Protección contra el tétanos neonatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que recibieron al menos dos dosis de la vacuna toxoide contra el tétanos dentro del intervalo apropiado antes de dar a luz.	88.7

## Diarrea

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños/as con diarrea	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas.	4.7
3.10	Búsqueda de atención por diarrea	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en un centro de salud o por parte de un profesional.	75.4
3.11	Tratamiento de la diarrea con sobres de sales de rehidratación oral (SRO) y zinc	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron SRO y zinc.	15.5
3.12	Tratamiento de la diarrea con terapia de rehidratación oral (TRO) y alimentación continuada	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con un episodio de diarrea en las 2 últimas semanas que recibieron TRO (paquete de SRO, SRO líquido pre-envasado, líquidos recomendados elaborados en casa o líquidos incrementados) y alimentación continuada durante el episodio de diarrea.	52.9

## Síntomas de infecciones respiratorias agudas (ARI)

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños/as con síntomas de infecciones respiratorias agudas (ARI, por sus siglas en inglés)	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de ARI en las 2 últimas semanas.	3.2
3.13	Búsqueda de atención para niños/as con síntomas de ARI	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de ARI en las 2 últimas semanas para cuyos casos se buscó consejo o tratamiento en un centro de salud o por parte de un profesional.	92.6
3.14	Tratamiento con antibióticos para niños/as con síntomas de ARI	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con síntomas de ARI en las 2 últimas semanas que recibieron antibióticos.	62.9


## Fiebre

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Niños/as con fiebre	Porcentaje de niños/as menores de cinco años con fiebre en las 2 últimas semanas.	10.3
3.20	Búsqueda de atención por fiebre	Porcentaje de niños/as menores de 5 años con fiebre en las 2 semanas anteriores y para los que se solicitó orientación o tratamiento de un centro de salud o de un profesional.	92.9

## AGUA Y SANEAMIENTO

Agua y saneamiento			
Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
4.1	<b>ODM 7.8</b>	Uso de fuentes de agua mejoradas para beber	94.2
4.2		Tratamiento de agua	57.3
4.3	<b>ODM 7.9</b>	Uso de saneamiento mejorado	90.7
4.4		Eliminación segura de las heces de los niños/as	87.7
4.5		Lugar para el lavado de manos	85.2
4.6		Disponibilidad de jabón u otro agente para la limpieza	95.5

**Figura 4: Uso de agua y saneamiento mejorados en áreas urbanas y rurales, Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2014**




## SALUD REPRODUCTIVA

### Anticoncepción y necesidad no satisfecha

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
5.2	Embarazos en edad temprana	Porcentaje de mujeres de entre 20 y 24 años que tuvieron al menos un nacido vivo antes de los 18 años.	5.6
5.3	<b>ODM 5.3</b> Tasa de prevalencia de anticonceptivos	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años actualmente casadas o en unión que usan (o que sus parejas usan) algún método anticonceptivo (moderno o tradicional).	73.7
5.4	<b>ODM 5.6</b> Necesidad no satisfecha	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que actualmente están casadas o en unión, en edad fértil y que desean espaciar los nacimientos o limitar la cantidad de niños/as que tengan y que actualmente no usan anticonceptivos.	8.0

**Figura 5: Uso de anticonceptivos, Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2014**



## Atención materna y del recién nacido

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor	
5.5a	ODM 5.5	Cobertura de atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años con un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta que fueron atendidas durante su último nacido vivo (a) al menos una vez por alguna persona capacitada (b) al menos cuatro veces por algún proveedor.	
5.5b	ODM 5.5			98.5 97.8
5.6		Contenido de atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y a las cuales se les midió la presión arterial y se les tomó muestras de orina y sangre durante el último embarazo que tuvo como resultado un nacido vivo.	98.1
5.7	ODM 5.2	Asistencia en el parto por alguna persona capacitada	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta y que fueron asistidas durante el alumbramiento de un nacido vivo por personal de salud capacitado.	99.4
5.8		Partos institucionales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que tuvieron un nacido vivo durante los 2 años anteriores a la encuesta y que dieron a luz en algún centro de salud.	99.0
5.9		Cesárea	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años cuyo último nacido vivo en los 2 años anteriores a la encuesta nació por medio de una cesárea.	40.4

## Controles de salud post-natales

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor	
5.10		Estancia post-parto en un centro de salud	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que permanecieron en un centro de salud por 12 horas o más después del parto de su último nacido vivo en los últimos 2 años.	97.0
5.11		Chequeos post-natales para el recién nacido	Porcentaje de los últimos nacidos vivos en los 2 años anteriores a la encuesta que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en casa después del parto, o un chequeo post-natal durante una visita dentro de los 2 días posteriores al nacimiento.	98.4
5.12		Chequeos post-natales para la madre	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que recibieron un chequeo mientras estuvieron en un centro de salud o en casa después del parto o un chequeo post-natal durante una visita dentro de los 2 días posteriores al nacimiento de su último nacido vivo en los 2 últimos años.	99.2

## DESARROLLO INFANTIL

<b>Desarrollo infantil</b>			
<b>Indicador de MICS</b>	<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
6.1	Asistencia a educación infantil temprana	Porcentaje de niños/as de entre 36 y 59 meses que asisten a un programa de educación infantil temprano.	75.9
6.2	Apoyo al aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad con los cuales algún adulto ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover su aprendizaje y prepararlos para la escuela.	89.2
6.3	Apoyo paterno para el aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad cuyo padre biológico ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	17.9
6.4	Apoyo materno para el aprendizaje	Porcentaje de niños/as de 36 a 59 meses de edad cuya madre biológica ha realizado en los últimos 3 días cuatro o más actividades para promover el aprendizaje y prepararlos para la escuela.	75.9
6.5	Disponibilidad de libros infantiles	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen tres o más libros infantiles.	48.2
6.6	Disponibilidad de juguetes	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que tienen dos o más juguetes.	78.3
6.7	Cuidado inadecuado	Porcentaje de niños/as menores de 5 años que fueron dejados solos o al cuidado de otro niño/a de menos de 10 años de edad durante más de una hora al menos en la última semana.	4.1
6.8	Índice de desarrollo infantil temprano	Porcentaje de niños/as entre 36 y 59 meses que presentan un desarrollo adecuado en al menos tres de los siguientes cuatro ámbitos: alfabetismo-aptitud numérico, físico, socio-emocional y dominio del aprendizaje.	88.8

## PROTECCIÓN INFANTIL


### Registro del nacimiento

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.1	Registro de nacimiento	Porcentaje de niños/as menores de 5 años cuyo nacimiento se reportó como registrado.	100.0

### Disciplina del niño/a

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.3	Disciplina violenta	Porcentaje de niños/as de entre 1 y 14 años que experimentaron agresión psicológica o castigo físico durante el último mes anterior a la encuesta.	36.0

**Figura 7: Método de disciplina del niño/a, niños/as de edades comprendidas entre 1 y 14 años, Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados, 2014**



## Matrimonio temprano

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.4	Matrimonio antes de los 15 años	Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 15 años de edad.	
		(a) mujeres	5.7
		(b) hombres	1.7
		Porcentaje de personas de entre 20 y 49 años que se casaron o unieron por primera vez antes de los 18 años de edad.	
8.5	Matrimonio antes de los 18 años	(a) mujeres	31.2
		(b) hombres	13.1
8.6	Jóvenes de entre 15 y 19 años que están actualmente casados o en unión	Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 19 años actualmente casados o en unión.	
		(a) mujeres	15.8
8.8a	Diferencia de edad entre los esposos	(b) hombres	6.7
		Porcentaje de mujeres jóvenes actualmente casadas o en unión cuyos esposos son 10 años o más mayores que ellas.	
8.8b		(a) en mujeres de entre 15 y 19 años	24.1
		(b) en mujeres de entre 20 y 24 años	19.2

## Actitudes hacia la violencia doméstica

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Actitudes hacia la violencia doméstica, Cuba <sup>viii</sup>	Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que declaran que está justificado que el esposo/pareja golpee o pegue a la mujer en al menos una de las siguientes circunstancias: (1) llega tarde sin avisarle, (2) descuida a los niños/as, (3) discute con él, (4) rehúsa mantener relaciones sexuales con él, (5) si él no se siente atendido (6) Si le es infiel.	
		(a) mujeres	3.9
		(b) hombres	6.9

## Entorno Familiar

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
8.13	Entorno familiar de los niños/as	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad que no viven con ninguno de los padres biológicos.	5.5
8.14	Prevalencia de niños/as con uno o ambos padres muertos	Porcentaje de niños/as de 0 a 17 años de edad con uno o ambos padres biológicos muertos.	2.6
8.15	Niños/as con al menos uno de los padres viviendo en el extranjero	Porcentaje de niños/as de 0-17 años de edad con al menos uno de los padres biológicos viviendo en el extranjero.	2.9

## VIH/SIDA Y COMPORTAMIENTO SEXUAL

### Conocimientos y actitudes sobre el VIH/SIDA

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
-	Ha oído hablar del SIDA	Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que han oído hablar del SIDA. (a) mujeres (b) hombres	99.4 99.5
9.1	<b>ODM 6.3</b> Conocimiento sobre la prevención del VIH entre los jóvenes	Porcentaje de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente dos formas de prevenir la transmisión sexual del VIH <sup>x</sup> y que rechazan las concepciones erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH <sup>x</sup> . (a) mujeres (b) hombres	60.9 58.6
9.2	Conocimiento sobre la transmisión del VIH de madre a hijo	Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que identifican correctamente los tres medios de transmisión del VIH <sup>xi</sup> de madre a hijo. (a) mujeres (b) hombres	60.7 48.3
9.3	Actitudes de aceptación hacia las personas que viven con el VIH	Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que expresan aceptar actitudes para las cuatro preguntas <sup>xii</sup> sobre las personas que viven con el VIH. (a) mujeres (b) hombres	42.9 42.6

### Prueba del VIH

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
9.4	Personas que saben dónde hacerse la prueba del VIH	Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años que han declarado tener conocimiento de un lugar para la prueba del VIH. (a) mujeres (b) hombres	97.3 96.1
9.5	Personas que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados	Porcentaje de personas de entre 15 y 49 años de edad que se hicieron la prueba del VIH durante los 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado. (a) mujeres (b) hombres	26.0 25.4
9.6	Jóvenes sexualmente activos que se hicieron la prueba del VIH y conocen los resultados	Porcentaje de mujeres entre 15 y 24 años que han mantenido relaciones sexuales durante los 12 meses antes de la encuesta, que se hicieron la prueba del VIH durante los últimos 12 meses anteriores a la encuesta y que conocen el resultado	32.2
9.7	Consejería sobre el VIH durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan haber recibido asesoramiento sobre el VIH durante dichos cuidados.	77.9
9.8	Prueba del HIV durante la atención prenatal	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que dieron a luz en los 2 años anteriores a la encuesta y recibieron cuidados prenatales y que informan que se les ofreció y aceptaron hacerse una prueba del VIH durante la atención prenatal y que recibieron los resultados.	89.4

<b>Comportamiento sexual</b>			
<b>Indicador de MICS</b>	<b>Indicador</b>	<b>Descripción</b>	<b>Valor</b>
9.9	Jóvenes que nunca han mantenido relaciones sexuales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que nunca han mantenido relaciones sexuales.	32.6
9.10	Relaciones sexuales antes de los 15 años en personas jóvenes	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales antes de los 15 años de edad.	10.8
9.11	Mezcla de edades de las parejas sexuales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que mantuvieron relaciones sexuales en los 12 meses anteriores a la encuesta con un compañero que era 10 años o más mayor.	15.5
9.12	Parejas sexuales múltiples	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que mantuvieron relaciones sexuales con más de un compañero en los 12 últimos meses.	4.6
9.13	Uso del preservativo durante la relación sexual con varios compañeros sexuales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años que informan haber tenido más de un compañero sexual en los 12 últimos meses y que también informan de haber usado un preservativo la última vez que mantuvieron relaciones sexuales.	52.0
9.14	Relaciones sexuales con parejas sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres sexualmente activos de entre 15 y 24 años que han mantenido relaciones sexuales con un compañero que no es su esposo/a o pareja habitual en los 12 últimos meses.	48.6
9.15	<b>ODM 6.2</b> Uso del preservativo con compañeros sexuales ocasionales	Porcentaje de mujeres de entre 15 y 24 años que informan haber usado un preservativo durante la relación sexual con su último compañero sexual que no era su esposo/a o pareja habitual, en los 12 últimos meses.	79.6

## CONSUMO DE TABACO Y ALCOHOL

### Consumo de tabaco

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
12.1	Consumo de tabaco	Porcentaje de personas de entre 15 a 49 años que fumaron cigarrillos, o usaron un producto de tabaco fumable o sin humo un día o más durante el último mes.	
		(a) mujeres	11.1
		(b) hombres	27.2
12.2	Consumo de tabaco antes de los 15 años de edad	Porcentaje de personas de entre 15 a 49 años que fumaron un cigarrillo entero antes de los 15 años de edad.	
		(a) mujeres	2.9
		(b) hombres	7.5

### Consumo de alcohol

Indicador de MICS	Indicador	Descripción	Valor
12.3	Consumo de alcohol	Porcentaje de personas de entre 15 a 49 años que consumieron al menos una bebida alcohólica un día o más durante el mes anterior a la encuesta.	
		(a) mujeres	19.2
		(b) hombres	46.5
12.4	Consumo de alcohol antes de los 15 años de edad	Porcentaje de personas de entre 15 a 49 años que consumieron al menos una bebida alcohólica antes de los 15 años de edad.	
		(a) mujeres	3.4
		(b) hombres	11.4

## NOTAS

---

<sup>i</sup> Infantes alimentados con leche materna y que no reciben ningún otro líquido o alimento, con excepción de solución oral rehidratante, vitaminas, suplementos minerales y medicamentos.

<sup>ii</sup> Infantes que reciben leche materna y ciertos líquidos (agua y bebidas a base de agua, jugos de frutas, fluidos rituales, solución oral rehidratante, gotas, vitaminas, minerales y medicamentos), pero que no reciben nada más (en particular, leche de fórmula y fluidos a base de alimentos).

<sup>iii</sup> Infantes de entre 0 y 5 meses que reciben exclusivamente leche materna, y niños/as de entre 6 y 23 meses que reciben leche materna y que comieron alimentos sólidos, semi-sólidos y blandos.

<sup>iv</sup> Niños/as lactantes: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, dos veces para los infantes de 6-8 meses de edad, y tres veces para los niños/as de 9-23 meses de edad. Niños/as que no estén siendo lactados: alimentos sólidos, semi-sólidos o blandos, o alimentación con leche, cuatro veces para niños/as de 6 a 23 meses de edad.

<sup>v</sup> El indicador se basa en el consumo de cualquier cantidad de alimentos de al menos 4 de los siguientes 7 grupos de alimentos: 1) granos, raíces y tubérculos, 2) legumbres y frutos secos, 3) productos lácteos (leche, yogurt, queso), 4) alimentos de carne (carne, pescado, aves de corral e hígado/ órganos de carnes), 5) huevos, 6) verduras y frutas ricas en vitamina-A, y 7) otras frutas y verduras.

<sup>vi</sup> En Cuba la inmunización contra la polio se realiza por campañas anuales (durante una semana en marzo y otra en abril) para niños a partir de 30 días de nacidos. El indicador para Cuba hace referencia a las dos dosis de la campaña del año 2013 en niños de 12 a 23 meses.

<sup>vii</sup> La vacunación completa incluye lo siguiente: BCG, Hep B al nacer, Pentavalente 3, Am-BC 2, Polio 2 antes de los 12 meses y sarampión antes de cumplir el segundo año. Los niños/as cuyas madres son positivas al virus de la hepatitis b son vacunados con DPT, Hib y Hep B en lugar de la Pentavalente, es por esto que en las tablas se muestran las vacunas simples en lugar de la Pentavalente.

<sup>viii</sup> Indicador personalizado para Cuba. Incluye las categorías 1 a la 4 del cuestionario estándar de MICS 5, reemplaza la categoría (5) de MICS "si ella quema la comida" por la de: "él no se siente atendido", e incluye la categoría (6): si le es infiel.

<sup>ix</sup> El uso de condones y mantener relaciones sexuales con una pareja fiel y no infectada.

<sup>x</sup> Las dos ideas erróneas más comunes sobre la transmisión del VIH se incluyen en el cálculo del indicador: i) Picadura de mosquito y ii) Compartir comida con alguien con VIH.

<sup>xi</sup> Transmisión durante el embarazo, durante el parto y durante la lactancia.

<sup>xii</sup> Personas (1) que creen que a una maestra con el virus del SIDA se le debe permitir enseñar en una escuela, (2) que le comprarían verduras frescas al dueño de una tienda o a un vendedor que tiene el virus del SIDA, (3) que no querrían mantenerlo en secreto si se infecta un miembro de la familia con el virus del SIDA, y (4) que estarían dispuestas a cuidar de un miembro de la familia que se enferme por causa del virus del SIDA.