

**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

# **Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil: 1998**

## **ENSMI-98**

### **Informe Final**

### **Noviembre de 1999**



# PARAGUAY

Centro Paraguayo de Estudios de Población  
CEPEP

## **ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MATERNO INFANTIL 1998 ENSMI-98**

Centers For Disease Control and Prevention (CDC)  
Atlanta, Georgia  
United States Agency for International Development (USAID)

Noviembre de 1999  
Asunción, Paraguay

Toda reproducción total o parcial de esta publicación podrá ser hecha por cualquier persona o institución siempre que se cite la fuente:

**CEPEP: Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil 1998**, o abreviado, **CEPEP: ENSMI/98**.

Centro Paraguayo de Estudios de Población: Juan E. O'Leary y Manduvirá, Edificio El Dorado, Piso 8.  
Asunción-Paraguay. Teléfono: 497503. Fax:444842.  
E-Mail: [cepep@pla.net.py](mailto:cepep@pla.net.py)

# **CEPEP**

## **CONSEJO DIRECTIVO**

Ing. Raúl Hoeckle, *Presidente*  
Dr. Victor Raúl Romero, *Vice-Presidente*  
Dr. Agustín Carrizosa, *Tesorero*  
Lic. Macarena Valdes de Jaeggli, *Secretaria*

*Miembros titulares*  
Dra. Raquel Candia de Horvath  
Dr. Rubén Da Silva Mello  
Ing. Carlos Peralta

Dra. Cynthia Prieto Conti, *Directora Ejecutiva*

## **PERSONAL DE LA ENCUESTA**

María Mercedes Melián, *Directora de la Encuesta*  
Julia Ferreira, *Jefa de Trabajo de campo*  
Juan Manuel Marini y Juan Perrot, *Procesamiento de datos*  
Nora Schenk, *Secretaria*

### *Digitadores*

Aldo Vicente Martínez Ovelar  
Emilio Germán Fleitas  
Carlos Alberto Benitez  
Carlos Rafael Meza  
Pablo Ramón González

## **CENTRO PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES (CDC) ATLANTA-GEORGIA**

Leo Morris  
Paul Stupp  
Mary Goodwin  
Aimee Afable  
Amy Terhune

Marion Carter , Princeton University

Valeria Loppi Oliveira, Asesoría Técnica, BEMFAM-Brasil

*SUPERVISORAS*

Juanita Lird Gómez  
Mirian Elizabeth Di Gallo  
Concepción M. de Cantero  
Lorenza Ferreira de González  
Liz Rocio Martinez

*ENCUESTADORAS*

Blásida Vázquez  
Catalina Duarte  
Celsa Liduvina Villalba  
Blasita Victoria Cáceres  
Felicita Agüero  
Zunilda Karabia  
Maria Concepción Riveros  
Ana Zárate  
Gloria Ayala  
Josefina Ojeda  
Ana Leguizamón  
Dolly Méndez  
Stella Maris Martinez  
Eva Ananías Villalba  
Jorgelina Espínola  
Margarita Molas  
Carmen Carballo  
Elba Natalia Aranda  
Teodora Benitez  
Maria Luisa Godoy

*CONDUCTORES*

Estanislao Portillo  
Alicio Rolón Ortega  
Julio César Ojeda

Virgilio Ortíz  
José Frutos  
Carlos Cáceres

*PREPARACION DEL INFORME*

María Mercedes Melián  
Paul Stupp  
Aimee Afable

Leo Morris  
Mary Goodwin  
Amy Terhune

# CONTENIDO

	Páginas
<b>PERSONAL DE LA ENCUESTA .....</b>	iii
<b>CONTENIDO .....</b>	v
<b>LISTA DE CUADROS .....</b>	vii
<b>LISTA DE GRAFICOS .....</b>	xv
<b>PRESENTACION .....</b>	xvii
<b>RESUMEN GENERAL .....</b>	xix
<b>CAPITULO 1 INTRODUCCION</b>	
1.1 Antecedentes y Objetivos de la Encuesta .....	1
1.2 Organización de la Encuesta .....	1
1.3 Temas del Cuestionario .....	2
1.4 Aspectos Operativos y Procesamiento de Datos.....	2
<b>CAPITULO 2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PARAGUAY</b>	
2.1 Geografía .....	5
2.2 Idioma .....	5
2.3 Características de la Población .....	5
2.4 Políticas y Programas de Población, Planificación Familiar y Salud Reproductiva .....	6
<b>CAPITULO 3 METODOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LAS ENTREVISTADAS</b>	
3.1 Diseño de la Muestra .....	9
3.2 Rendimiento de la Muestra .....	10
3.3 Características de las Viviendas .....	11
3.4 Características Generales de las Mujeres Entrevistadas .....	13
<b>CAPITULO 4 FECUNDIDAD</b>	
4.1 Tendencias de la Fecundidad .....	19
4.2 Diferenciales de la Fecundidad .....	20
4.3 Planeación de los nacimientos en los últimos 3 años .....	21
4.4 Deseo de más hijos .....	21
<b>CAPITULO 5 PLANIFICACION FAMILIAR: CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS</b>	
5.1 Conocimiento de Métodos Anticonceptivos .....	25
5.2 Conocimiento del Período Fértil .....	27
5.3 Uso de Métodos Anticonceptivos, Tendencia de la Prevalencia de Uso .....	28
5.4 Diferencias en los Niveles de Uso .....	32
5.5 Promedio de Hijos y de Edad al Iniciar el Uso de Anticonceptivos .....	35

5.6	Fuente de Suministro .....	38
5.7	Tiempo a la Fuente .....	41
5.8	Razones para Uso Actual .....	42
5.9	Uso Actual y Método Preferido a Usar .....	44
5.10	Percepción de usuarias actuales sobre el servicio recibido .....	46
5.11	Esterilización Femenina .....	47
<b>CAPITULO 6</b>	<b>NO USUARIAS DE ANTICONCEPTIVOS Y NECESIDAD DE SERVICIOS</b>	
6.1	Razones para No Usar Anticonceptivos .....	52
6.2	Razón para Discontinuar su Uso .....	52
6.3	Deseo de Uso Actual o Futuro .....	53
6.4	Usuarias de Yuyos .....	54
6.5	Primer método usado y edad de uso .....	56
6.6	Preferencia de otro método entre usuarias de yuyos .....	56
6.7	Necesidad de servicios de planificación familiar .....	56
<b>CAPITULO 7</b>	<b>ADULTAS JOVENES</b>	
7.1	Fecundidad .....	63
7.2	Primera Experiencia Sexual .....	64
7.3	Uso de Anticonceptivos .....	68
7.4	Actividad sexual actual .....	72
7.5	Educación sexual .....	74
7.6	Conocimientos y Actitudes .....	76
<b>CAPITULO 8</b>	<b>SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO</b>	
8.1	Control Prenatal y Lugar de Atención del parto .....	81
8.2	Vacuna Antitetánica Durante el Embarazo .....	84
8.3	Lugar de Atención y Tipo de Asistencia Profesional del Parto .....	85
8.4	Tipo de Parto .....	87
8.5	Control del Niño Sano .....	88
8.6	Iniciación de la Lactancia Materna .....	88
8.7	Duración de la Lactancia .....	91
<b>CAPITULO 9</b>	<b>ABUSO VERBAL Y FISICO DE LA MUJER</b>	
9.1	Antecedentes de Violencia entre los Padres .....	93
9.2	Violencia Física hacia las Mujeres .....	94
9.3	Tipo de Violencia Recibidas por las Mujeres de sus Parejas .....	95
9.4	Relaciones Domésticas .....	97
<b>Anexo A</b>	La precisión de los Resultados: Errores de Muestreo .....	103
<b>Anexo B</b>	Areas Prioritarias de AID: Dptos. Central, Cordillera y Misiones .....	105
<b>Anexo C</b>	El Cuestionario	

# LISTA DE CUADROS

	Páginas
<b>CAPITULO 2</b>	
Datos Básicos del Paraguay .....	4
<b>CAPITULO 3</b>	
<b>Cuadro 3.1</b> Resultados de entrevistas por región y área, ENSMI/981 .....	10
<b>Cuadro 3.2</b> Características de las viviendas por área y región, ENSMI/98 .....	12
<b>Cuadro 3.3</b> Disponibilidad de bienes en las viviendas, por área y región de residencia ENSMI/98 .....	13
<b>Cuadro 3.4</b> Distribución porcentual de mujeres en edad fértil encuestadas, por estado civil y edad, ENSMI/98 .....	13
<b>Cuadro 3.5</b> Distribución porcentual de mujeres en edad fértil encuestadas por nivel de instrucción según grupos de edad, ENSMI/98 .....	14
<b>Cuadro 3.6</b> Características de mujeres de 15 a 44 años de edad entrevistadas, por área y región de residencia, ENSMI/98 .....	16
<b>Cuadro 3.7</b> Distribución porcentual de mujeres entrevistadas por grupos de edad y porcentaje de casadas/unidas comparadas con el Censo de 1992 y ENDS-90, ENDSR-95/96 y ENSMI/98 .....	17
<b>CAPITULO 4</b>	
<b>Cuadro 4.1</b> Taza global de la fecundidad, según varias fuentes y periodos, por área y región de residencia, (Mujeres de 15-44 años), ENSMI/98 .....	19
<b>Cuadro 4.2</b> Tasas específicas de fecundidad por edad (por 1000 mujeres) y tasa global de fecundidad (TGF), por área, región y nivel de instrucción, periodo: setiembre 1995-agosto 1998, ENSMI/98 .....	20
<b>Cuadro 4.3</b> Tasas específicas de fecundidad por edad (por 1000 mujeres) tasa global de fecundidad (TGF) de algunos países seleccionados, ENSMI/98 .....	21
<b>Cuadro 4.4</b> Distribución porcentual de la planeación de los nacimientos vivos en el periodo setiembre 1995 – agosto 1998, según características seleccionadas, ENSMI/98 .....	22
<b>Cuadro 4.5</b> Deseo actual de tener más hijos, según características seleccionadas, mujeres Casadas/unidas de 15-44 años, ENSMI/98 .....	23
<b>CAPITULO 5</b>	
<b>Cuadro 5.1</b> Conocimiento de métodos anticonceptivos: porcentaje de todas las mujeres y mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años que conocen métodos anticonceptivos, por región y área de residencia, según método específico, ENSMI/98 .....	26

<b>Cuadro 5.2</b>	Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años que conocen algún método según características seleccionadas, ENSMI/98 .....	27
<b>Cuadro 5.3</b>	Distribución porcentual de todas las mujeres y de las que han usado alguna vez abstinencia periódica, según conocimiento del período fértil, ENSMI/98 .....	28
<b>Cuadro 5.4</b>	Tendencia de la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos según características seleccionadas: porcentaje de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, ENSMI/98 .....	29
<b>Cuadro 5.5</b>	Tendencia de la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos según métodos utilizados: distribución porcentual de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, ENSMI/98 .....	30
<b>Cuadro 5.6</b>	Prevalencia del uso de métodos anticonceptivos en países seleccionados; distribución porcentual de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, ENSMI/98 .....	32
<b>Cuadro 5.7</b>	Uso actual de anticonceptivos, según método por estado civil: mujeres de 15-44 años de edad, ENSMI/98 .....	33
<b>Cuadro 5.8</b>	Uso actual de métodos anticonceptivos por región y área, según uso y método, distribución porcentual de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años, ENSMI/98 .....	34
<b>Cuadro 5.9</b>	Uso actual de métodos anticonceptivos, por método, según características seleccionadas: distribución porcentual de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años, ENSMI/98 .....	36
<b>Cuadro 5.10</b>	Uso actual de anticonceptivos según método e idioma habitualmente hablado en el hogar, mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad, ENSMI/98 .....	37
<b>Cuadro 5.11</b>	Número promedio de hijos vivos y edad promedio al primer uso de anticonceptivos por características seleccionadas, mujeres de 15-44 años de edad que alguna vez han usado anticonceptivos, ENSMI/9 .....	38
<b>Cuadro 5.12</b>	Fuente de obtención de anticonceptivos modernos, según fuente método: distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años que usan actualmente métodos, ENSMI/98 .....	39
<b>Cuadro 5.13</b>	Fuente de obtención de cuatro principales métodos modernos según región: distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años que usan anticonceptivos, ENSMI/98 .....	41
<b>Cuadro 5.14</b>	Tiempo a la fuente de anticoncepción: distribución porcentual de usuarias de métodos modernos y no usuarias de métodos de planificación familiar, por tiempo para llegar a la fuente de anticoncepción según área de residencia, ENSMI/98 .....	42
<b>Cuadro 5.15</b>	Razón para usar anticonceptivos, según características seleccionadas, mujeres de 15-44 años que usan anticonceptivos, ENSMI/98 .....	45

<b>Cuadro 5.16</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15 - 44 años, casadas/unidas por método usado actualmente, según método preferido a usar, ENSMI/98 .....	46
<b>Cuadro 5.17</b>	Tiempo de espera para ser atendida según tres métodos modernos: Porcentaje de mujeres de 15 - 44 años atendidas en Clínicas, ENSMI/98 .....	46
<b>Cuadro 5.18</b>	Distribución porcentual de mujeres usuarias por grado de satisfacción con el servicio recibido en clínicas, según cuatro métodos, ENSMI/98 .....	47
<b>Cuadro 5.19</b>	Porcentaje de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años de edad usuarias de métodos que están esterilizadas según características seleccionadas, ENSMI/98 .....	48
<b>Cuadro 5.20</b>	Porcentaje de mujeres casadas/unidas esterilizadas que reportaron satisfacción con el método, según características seleccionadas, ENSMI/98 .....	49
 <b>CAPITULO 6</b>		
<b>Cuadro 6.1</b>	Razón para no usar anticonceptivos, por región y área: distribución porcentual de mujeres casadas y unidas de 15 a 44 años que no usan anticonceptivos, ENSMI/98 .....	51
<b>Cuadro 6.2</b>	Distribución porcentual de usuarias anteriores de métodos anticonceptivos por razón para dejar de usar el último método utilizado, mujeres casadas/unidas de 15-44 años, ENSMI/98 .....	52
<b>Cuadro 6.3</b>	Deseo de uso actual o futuro de anticonceptivos conocimiento del lugar de obtención, según características seleccionadas: porcentaje de mujeres casadas y unidas de 15 a 44 años que no usan anticonceptivos, ENSMI/98 .....	53
<b>Cuadro 6.4</b>	Método preferido para uso actual o futuro, por área y región: distribución porcentual de mujeres casadas y unidas de 15 a 44 años que no usan anticonceptivos y que desean usar ahora o en el futuro, ENSMI/98 .....	54
<b>Cuadro 6.5</b>	Uso alguna vez de yuyos entre mujeres que han oído de yuyos y uso actual entre estas mujeres según características seleccionadas, ENSMI/98 .....	55
<b>Cuadro 6.6</b>	Primer método anticonceptivo usado , por edad del primer uso, mujeres que han Usado métodos alguna vez, ENSMI98 .....	56
<b>Cuadro 6.7</b>	Usuarias de yuyos que prefieren usar otro método, por método preferido y razones para no usar el que prefieren, ENSMI/98 .....	57
<b>Cuadro 6.8</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años que necesitan servicios de planificación familiar y que no necesitan, según razones de no necesidad por estado civil y residencia, ENSMI/98 .....	57

<b>Cuadro 6.9</b>	Necesidad de servicios de planificación familiar, según características seleccionadas: porcentaje de mujeres de 15 a 44 años en riesgo de embarazo no planeado de acuerdo con el criterio de necesidad de servicios, ENSMI/98 .....	59
<b>Cuadro 6.10</b>	Necesidad insatisfecha de servicios de planificación familiar, según características seleccionadas: porcentaje de mujeres de 15 a 44 años en riesgo de embarazo no planeado de acuerdo con el criterio de necesidad de métodos modernos, ENSMI/98 .....	60
<b>Cuadro 6.11</b>	Necesidad de servicios de planificación familiar, según características seleccionadas: porcentaje de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años en riesgo de embarazo no planeado de acuerdo con el criterio de necesidad de servicios, ENSMI/98 .....	61
<b>Cuadro 6.12</b>	Necesidad de servicios de planificación familiar, según características seleccionadas: porcentaje de mujeres casadas/unidas de 15 a 44 años en riesgo de embarazo no planeado de acuerdo con el criterio de necesidad de métodos modernos, ENSMI/98 .....	62
<b>CAPITULO 7</b>		
<b>Cuadro 7.1</b>	Porcentaje acumulativo de mujeres de 15-24 años de edad que tuvieron la menarquia a varias edades, por edad actual, ENSMI/98 .....	63
<b>Cuadro 7.2</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15-24 años de edad por número y Promedio de embarazos, según edad y región de residencia, ENSMI/98 .....	64
<b>Cuadro 7.3</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad que reportaron haber tenido Relaciones sexuales, por edad, residencia y nivel de instrucción, ENSMI/98 .....	65
<b>Cuadro 7.4</b>	Edad de la primera pareja por estado civil y edad a la primera relación, mujeres de 15-24 años de edad con experiencia sexual, distribución porcentual, ENSMI/98 .....	66
<b>Cuadro 7.5</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad con experiencia sexual cuya primera relación fue premarital, por edad a la primera relación sexual, según nivel educativo, ENSMI/98 .....	66
<b>Cuadro 7.6</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15-24 años de edad que reportaron haber tenido relaciones sexuales premaritales por edad cuando la primera relación, según región, residencia y educación, ENSMI/98 .....	67
<b>Cuadro 7.7</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad que reportaron haber tenido relaciones sexuales premaritales por región y edad. ENSMI/98. Comparado con la encuesta de planificación familiar 1987 y ENSR-95/96 .....	67
<b>Cuadro 7.8</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad que usó anticonceptivos en su primera relación sexual, por estado civil cuando la primera relación según edad, región, área de residencia y educación, ENSMI/98 .....	69

<b>Cuadro 7.9</b>	Método anticonceptivo usado durante la primera relación sexual premarital, por método, comparado con ENDSR-95/96, ENSMI/98 .....	70
<b>Cuadro 7.10</b>	Uso de método anticonceptivo en la primera relación sexual según cuanto tiempo conocía a su pareja, por estado civil cuando la primera relación. Mujeres de 15-24 años de edad, ENSMI/98 .....	71
<b>Cuadro 7.11</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad que usaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual premarital según se había tenido un curso en educación sexual antes de la relación, por nivel de instrucción, ENSMI/98 .....	71
<b>Cuadro 7.12</b>	Razones de no uso de anticonceptivos cuando la primera relación relación sexual premarita y marital, ENSMI/98 .....	71
<b>Cuadro 7.13</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad que reportaron experiencia sexual premarital y uso de anticonceptivos en la primera relación sexual. Comparación con algunos países de America Latina, ENSMI/98 .....	72
<b>Cuadro 7.14</b>	Actividad sexual y uso de métodos anticonceptivos por estado civil, mujeres de 15-24 años de edad, ENSMI/98 .....	73
<b>Cuadro 7.15</b>	Distribución porcentual de frecuencia de relaciones sexuales: jóvenes adultas que tuvieron relaciones sexuales en las últimas cuatro semanas, por edad y estado civil, ENSMI/98 .....	74
<b>Cuadro 7.16</b>	Porcentaje de jóvenes que tuvieron un curso en educación sexual, por lugar donde tuvo el curso y grupos de edad, ENSMI/98 .....	74
<b>Cuadro 7.17</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad que recibieron alguna lección, curso o charla sobre educación sexual en la escuela o colegio, por edad según región y área de residencia, ENSMI/98 .....	75
<b>Cuadro 7.18</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad cuyo curso en educación sexual incluyó temas seleccionados por región y área de residencia, según temas, ENSMI/98 .....	75
<b>Cuadro 7.19</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad que conocen cuando es más probable quedarse embarazada durante el ciclo menstrual, por región y área, según ha asistido a un curso de educación sexual que trató el tema de la menstruación , ENSMI/98 .....	76
<b>Cuadro 7.20</b>	Método anticonceptivo considerado mas apropiado para jóvenes, por grupos de edad. Mujeres de 15-24 años de edad , ENSMI/98 .....	77
<b>Cuadro 7.21</b>	Opinión sobre quién debe tomar la iniciativa para usar un método, por nivel de Instrucción. Mujeres de 15-24 años de edad , ENSMI/98 .....	77
<b>Cuadro 7.22</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad de acuerdo con declaraciones referentes a la fertilidad, por nivel de instrucción, ENSMI/98 .....	78
<b>Cuadro 7.23</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad de acuerdo con la declaración que es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio por relación con su primera pareja sexual, ENSMI/98 .....	78

## CAPITULO 8

<b>Cuadro 8.1</b>	Porcentaje de nacidos vivos en los últimos 3 años que tuvieron atención prenatal y lugar donde recibieron la atención: nacidos vivos entre setiembre 1995 y agosto 1998, ENSMI/98 .....	82
<b>Cuadro 8.2</b>	Porcentaje de nacidos vivos en los últimos 3 años por número de controles prenatales y trimestre del primer control, ENSMI/98 .....	83
<b>Cuadro 8.3</b>	Porcentaje de nacidos vivos en los últimos 3 años para los cuales recibieron la vacuna antitetánica durante el embarazo, ENSMI/98 .....	84
<b>Cuadro 8.4</b>	Distribución porcentual de los nacidos vivos en los últimos 3 años, por lugar de atención del parto, ENSMI/98 .....	85
<b>Cuadro 8.5</b>	Distribución porcentual de los partos institucionales en los últimos 3 años, por tipo de asistencia profesional, ENSMI/98 .....	86
<b>Cuadro 8.6</b>	Tipo de parto: parto de nacidos vivos en los últimos 3 años, ENSMI/98 .....	87
<b>Cuadro 8.7</b>	Porcentaje de los nacidos vivos en los últimos 3 años llevados para el control del recién nacido, según características al primer control, ENSMI/98 .....	89
<b>Cuadro 8.8</b>	Porcentaje de los nacidos vivos en los últimos 3 años que recibieron lactancia materna, según tiempo al iniciarla, ENSMI/98 .....	90
<b>Cuadro 8.9</b>	Duración promedio en meses de lactancia materna: nacidos vivos en los últimos 3 años , ENSMI/98 .....	91

## CAPITULO 9

<b>Cuadro 9.1</b>	Porcentaje de Mujeres de 15 a 44 años de edad que durante su niñez o adolescencia alguna vez vió o escuchó a sus padres maltratarse físicamente, ENSMI/98 .....	94
<b>Cuadro 9.2</b>	Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad que alguna vez han recibido maltratos físicos, ENSMI/98 .....	95
<b>Cuadro 9.3</b>	Porcentaje de mujeres de 15 a 44 años de edad que han tenido pareja alguna vez, según su experiencia por tipo de violencia de su pareja (*), ENSMI/98 .....	96
<b>Cuadro 9.4</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad alguna vez casadas/unidas, según la persona de su familia que toma decisiones, comparando mujeres abusadas alguna vez y nunca abusadas, ENSMI/98 .....	98
<b>Cuadro 9.5</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad alguna vez casadas/unidas, según como se relaciona con su esposo/compañero, comparando mujeres abusadas alguna vez y nunca abusadas, ENSMI/98 .....	99
<b>Cuadro 9.6</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad alguna vez casadas/unidas, según su opinión acerca del derecho del esposo/compañero de pegarle a su esposa, comparando mujeres abusadas alguna vez y nunca abusadas, ENSMI/98 .....	100

<b>Cuadro</b>	<b>9.7</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad que ha recibido golpes de su esposo/compañero, según si el había tomado bebida alcohólica la última vez que le pegó, ENSMI/98 .....	101
<b>Cuadro</b>	<b>9.8</b>	Distribución porcentual de mujeres de 15 a 44 años de edad que han recibido golpes de su esposo/compañero, según a quién acudía, ENSMI/98 .....	101



# LISTA DE GRAFICOS

			Página
<b>CAPITULO 4</b>			
<b>Gráfico</b>	<b>4.1</b>	Deseo actual de tener más hijos según edad: Mujeres casadas/unidas de 15-44 años de edad, ENSMI/98 .....	24
<b>CAPITULO 5</b>			
<b>Gráfico</b>	<b>5.1</b>	Uso actual de métodos anticonceptivos entre las mujeres en unión. EPF-87, ENDS-90 y ENDSR-95/96 y ENSMI/98 .....	31
<b>Gráfico</b>	<b>5.2</b>	Uso actual de métodos anticonceptivos según método usado. ENSMI/98 .....	34
<b>Gráfico</b>	<b>5.3</b>	Uso actual de anticonceptivos según idioma hablado. ENSMI/98 .....	37
<b>Gráfico</b>	<b>5.4</b>	Fuente de obtención de anticonceptivos modernos, según fuente y métodos. ENSMI/98 .....	40
<b>Gráfico</b>	<b>5.5</b>	Tiempo a la fuente de anticonceptivos .....	43
<b>Gráfico</b>	<b>5.6</b>	Mujeres que usan anticonceptivos según razón de uso y número de hijos tenidos. ENSMI/98 .....	44
<b>CAPITULO 6</b>			
<b>Gráfico</b>	<b>6.1</b>	Necesidad de servicios de planificación familiar y razones por las cuales no necesitan, según estado civil: Mujeres de 15-44 años de edad. ENSMI/98 .....	58
<b>CAPITULO 7</b>			
<b>Gráfico</b>	<b>7.1</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad que reportaron haber tenido relaciones sexuales premaritales por región y edad. ENSMI/98 .....	68
<b>Gráfico</b>	<b>7.2</b>	Método anticonceptivo usado durante la primera relación sexual premarital por método comparado con ENDSR-95/96. ENSMI/98 .....	70
<b>Gráfico</b>	<b>7.3</b>	Porcentaje de mujeres de 15-24 años de edad de acuerdo con la declaración que es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio según experiencia sexual y edad actual. ENSMI/98 .....	79
<b>CAPITULO 8</b>			
<b>Gráfico</b>	<b>8.1</b>	Porcentaje de nacidos vivos que tuvo control prenatal y lo que tuvo en el primer trimestre entre nacidos vivos entre Sept. 1995 - Agosto 1998 según nivel educativo de la madre. ENSMI/98 .....	82
<b>Gráfico</b>	<b>8.2</b>	Porcentaje de partos institucionales y partos domiciliario según nivel educativo. ENSMI/98 .....	86



# PRESENTACION

El Centro Paraguayo de Estudios de Población, CEPEP, presenta en este informe los resultados finales de la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI 98), llevada a cabo gracias al apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), por intermedio de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel-Hill, y a la valiosa asistencia técnica de la División de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC), de Atlanta, Georgia, EEUU.

La **ENSMI 98** brinda información estadística sobre aspectos demográficos, de salud materno infantil, servicios de salud, planificación familiar y abuso verbal y físico hacia la mujer, a nivel nacional y por área de residencia urbana y rural; proporciona una base de datos comparable con estudios anteriores y fortalece la capacidad institucional para la realización de encuestas periódicas de este tipo.

La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, es la cuarta de una serie de encuestas hechas a nivel nacional por el CEPEP, y puesta a disposición de las instituciones públicas y privadas, para que su conocimiento y uso sirva de base a los técnicos que elaboran planes y proyectos de desarrollo social orientados a favorecer a la población paraguaya.

El CEPEP desea manifestar su reconocimiento a todas las mujeres entrevistadas que proporcionaron tan valiosa información, sin cuya participación no hubiese sido posible el desarrollo del estudio. También desea resaltar la labor de todas las personas que participaron en la encuesta, tanto en la recolección, como en el procesamiento y en el análisis de los datos.

Asunción, noviembre de 1999.



Dra. Cynthia Prieto  
Directora Ejecutiva



# RESUMEN GENERAL

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud Reproductiva (**ENSMI-98**) fue realizada por el Centro Paraguayo de Estudios de Población CEPEP, con la asesoría técnica de la División de Salud Reproductiva de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Atlanta, Georgia y con el apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La ENSMI-98, se llevó a cabo en la región Oriental del país y se excluyó la región Occidental o Chaco, por su baja densidad poblacional. La muestra fue diseñada para producir alrededor de 3.600 entrevistas completas de mujeres en edad fértil (15 a 44 años de edad), para lo cual fue necesario visitar cerca de 6.000 hogares.

Es de tipo probabilístico, a nivel de dos regiones: **Gran Asunción** (Asunción y Área Metropolitana) y **Resto del País**. Este diseño permite obtener también estimaciones representativas de las zonas urbana y rural a nivel del país.

El diseño fue sobremuestreado para tres departamentos: Central, Cordillera y Misiones, áreas prioritarias de USAID en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, para obtener, con excepción de la fecundidad, resultados más precisos de indicadores de salud materno infantil.

Provee información sobre características generales de las mujeres y de las viviendas, fecundidad, planificación familiar, preferencias reproductivas, salud materno infantil, acceso a servicios de salud y maltratos psicofísicos hacia la mujer.

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) a nivel nacional para el período 1995-1998 para mujeres de 15 a 44 años, fue de 4.3 hijos por mujer, con 3.2 hijos por mujer, para la zona urbana y 5.7 para la rural. En Asunción y el Área Metropolitana la TGF es de 2.9 hijos por mujer.

El deseo de no tener más hijos es expresado por el 38.8 ciento de las mujeres en unión, 31 por ciento desea otro hijo pero después de 2 años.

El conocimiento de métodos anticonceptivos está bastante difundido entre las mujeres paraguayas, hecho que ya se había verificado en encuestas anteriores. Los métodos más conocidos son la píldora, la inyección, el condón y el DIU (dispositivo intrauterino).

El 57.4 por ciento de las mujeres unidas usa algún método anticonceptivo. La práctica anticonceptiva se ha incrementado en los últimos años, pasando de 37.6 por ciento en 1987 a más de la mitad en 1998.

Desde el año 1990, el aumento se dio con más fuerza en el área rural, pasando de 34 por ciento a 45 por ciento en 1995 y a 49 por ciento en 1998, y principalmente en los métodos modernos que de 29 por ciento en 1987 pasó a 48 por ciento en el 98.

En el Paraguay, existen dos fuentes principales de suministro de métodos anticonceptivos, el Ministerio de Salud Pública (27 por ciento) y las farmacias (44 por ciento), que en conjunto cubren el 70 por ciento de la demanda .

Para el total del país el 11 por ciento de las mujeres en edad fértil necesita servicios de planificación familiar, necesidad que varía de 6 por ciento en zonas urbanas al triple (18 por ciento) en zonas rurales.

Se considera mujeres con riesgo de un embarazo no planeado o que requieren servicios de planificación familiar a todas las mujeres (independientemente de su estado conyugal) activas sexualmente, que no usan métodos anticonceptivos, no son infértiles, no están embarazadas y no desean un embarazo.

En cuanto a la necesidad de servicios de planificación familiar con métodos modernos, el porcentaje aumenta a 18 por ciento. Las mujeres residentes en áreas rurales se encuentran con mayores necesidades de métodos modernos (23 por ciento), respecto a las residentes en áreas urbanas (13 por ciento).

Más de la mitad (53.9 por ciento) de las mujeres jóvenes de 15 a 24 años, han tenido relaciones sexuales, este porcentaje es un poco más bajo que la cifra encontrada en 1995, 56.3 por ciento, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Como es de esperar las relaciones premaritales aumentan con la edad, de 18.2 por ciento en las mujeres de 15 a 17 años a 65.4 por ciento en las de 23 a 24 años.

Las jóvenes que reportaron relaciones sexuales premaritales empezaron su actividad sexual a una edad muy temprana, 32.2 por ciento antes de cumplir 16 años. Esta situación no ha cambiado desde 1995.

El 88 por ciento de las mujeres que tuvieron hijos nacidos vivos en los tres años anteriores a la entrevista concurren al control prenatal por lo menos una vez durante su embarazo. Para todo el país, el 67 por ciento tuvo su control prenatal en el sector público, 16 por ciento en el sector privado, 12 por ciento no tuvo ningún control.

En referencia al trimestre del primer control, los datos nacionales indican que solamente el 34.8 por ciento de las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal en el primer trimestre (lo recomendado), más de la mitad (53.2%) en el segundo o tercer trimestre, y el resto (12.0 por ciento) no lo recibió. La asistencia tardía al primer control (en el 2do. o 3er. trimestre) es mayor en las áreas rurales (60.4%) y entre las mujeres con menor educación y con mayor paridez.

Del total de los nacidos vivos en los últimos 3 años anteriores a la encuesta, a nivel nacional, el 56.3 por ciento de los partos fueron institucionales, 39.3 domiciliarios y 4.4% en otro lugar.

De los partos institucionales, 43.8 por ciento ocurrió en instituciones públicas y 12.5 por ciento en centros privados. Los partos institucionales son más comunes en áreas urbanas (81.3%) y Gran Asunción (92.9%), para las mujeres con educación secundaria o superior (93.7) y para los primeros partos de una mujer (73.5%).

De los partos domiciliarios, una pequeña proporción lo tuvo con una obstetra profesional (4.5 por ciento), 31.8 por ciento con parteras empíricas, los demás partos domiciliarios fueron con familiares o solas (3%).

Los partos domiciliarios con una partera son más frecuentes en áreas rurales (46.2 por ciento) y en el Resto del País (38.1 por ciento); y para mujeres menos educadas (50.9).

La duración promedio de lactancia en Paraguay es de 11.5 meses. La duración de la lactancia disminuye en madres que residen en áreas urbanas (9.6 meses), en Gran Asunción (8.9 meses).

Los antecedentes de maltrato en el hogar entre los padres, durante la niñez o adolescencia de los hijos, ha sido identificado como uno de los mayores factores de riesgo para el maltrato en las edades adultas.

En Paraguay, 18.2% de las mujeres reportaron haber escuchado o visto a sus padres maltratarse cuando eran niñas o adolescentes.

En total, 17.6% de las mujeres paraguayas reportaron haber recibido maltrato físico alguna vez en su vida.

No se encontró diferencias entre mujeres residentes en áreas urbanas y rurales. El porcentaje aumenta con la edad, y disminuye con los años de educación.

Las mujeres separadas, divorciadas, o viudas reportaron con más frecuencia haber sido maltratadas (35.6%) comparadas con mujeres actualmente casadas (19.4%) o las solteras (12.5%). Por tanto, es importante tomar en cuenta la posibilidad de baja respuesta, especialmente de las mujeres casadas, por miedo de posibles represalias.



# CAPITULO 1

## INTRODUCCION

### 1.1 Antecedentes y objetivos de la encuesta

La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, **ENSMI-98**, es la cuarta de una serie de encuestas hechas a nivel nacional por el Centro Paraguayo de Estudios de Población, **CEPEP**, con el fin de estudiar el comportamiento de la fecundidad, la anticoncepción y la salud materno - infantil en el Paraguay.

En esta oportunidad, como en años anteriores, se contó con la asesoría técnica de la División de Salud Reproductiva de Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, **CDC** de Atlanta, Georgia. La encuesta fue financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, **USAID**.

El objetivo de la encuesta fue actualizar la información sobre fecundidad, uso y fuente de obtención de métodos anticonceptivos, preferencias reproductivas, salud materno infantil, acceso a servicios de salud y maltratos físicos hacia la mujer, indicadores que pueden ser comparados a través del tiempo con estudios similares.

La **ENSMI-98** tuvo objetivos más modestos que encuestas anteriores, teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra fue diseñado para obtener aproximadamente 3.600 entrevistas completas de mujeres en edad fértil. En la encuesta del año 90 se entrevistó a 5.800 mujeres y se investigó sobre mortalidad infantil, en la del 95 la muestra fue de 6.500 mujeres y además de mortalidad infantil, se estudio la mortalidad materna.

El diseño fue sobremuestreado para tres departamentos: Central, Cordillera y Misiones, áreas prioritarias de **USAID** en colaboración con el Ministerio de Salud Pública, para obtener, con excepción de la fecundidad, resultados más precisos de indicadores de salud materno infantil.

### 1.2 Organización de la encuesta

Para los fines de este estudio se ha excluido la región Occidental o Chaco (con excepción de Villa Hayes), por su baja densidad poblacional y se han conformado dos regiones dentro de la región Oriental: Gran Asunción y Resto del País:

**Gran Asunción**, comprende Asunción y los siguientes distritos del departamento Central: Fernando de la Mora, Lambaré, San Lorenzo, Ñemby, Luque, Mariano Roque Alonso, Limpio, San Antonio, Villa Elisa y Villa Hayes (Región Occidental).

**Resto del País** comprende todos los otros departamentos de la Región Oriental del Paraguay (Concepción, San Pedro, Amambay, Cordillera, Guairá, Caazapá, Misiones, Paraguarí, Central (excluyendo Gran Asunción), Ñeembucú, Caaguazú, Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú).

### **1.3 Temas del cuestionario**

En la recolección de la información se utilizaron dos cuestionarios. Un Cuestionario de Hogar y un Cuestionario Individual.

El Cuestionario de Hogar recopila información sobre el número de personas que residen habitualmente en la vivienda, incluyendo a los niños, y el listado de cada mujer de 15 a 44 años de edad que viven en el hogar.

El Cuestionario Individual se utilizó para obtener datos detallados de una mujer en edad fértil en cada vivienda que fue seleccionada aleatoriamente, de acuerdo a la lista del Cuestionario de Hogar. El Cuestionario Individual consta de los siguientes capítulos: identificación, características generales de la entrevistada, historia de nacimientos, salud en la niñez, planificación familiar, preferencias reproductivas, adultas jóvenes, actividad sexual y nupcialidad, vivienda y maltratos psicofísicos. Condiciones de salud y uso de servicios (para personas de 6 años o más) y disponibilidad de servicios de salud, estos últimos dos temas fueron investigados en los 3 departamentos prioritarios (Central, cordillera y Misiones) y serán analizados con más profundidad en otro informe diferente a éste.

### **1.4 Aspectos operativos y procesamiento de datos**

La encuesta fue planeada en junio de 1998. Se elaboró el diseño de la muestra, el cuestionario preliminar y luego de la prueba piloto, que se llevó a cabo en julio en sectores urbanos y rurales, se confeccionó el cuestionario definitivo. Para la recopilación de la información se utilizó como marco muestral el Censo de Población y Viviendas de 1992.

El CEPEP, con asistencia de consultores de CDC, realizó un curso de entrenamiento para encuestadoras y supervisoras la primera quincena de setiembre de 1998. La capacitación estuvo dirigida a 40 mujeres de las cuales fueron seleccionadas 20 encuestadoras y 5 supervisoras.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 15 de setiembre y el 30 de noviembre de 1998, y se realizó a través de 5 equipos, conformado cada uno por una supervisora, cuatro encuestadoras y un chofer.

La entrada y procesamiento de datos transcurrió paralelamente al trabajo de campo, esto permitió detectar inconsistencias inmediatamente y en los casos necesarios se devolvía el material al campo para su corrección en el terreno.

La primera etapa de emisión y análisis de datos comenzó en enero de 1999 y concluyó con la publicación del informe preliminar en mayo del mismo año. Esta segunda etapa culmina con la presentación del informe final.

# PARAGUAY

BOLIVIA



BRASIL

ARGENTINA

## DATOS BÁSICOS DEL PARAGUAY

### Indicadores Demográficos, 1995-2000 (Proyecciones Oficiales) Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos

Población total – 1998 (en millones) .....	5.2
Tasa de crecimiento 1995-2000 (porcentaje) .....	2.6
Años necesarios para que se duplique la población .....	27
Tasa bruta de natalidad 1995-2000 (por mil) .....	31.3
Tasa Global de Fecundidad 1995-2000 .....	4.2
Tasa bruta de mortalidad 1995-2000 (por mil) .....	5.4
Esperanza de vida al nacer 1995-2000 .....	69.7
Nacimientos anuales (B) en miles .....	162

### Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI-98)

#### Población de la muestra

Mujeres de 15 a 44 años .....	3598
Porcentaje de mujeres casadas/unidas .....	61.3
Porcentaje de mujeres con Primaria Incompleta .....	29.6
Porcentaje de mujeres con Primaria Completa .....	25.1
Porcentaje de mujeres con Secundaria Incompleta .....	24.1
Porcentaje de mujeres con Secundaria Completa o más .....	21.3

#### Adultas Jóvenes

Porcentaje de mujeres con uno o más embarazos .....	36.3
Porcentaje de mujeres que reportó relaciones sexuales premaritales .....	44.5
Porcentaje de menores de 16 años que reportó relación sexual premarital .....	32.2
Porcentaje de mujeres que recibió curso de educación sexual en la escuela .....	60.5

### Fecundidad 15-44 años

Tasa Global de Fecundidad (TGF) .....	4.3
Tasa Global de Fecundidad (urbana) .....	3.2
Tasa Global de Fecundidad (rural) .....	5.7
Porcentaje de mujeres que no desean más hijos (excluyendo las mujeres esterilizadas) .....	38.8
Porcentaje de mujeres que desea postergar el nacimiento siguiente más de 2 años .....	31.2
Conocimiento y uso de anticonceptivos (Mujeres casadas/unidas) .....	
Porcentaje que conoce algún método .....	99.3
Porcentaje que actualmente usa algún método .....	57.4
Porcentaje que usa métodos modernos .....	47.7
Píldoras .....	13.1
DIU .....	11.1
Esterilización femenina .....	8.0
Inyección .....	7.5
Condón .....	7.3
Retiro .....	5.4
Ritmo .....	2.8
Billings .....	1.5
Vaginales .....	0.5

### Atención Materna

Porcentaje de partos institucionales .....	56.3
Porcentaje de partos domiciliarios .....	39.3
Porcentaje de partos por cesáreas .....	16.5
Porcentaje de partos por cesáreas (urbano) .....	31.5
Porcentaje de partos por cesáreas (rural) .....	6.2

## CAPITULO 2

# CARACTERISTICAS GENERALES DEL PARAGUAY

### 2.1 Geografía

La República del Paraguay, situada en el centro de América del Sur, posee una superficie de 406.752 km<sup>2</sup>. País mediterráneo que limita al norte y al este con Brasil; al sur con Argentina; y al norte y al oeste con Bolivia. Tiene salida al mar a través de los ríos Paraguay, Paraná y de la Plata, 1600 km. No posee montañas y los picos más elevados no sobrepasan los 800 metros sobre el nivel del mar.

Todo el territorio nacional, se encuentra dividido por el río Paraguay en dos regiones naturales y bien diferenciadas: la Occidental y la Oriental. La Región Occidental o Chaco, presenta una topografía plana en casi toda su extensión, su superficie (246.925 km<sup>2</sup>) representa más del 60 por ciento del territorio nacional y en ella se encuentra asentada apenas el 2.5 por ciento de la población total.

La Región Oriental, con una superficie de 159.827 km<sup>2</sup>, está habitada por cerca del 98 por ciento de la población. La mayor parte de las actividades económicas del país se desarrollan en esta región.

### 2.2 Idioma

La población paraguaya es bilingüe. La Constitución Nacional establece como idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La enseñanza en el inicio del proceso escolar se realiza en la lengua materna, y se instruye en el conocimiento y en el empleo de ambos idiomas oficiales. Según el censo de 1992, en el 37 por ciento de los hogares se habla sólo Guaraní, en el 50 por ciento se habla simultáneamente Castellano y Guaraní y sólo en el 7 por ciento de los hogares se habla exclusivamente Castellano.

### 2.3 Características de la Población

El rápido crecimiento demográfico es una constante verificada en las últimas cinco décadas en la población paraguaya. Desde el año 1950 hasta 1992 (fecha del último Censo) la población se triplicó, pasando de 1.300.000 a 4.100.000 habitantes. Según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos <sup>(1)</sup>, el número registrado hace 50 años se habría cuadruplicado en 1998 llegando a un poco más de 5.200.000 habitantes.

Asimismo el país se ha caracterizado por mucho tiempo, por su predominancia rural (65% población rural en 1950). Experimentando en los últimos años un acelerado proceso de urbanización que adquirió mayor fuerza desde el año 1982 (43% población urbana), llegando a 50.3 el porcentaje de población que reside en zonas urbanas según el último Censo (1992).

(1) Estimación y Proyección de la Población Total, según Sexo y Grupos de Edad. Período 1950-2050. Asunción, 1994.

La población paraguaya sigue siendo principalmente joven. Los menores de 15 años representan el 41.5% del total del país.

La fecundidad de las mujeres paraguayas, una de las más altas de América del Sur, medida a través de la Tasa Global de Fecundidad (número promedio de hijos vivos que tienen las mujeres al final de su período reproductivo), muestra una tendencia descendente desde el año 1960 cuando el promedio era de 6.7 hijos por mujer, hasta 4.4 hijos, tomando en cuenta los resultados de la presente encuesta (ENSMI-98). Para el quinquenio 2000-2005, de acuerdo a proyecciones de población, se estima una Tasa Global de Fecundidad de 3.8 hijos por mujer.

Los niveles de la Tasa Bruta de Natalidad se mantuvieron altos en los últimos años registrándose 42 nacimientos por cada mil habitantes entre 1950-1955 hasta llegar a cifras de 34 por mil durante el período 1990-1995. La Tasa Bruta de Mortalidad descendió de 9.9 por mil en el quinquenio 1960-1965 a 6.0 por mil entre 1990-1995. Se estima que la esperanza de vida al nacer es de 69.7 años.

## **2.4 Políticas y Programas de Población, Planificación Familiar y Salud Reproductiva**

El país no cuenta con una política oficial de población, pero se realizan acciones sectoriales relacionadas con la salud, vivienda, empleo, educación y promoción de la mujer. La planificación familiar adquirió rango constitucional a partir del año 1992.

La actual Constitución Nacional del Paraguay del año 1992 reconoce oficialmente, a través de los artículos 55 y 61, la protección de la Paternidad y Maternidad Responsables por parte del Estado y el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente el número y la frecuencia del nacimiento de sus hijos, así como a recibir, educación, orientación científica y servicios adecuados en la materia.

El Centro Paraguayo de Estudios de Población, afiliada a la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y fundada en el año 1966 es la única institución que desde hace más de 30 años en forma ininterrumpida ofrece servicios y asesoramiento educativo a personas que desean espaciar o limitar el número de hijos.

A nivel gubernamental, a través de sus establecimientos asentados en todo el territorio nacional, el Ministerio de Salud Pública ofreció servicios de planificación familiar entre los años 1972 y 1979, suspendiéndose en ese último año la ejecución del programa oficial. Posteriormente, desde el año 1988 se reinicia la oferta de servicios en los puestos y centros de salud como parte del programa de atención integral de la salud de la madre y el niño.

Durante el año 1993 el Ministerio de Salud Pública implementó el proyecto «Apoyo a la salud reproductiva y planificación familiar» que dió seguimiento a acciones anteriores de fortalecimiento del Programa Materno-Infantil, esto permitió el desarrollo del Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (actualmente en ejecución) y la constitución del Consejo Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que tienen como propósito mejorar los niveles de salud de las mujeres, hombres, niños/as y adolescentes a través de la atención integral en Salud Reproductiva.

El Consejo Nacional de Salud Reproductiva fue creado por Decreto n° 3.197 del 15 de abril de 1994. En el considerando del Decreto se especifica: «Que la atención de la Salud Reproductiva es una necesidad

que debe ser encarada a través de acciones concertadas y en coordinación interinstitucional e intersectorial, sector público y privado, nacionales e internacionales, representantes de la comunidad, especialmente grupos de mujeres, a fin de unificar esfuerzos, recursos y beneficios, desarrollando actividades de Salud Pública para contribuir a la disminución de la morbilidad materna y perinatal y en esta forma contribuir al bienestar de la familia»

Este Consejo ha sesionado, bajo la presidencia del Ministro de Salud, en forma regular hasta mediados de 1998. Durante el Gobierno que se inicia en agosto de ese año se interrumpen las reuniones del Consejo.

El advenimiento de un nuevo gobierno en marzo de 1999 restablece el funcionamiento del Consejo, y, por Resolución Ministerial N° 386 del 16 de agosto de 1999 se reglamenta el artículo 2 del Decreto y se conforma un Grupo Conductor, dependiente de dicho Consejo. En la resolución se define el Consejo Nacional de Salud Reproductiva como el «Organismo formado por Instituciones y Agencias involucradas con la Salud Reproductiva del país, que tiene el propósito de favorecer el análisis de la problemática y la toma de decisiones que faciliten la dinámica de desarrollo, en un trabajo conjunto y coordinado». Esta Resolución establece las funciones del Consejo así como las del Grupo Conductor.

Son funciones principales de este Consejo: asegurar la implementación del Plan Nacional de Salud Reproductiva, adoptar decisiones concernientes a problemas referentes a este tema y acompañar y evaluar el avance de los procesos nacionales.

El Consejo Nacional de Salud Reproductiva ha establecido la Comisión Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Salud y de la Mortalidad Materna, como ente técnico responsable del control epidemiológico de las causas de enfermedad y muerte materna.

El Consejo ha establecido el Plan Nacional de Salud Reproductiva, versión Pos Cairo 1997-2001, y la Política Nacional de Atención a la Salud Integral de la Mujer, que fue aprobada por Resolución Ministerial N° 412 del 26 de agosto de 1999. Este documento de Política Nacional de Atención a la Salud Integral de la Mujer contempla ejes estratégicos para la atención de la mujer en todas las etapas de su vida desde la niñez hasta la pos reproductiva, incluyendo la adolescencia.

La prevención y atención de las ETS/SIDA también está contemplada dentro del documento de Política Nacional de Atención a la Salud Integral de la Mujer, donde se inserta además la participación masculina como un eje estratégico de Desarrollo Integral de la Salud Sexual y Reproductiva.

Actualmente, tanto la Sanidad Militar como la Sanidad Policial se encuentran llevando a cabo proyectos de salud reproductiva con apoyo del UNFPA. También USAID está desarrollando proyectos de Salud Reproductiva, tanto en el sector público (Ministerio de Salud) como en el privado (CEPEP, Promesa). El Ministerio de Salud recibe también apoyo de entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, UNICEF, GTZ y otros, para desarrollar proyectos que incluyen la atención en Salud Reproductiva.



## CAPITULO 3

# METODOLOGIA Y CARACTERISTICAS DE LAS ENTREVISTADAS

### 3.1 Diseño de la muestra

La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, ENSMI-98, se llevó a cabo en la región Oriental del país y se excluyó la región Occidental o Chaco, por su baja densidad poblacional. La muestra fue diseñada para producir alrededor de 3.600 entrevistas completas de mujeres en edad fértil (15 a 44 años de edad), para lo cual fue necesario visitar cerca de 6.000 hogares. Es de tipo probabilístico, a nivel de dos regiones: Gran Asunción (Asunción y Area Metropolitana) y Resto del País. Este diseño permite obtener también estimaciones representativas de las zonas urbana y rural a nivel del país, y como mencionamos antes estimaciones para los tres departamentos sobremuestreados (Central, Cordillera y Misiones).

El muestreo estadístico consiste en un diseño probabilístico en tres etapas y de conglomerados. Probabilístico porque todas las mujeres que conforman el universo tienen una probabilidad conocida, diferente de cero, de ser seleccionadas. La unidad primaria de muestreo (UPM) es el sector censal, la unidad secundaria de muestreo (USM) es la vivienda y la unidad de muestreo de la tercera etapa es la mujer en edad fértil (MEF).

La selección de sectores censales (UPM) se realizó en forma sistemática, con arranque aleatorio, en base a probabilidades proporcionales a su tamaño (PPT), medidas por el número de viviendas particulares existentes de acuerdo con la información del Censo de Población y Viviendas de 1992, que fue usado como marco muestral.

Como consecuencia de sobremuestrear tres departamentos, la selección fue independiente para cada departamento, de esta manera, la probabilidad de selección de las UPM es diferente para cada departamento de la muestra. Por lo tanto, se aplica un factor de ponderación para cada departamento.

La segunda etapa de selección consistió en escoger un número fijo de viviendas dentro de cada sector de la muestra, esto se hizo en forma aleatoria con el fin de asegurar que todas las viviendas por sector tuvieran igual probabilidad de ser seleccionadas. Para esta etapa se utilizaron los listados de viviendas producto de la actualización cartográfica. Se procedió a seleccionar aleatoriamente una vivienda de partida entre el número  $l$  y la  $n$ ; siendo  $n$  el número total de viviendas del sector en la muestra. Las viviendas incluidas en la muestra son la de inicio y las  $n-l$  consecutivas.

Para la tercera etapa de selección, se incluyó en un listado de la vivienda a todas las mujeres en edad fértil de 15 a 44 años de edad, iniciando con la de mayor edad y prosiguiendo en forma descendente. Luego se seleccionó en forma aleatoria solamente una MEF por vivienda, utilizando en el cuestionario de hogar un cuadro que permite tal selección de acuerdo al último dígito del cuestionario y al número de MEF en la vivienda. La probabilidad de selección de cada entrevistada era inversamente proporcional al número de mujeres de 15 a 44 años en la vivienda. Por tanto se aplica como factor de ponderación el número de MEF en la vivienda para compensar esta desigual probabilidad de selección.

Para mujeres con hijos nacidos vivos que los tuvieron a partir de enero de 1993, hasta la fecha de la entrevista, se preguntó sobre deseo de embarazo, control prenatal y asistencia al parto. También se seleccionó aleatoriamente un hijo, para aplicar preguntas sobre el tema de control posparto y en los tres departamentos sobremuestreados preguntas sobre gastos de salud para enfermedades del niño en las últimas 4 semanas anteriores a la entrevista. Para el análisis de estos temas se aplican factores de ponderación, con la misma metodología de compensar la probabilidad desigual de selección de los niños.

### 3.2 Rendimiento de la muestra

En el **Cuadro 3.1** se observa que un total de 5.936 viviendas fueron seleccionadas, de las cuales 5.313 estaban ocupadas. Incluyendo las viviendas desocupadas, se completó cuestionarios de hogares en 5.823 viviendas (98.1 por ciento de las viviendas).

**CUADRO 3.1**

**RESULTADO DE ENTREVISTAS POR REGION Y AREA, ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MATERNO INFANTIL PARAGUAY, 1998. ENSMI-98**

RESULTADO DE ENTREVISTAS	TOTAL DEL PAIS	REGION		AREA	
		GRAN ASUNCION	RESTO DEL PAIS	URBANA	RURAL
<b>N° DE VIVIENDAS</b>	<b>5936</b>	<b>1622</b>	<b>4314</b>	<b>3536</b>	<b>2400</b>
Entrevista Completa	<u>98.1</u>	<u>97.1</u>	<u>98.6</u>	<u>97.8</u>	<u>98.7</u>
Vivienda con MEF	62.0	68.1	59.4	64.0	59.1
Vivienda sin MEF	27.5	23.6	29.0	25.2	30.8
Vivienda Desocupada o Destruida	9.9	7.2	11.0	10.1	9.7
Moradores Ausentes	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2
Rechazo	0.4	0.7	0.2	0.5	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>MUJERES</b>	<b>3667</b>	<b>1104</b>	<b>2563</b>	<b>2249</b>	<b>1418</b>
Entrevista Completa	<u>98.1</u>	<u>97.0</u>	<u>98.6</u>	<u>97.8</u>	<u>98.6</u>
Ausente	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7
Rechazo	1.1	2.3	0.6	1.5	0.4
Otras Razones	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N° de Mujeres con Entrevista Completa</b>	<b>3598</b>	<b>1071</b>	<b>2527</b>	<b>2199</b>	<b>1399</b>

NOTA: En este cuadro y en los subsiguientes, los subtotales pueden no sumar 100.0 debido al redondeo.

Un total de 3.667 mujeres elegibles fueron identificadas a través del cuestionario de hogar, lográndose completar el cuestionario individual para 3.598 de ellas (98.1 por ciento). Solamente 1.1 por ciento de las mujeres elegibles rechazó la entrevista, alcanzando 2.3 por ciento en Gran Asunción. La tasa de respuesta varió de 97.0 % en Gran Asunción hasta 98.6 % en el área rural.

### 3.3 Características de las viviendas

La disponibilidad y acceso a servicios básicos adecuados tales como agua, servicio sanitario, disponibilidad de electrodomésticos y medios de transporte se encuentran asociados con mejores condiciones de vida de la población y de los niños en particular. En el cuestionario de la ENSMI-98 se recolectó información sobre la disponibilidad de servicios básicos en la vivienda y disponibilidad de electrodomésticos y medios de transporte, en las viviendas con una entrevista completa de una MEF, estos se presentan en el Cuadro 3.2.

Los resultados de la encuesta respecto a la tenencia de la vivienda muestran que el 78.6 por ciento de las viviendas son propias. El acceso a la vivienda propia es más alto en áreas rurales donde el 84.7 por ciento posee vivienda propia frente a 70.4 por ciento en áreas urbanas. Las viviendas alquiladas son más frecuentes en áreas urbanas, 17.8 por ciento.

En el 51.4 por ciento de las viviendas su principal fuente de abastecimiento de agua para uso doméstico es a través de conexiones intradomiciliarias (ya sea dentro de la vivienda, como en el patio). El 81.4 por ciento de las viviendas en Gran Asunción tienen agua de tubería. En el resto del país no alcanza a 40 por ciento (36.7 por ciento) y en áreas rurales sólo 13.3 por ciento de las viviendas poseen este servicio.

Respecto a la disponibilidad de servicio sanitario, la mitad de las viviendas (50.2 por ciento) dispone de baño conectado a la red pública o con pozo ciego (depósito subterráneo para aguas residuales). El porcentaje es bastante diferente entre Gran Asunción (88.4 por ciento) y el resto del país (35.3 por ciento). En áreas rurales sólo 13.1 por ciento de las viviendas tienen servicio sanitario conectado a la red pública o con pozo ciego, pero la gran mayoría (84.1 por ciento) de las viviendas rurales tienen letrina común, que consiste en una simple excavación, en la tierra, o pozo tapado con troncos o tablas, con o sin caseta de aislamiento.

El combustible para cocinar más utilizado, a nivel nacional es el gas (60.8 por ciento), también en el área urbana el gas es el combustible más utilizado (89.6 por ciento), pero en el área rural lo más utilizado es la leña o el carbón (74.3 por ciento).

El 88.4 por ciento de todas las entrevistadas reportaron que su vivienda tiene energía eléctrica; 89.6 por ciento en áreas urbanas y 75.3 por ciento en áreas rurales.

Los niveles de bienestar de la población pueden ser medidos también según la disponibilidad de electrodomésticos, tales como radio, televisor, heladera, etc., así como según la posesión de medios de locomoción (motocicleta y automóvil). El Cuadro 3.3 contiene la distribución de hogares según la disponibilidad o posesión de estos bienes.

## CUADRO 3.2

## CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS \* POR AREA DE RESIDENCIA Y REGION. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	AREA			REGIONES	
	TOTAL PAIS	URBANA	RURAL	GRAN ASUNCION	RESTO DEL PAIS
<b>CONDICION DE LA VIVIENDA</b>					
Propia	78.6	70.4	84.7	65.8	81.1
Alquilada	11.6	17.8	1.7	19.0	7.3
Gratuita	12.5	11.8	13.5	15.1	11.5
Otro/No responde	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
<b>FUENTE DE ABASTECIMIENTO</b>					
<b>DE AGUA</b>					
Tubería en la casa	45.2	74.5	8.6	81.4	31.0
Tubería en el patio	6.2	7.3	4.7	7.4	5.7
Canilla pública	1.1	1.6	0.4	1.9	0.7
Pozo con bomba de mano	3.1	1.2	5.5	1.7	3.7
Pozo con bomba eléctrica	8.9	7.7	10.4	3.6	11.0
Pozo sin bomba de mano	28.0	6.1	55.5	3.1	37.8
Río, manantial	3.4	0.2	7.4	0.0	4.7
Aljibe	0.3	0.0	0.6	0.0	0.4
Trae del vecino	3.7	1.2	6.8	0.9	4.8
Otro/No responde	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0
<b>SERVICIO SANITARIO</b>					
Baño moderno conectado a red pública	10.1	17.9	0.4	32.4	1.4
Baño moderno con pozo ciego	40.1	62.0	12.7	56.0	33.9
Letrina municipal	2.0	1.9	2.2	1.6	2.2
Letrina común	47.0	17.4	84.1	8.8	62.1
Otro/No responde	0.7	0.8	0.6	1.2	0.5
<b>COMBUSTIBLE PARA COCINAR</b>					
Gas	60.8	89.6	24.7	93.0	48.1
Leña/Carbón	38.1	9.2	74.3	5.0	51.1
Otro	0.7	1.1	0.3	1.9	0.2
<b>PORCENTAJE QUE TIENE</b>					
<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	88.4	98.9	75.3	99.6	84.1
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N° DE CASOS</b>	<b>3598</b>	<b>2199</b>	<b>1399</b>	<b>1071</b>	<b>2527</b>

\* Número de viviendas con entrevista individual completa

Nuevamente el área de residencia presenta diferencias importantes, siendo mayor el porcentaje de viviendas en Gran Asunción que disponen de electrodomésticos o poseen auto particular. En Gran Asunción el 93.8 por ciento de las viviendas poseen radio y 95.3 por ciento televisor, en el resto del país sólo 87.1 por ciento de las viviendas poseen radio y 72.2 por ciento, televisor. Mientras que en el área rural las viviendas con televisor sólo llegan al 58.1 por ciento.

## CUADRO 3.3

## DISPONIBILIDAD DE BIENES EN LAS VIVIENDAS \*POR REGION Y AREA DE RESIDENCIA. ENSMI-98

DISPONIBILIDAD DE BIENES	TOTAL DEL PAIS	REGION		AREA	
		GRAN ASUNCION	RESTO DEL PAIS	URBANA	RURAL
Radio	89.0	93.8	87.1	93.6	82.5
Televisor	78.8	95.3	72.2	93.1	58.1
Heladera	66.6	91.1	56.8	85.3	39.6
Lavarropa	43.1	71.5	31.8	62.4	15.3
Teléfono	24.3	52.0	13.4	40.1	1.6
Video	22.7	42.5	14.8	35.0	5.1
Auto particular	25.3	44.2	17.8	36.4	9.2
Motocicleta	10.8	8.2	11.9	10.3	11.6
<b>Nº DE VIVIENDAS</b>	<b>3598</b>	<b>1071</b>	<b>2527</b>	<b>2199</b>	<b>1399</b>

\* Número de viviendas con entrevista individual completa.

## 3.4 Características generales de las mujeres entrevistadas

Como se ve en el Cuadro 3.4, la distribución de las mujeres en edad fértil, MEF, según estado marital indica que 33.1 por ciento son solteras y que alrededor de 61 por ciento están casadas o unidas (43.6 por ciento casadas y unidas 17.7 por ciento). Solamente 15.4 por ciento de las adolescentes son casadas o unidas y 83.2 por ciento nunca estuvieron unidas. El porcentaje de casadas o unidas es de 50.0 por ciento en las jóvenes de 20-24 años.

## CUADRO 3.4

## DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL ENCUESTADAS, POR ESTADO CIVIL SEGUN GRUPOS DE EDAD. ENSMI-98

EDAD	CASADA	UNIDA	CASADA/UNIDA ALGUNA VEZ*	SOLTERA	TOTAL	Nº DE MUJERES
15-19	6.0	9.4	1.5	83.2	100.0	766
20-24	28.4	21.6	6.7	43.3	100.0	602
25-29	55.5	21.9	5.5	17.0	100.0	609
30-34	64.7	22.1	5.5	7.8	100.0	655
35-39	65.5	19.2	10.5	4.8	100.0	544
40-44	74.4	14.4	6.2	5.0	100.0	422
<b>TOTAL</b>	<b>43.6</b>	<b>17.7</b>	<b>5.6</b>	<b>33.1</b>	<b>100.0</b>	<b>3598</b>

\* Incluye separada, divorciada y viuda

El nivel educativo de las mujeres influye preponderantemente en sus actitudes y prácticas relacionadas con la salud de la madre y del niño, su comportamiento reproductivo, sus actitudes hacia el tamaño de la familia y el uso de métodos anticonceptivos. Además, el nivel de instrucción refleja la situación socio-económica, siendo generalmente el nivel de escolaridad más elevado cuando más favorable es la situación económica.

El nivel de instrucción se clasificó en cinco categorías: **0-2 años de instrucción**; **3-5 años de instrucción**; **primaria completa**, las que culminaron los 6 años del ciclo primario; **secundaria incompleta**; **secundaria o más**, las que completaron los seis años del ciclo secundario y las que tienen estudio superior. En el **Cuadro 3.5** se presenta la distribución porcentual de las MEF por nivel de instrucción y edad.

El 7.5 por ciento con un máximo de dos años de instrucción, está dentro del grupo de analfabetas funcionales. Poseen instrucción primaria, completa o incompleta 47.2 por ciento, mientras que un 24.1 por ciento no terminó la secundaria, un 21.3 por ciento finalizó el nivel secundario o sobrepasó. Examinando los porcentajes de edad, se hace evidente que hubo una mejoría importante en cuanto al acceso a los medios de enseñanza. Así, entre las mujeres de 40-44 años, 40 por ciento declaró 5 años o menos de instrucción, comparado con 17.4 por ciento en el grupo 15-19 años.

CUADRO 3.5

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES EN EDAD FERTIL ENCUESTADAS,  
POR NIVEL DE INSTRUCCION SEGUN GRUPOS DE EDAD. ENSMI-98**

EDAD	0-2 AÑOS	3-5 AÑOS	PRIMARIA COMPLETA	SECUNDARIA INCOMPLETA	SECUNDARIA O MAS	TOTAL	Nº DE MUJERES
15-19	3.3	14.1	23.8	50.7	8.0	100.0	766
20-24	6.6	18.6	22.2	21.5	31.1	100.0	602
25-29	7.0	25.0	28.9	10.5	28.5	100.0	609
30-34	7.0	26.9	25.0	15.5	25.6	100.0	655
35-39	11.3	28.5	28.6	16.8	14.8	100.0	544
40-44	14.5	25.8	22.4	14.3	23.0	100.0	422
<b>TOTAL</b>	<b>7.5</b>	<b>22.1</b>	<b>25.1</b>	<b>24.1</b>	<b>21.3</b>	<b>100.0</b>	<b>3598</b>

La distribución de mujeres en edad fértil (15-44 años de edad), en la muestra de la ENSMI-98 según características generales se presenta en el **Cuadro 3.6**. La estructura por edad relativamente joven observada entre las MEF, refleja el efecto de los altos niveles de fecundidad prevalecientes durante el pasado reciente en Paraguay. Más del 40 por ciento de las mujeres paraguayas en edad reproductiva son jóvenes adultas de 15-24 años.

En cuanto a diferencias regionales, las mujeres en el Gran Asunción muestran un nivel de escolaridad más favorable que las del Resto del país. Así vemos que las que han alcanzado niveles de instrucción secundaria o superior representan el 41.9 por ciento en el Gran Asunción, en comparación con sólo 13.2 por ciento en el Resto del país.

En Paraguay, 1 de cada 4 mujeres de 15 a 49 años trabaja fuera del hogar. Mientras que 40 por ciento de las MEF en Gran Asunción trabajan fuera de la casa, en el Resto del País, el 20 por ciento trabaja fuera de la casa.

Sólo 11.4 por ciento de las mujeres declaró estar asegurada en el Instituto de Previsión Social (IPS), y 20 por ciento tiene un seguro privado. En el área rural, las mujeres que tienen cualquier seguro de salud, en conjunto, no alcanzan a 12 por ciento (6.3 por ciento seguro privado; 5.3 por ciento seguro social del IPS).

En 38% de las viviendas, las entrevistadas señalan que hablan guarani habitualmente en el hogar y 40% hablan guarani y español. Apenas 19% hablan solamente español en el hogar y 3% hablan otro idioma, principalmente portugués en la región fronteriza con Brasil. El idioma guarani es más hablado en áreas rurales y fuera de Asunción (68.4 por ciento y 51 por ciento, respectivamente).

## CUADRO 3.6

## CARACTERISTICAS DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD ENTREVISTADAS POR REGION Y AREA DE RESIDENCIA. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	TOTAL	REGIONES		AREA	
		GRANASUNCION	RESTO DEL PAIS	URBANA	RURAL
<b>EDAD</b>					
15-19	23.4	21.6	24.2	23.8	22.9
20-24	19.1	23.4	17.4	21.0	16.7
25-29	17.2	17.1	17.2	16.5	18.1
30-34	15.7	15.3	15.8	13.9	17.8
35-39	13.5	11.1	14.4	12.7	14.4
40-44	11.2	11.7	11.0	12.1	10.1
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>					
0-2 años	7.5	2.4	9.5	3.3	12.7
3-5 años	22.1	5.6	28.6	10.1	37.0
Primaria Completa	25.1	18.9	27.5	21.2	29.9
Secundaria Incompleta	24.1	31.1	21.3	31.5	14.7
Secundaria Completa y más	21.3	41.9	13.2	33.8	5.6
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA</b>					
No Trabaja	61.5	47.5	67.1	49.4	76.8
Trabaja dentro de la casa	13.1	12.9	13.1	13.8	12.2
Trabaja fuera de la casa	25.2	39.6	19.5	36.5	10.9
<b>PORCENTAJE CON SEGURO MEDICO</b>					
Seguro Privado	19.9	39.5	12.1	30.7	6.3
Seguro del IPS	11.4	19.7	8.1	16.3	5.3
<b>IDIOMA QUE HABLAN EN LA CASA</b>					
Guarani	38.1	5.3	51.0	13.8	68.4
Español	18.6	39.4	10.4	31.4	2.5
Español y Guaraní	40.4	54.9	34.7	54.1	23.2
Portugués	2.5	0.0	3.5	0.1	5.5
Otro	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3
<b>ESTADO CIVIL</b>					
Unida	17.7	13.3	19.5	16.3	19.5
Casada	43.6	41.8	44.4	39.5	48.8
Viuda	0.7	0.3	0.9	0.8	0.6
Separada	4.5	5.0	4.3	5.2	3.7
Divorciada	0.3	1.0	0.0	0.5	0.0
Soltera	33.1	38.7	30.9	37.6	27.4
<b>HIJOS ACTUALMENTE VIVOS</b>					
0	35.2	41.8	32.5	40.7	28.2
1	14.9	18.6	13.4	16.9	12.3
2	14.6	16.5	13.8	15.6	13.3
3	12.1	13.6	11.5	12.7	11.3
4	8.3	6.3	9.1	6.9	10.0
5-6	8.5	1.8	11.1	4.6	13.3
7+	6.5	1.4	8.5	2.4	11.6
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N° DE MUJERES CON ENTREVISTA COMPLETA</b>	<b>3598</b>	<b>1071</b>	<b>2527</b>	<b>2199</b>	<b>1399</b>

La población femenina (15-44 años) encuestada presenta una distribución por edades bastante similar a la observada en el Censo de 1992 y en la encuesta de 1995 (**Cuadro 3.7**). Esta estructura se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años y las diferencias que se observan en los diversos grupos de edad no son significativas. Más de 40 por ciento de las mujeres de edad fértil son adultas jóvenes.

Al igual que la información del Censo de 1992, la encuesta presenta una característica de distribución del estado civil o conyugal que en general se ha mantenido sin mayores cambios. Sin embargo, como ya fue documentado en otras encuestas de América Latina, la proporción de casadas y unidas es ligeramente más alta (edades 25-44) en la ENSMI-98, comparada al censo de 1992. Esto se debe a que en las encuestas es la mujer la que declara su real estado civil y no el jefe de la casa o sus padres como sucede en los censos.

CUADRO 3.7

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES ENTREVISTADAS POR GRUPOS DE EDAD Y PORCENTAJE DE CASADAS/UNIDAS COMPARADAS CON CENSO-92 Y ENDSR-95/96, ENSMI-98**

GRUPOS DE EDAD	ENSMI-98	TOTAL DE MUJERES ENDSR 95/96	CENSO-92
15-19	23.4	23.7	22.4
20-24	19.1	18.2	20.0
25-29	17.2	17.2	17.8
30-34	15.7	16.2	16.0
35-39	13.5	13.8	13.5
40-44	11.2	11.0	10.4
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>

GRUPOS DE EDAD	ENSMI-98	TOTAL DE MUJERES ENDSR 95/96	CENSO-92
15-19	13.4	15.5	16.2
20-24	50.0	55.6	52.0
25-29	77.4	75.8	72.1
30-34	86.8	84.2	79.8
35-39	84.7	82.5	81.6
40-44	88.8	82.4	79.8
<b>TOTAL</b>	<b>61.3</b>	<b>62.3*</b>	<b>60.3*</b>

\*Mujeres 15-49 años



## CAPITULO 4

# FECUNDIDAD

Las estimaciones de fecundidad presentadas en esta sección se basan en las historias de nacimientos de las mujeres de 15 a 44 años entrevistadas en la ENSMI-98. Se obtuvo, para cada mujer entrevistada, datos sobre número de hijos nacidos vivos, fecha de nacimiento y sexo de cada hijo y condición de sobrevivencia a la fecha de la encuesta. Esta información permite obtener estimaciones de los niveles y tendencias de la fecundidad.

### 4.1 Tendencia de la fecundidad

La estimación del nivel de fecundidad más reciente se refiere a los tres años anteriores a la encuesta (setiembre de 1995 a agosto de 1998).

La Tasa Global de Fecundidad según datos de las tres últimas encuestas se presentan en el **Cuadro 4.1**. La Tasa Global de Fecundidad (TGF) es un indicador de la fecundidad reciente durante un período determinado y expresa el promedio de hijos nacidos vivos que tendrían las mujeres al final de su vida reproductiva, si las tasas de fecundidad actuales se mantuvieran constantes.

La Tasa Global de Fecundidad a nivel nacional para el período 1995-1998 para mujeres de 15 a 44 años, fue de 4.3 hijos por mujer. Entre 1990 y 1995 se dio una leve disminución de 4.6 a 4.3 hijos por mujer. Desde 1995, se ha mantenido igual el nivel de fecundidad en el Paraguay.

**CUADRO 4.1**  
**TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD, SEGUN VARIAS FUENTES Y PERIODOS, POR AREA Y REGION DE RESIDENCIA, (MUJERES 15-44 AÑOS). ENSMI-98**

TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) SEGUN LAS TRES ULTIMAS ENCUESTAS			
AREA	ENDS-90 1987-90	ENDSR-95 1990-95	ENSMI-98 1995-98
<b>TOTAL</b>	4.6	4.3	4.3
<b>AREA</b>			
Urbana	3.6	3.3	3.2
Rural	6.0	5.6	5.6
<b>REGION</b>			
Gran Asunción	3.5 (*)	2.9	2.9
Resto del País	—	—	4.7

(\*) Mujeres de 15-49 años

Se puede ver que existen diferencias importantes según área de residencia. En las tres encuestas consideradas las mujeres que residen en zonas rurales tienen en promedio más de 2 hijos por mujer en relación a las mujeres con residencia urbana.

## 4.2 Diferenciales de la fecundidad

El Cuadro 4.2 muestra las diferencias en las tasas específicas de fecundidad por edad y en la TGF, según residencia y nivel de instrucción. Anteriormente ya se vio que las mujeres rurales tienen en promedio más de 2 hijos por mujer respecto a las residentes en áreas urbanas, estas diferencias son consistentes en todos los grupos de edades.

Las diferencias de fecundidad son mayores cuando se compara la TGF en mujeres con ninguna educación o que apenas llegaron al segundo grado, con mujeres que completaron el ciclo secundario o tienen educación superior. Las del primer grupo tienen casi cuatro hijos más respecto a las más educadas.

La fecundidad de las mujeres del grupo 15-19 años con educación secundaria completa o más es muy inferior (29 hijos por cada mil mujeres) frente a las que apenas alcanzaron 2 años del ciclo primario (227 nacimientos por cada 1.000 mujeres).

CUADRO 4.2

TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR EDAD (POR 1.000 MUJERES) Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF), POR AREA, REGION Y NIVEL DE INSTRUCCION, PERIODO: SEPTIEMBRE 95 - AGOSTO 98. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	EDAD						TGF (15-44)
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	
<b>TOTAL</b>	87	216	214	167	132	37	4.3
<b>AREA</b>							
Urbana	51	168	180	124	100	21	3.2
Rural	140	280	252	214	168	65	5.6
<b>REGION</b>							
Gran Asunción	43	144	153	122	90	22	2.9
Resto del País	105	250	238	184	145	44	4.8
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>							
0-2 años	227	328	187	211	284	*	6.2
3-5 años	195	292	257	198	162	62	5.8
Primaria Completa	117	240	262	189	122	61	5.0
Secundaria Incompleta	47	207	255	140	52	17	3.6
Secundaria Completa y más	29	119	106	112	62	24	2.3

\* Número insuficiente de casos

Paraguay es uno de los pocos países que todavía mantiene una alta tasa de fecundidad entre los países de la región.

En el **Cuadro 4.3** se compara la TGF de Paraguay con la fecundidad de otros países que han tenido encuestas similares en años recientes. Juntamente con Bolivia, nuestro país tiene en promedio más de 4 hijos por mujer, el resto se ubica por debajo de este nivel e inclusive Brasil no alcanza a tener 3 hijos por mujer.

### CUADRO 4.3

#### TASAS ESPECIFICAS DE FECUNDIDAD POR EDAD (POR 1.000 MUJERES) Y TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD DE ALGUNOS PAISES SELECCIONADOS. ENSMI-98

PAIS Y PERIODO						
EDAD	BOLIVIA (1) (1995-98)	BRASIL (2) (1993-95)	COLOMBIA (3) (1992-94)	ECUADOR (4) (1989-94)	PARAGUAY(5) (1995-98)	PERU (6) (1993-96)
15-19	84	86	89	91	87	75
20-24	207	152	173	184	216	179
25-29	201	123	148	174	214	162
30-34	165	81	101	132	167	140
35-39	117	46	56	89	132	99
40-44	57	16	24	46	37	44
TGF (15-44)	4.2	2.5	3.0	3.6	4.3	3.5

(1) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD, 1998 - BOLIVIA

(2) PESQUISA NACIONAL SOBRE DEMOGRAFIA E SAUDE, 1996 - BRASIL

(3) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD, 1995 - COLOMBIA

(4) ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD MATERNA E INFANTIL, 1994 - ECUADOR

(5) ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MATERNO INFANTIL, 1998 - PARAGUAY

(6) ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR, 1996 - PERU

### 4.3 Planeación de los nacimientos en los últimos 3 años

A todas las mujeres que habían informado haber tenido por los menos un nacido vivo en el período setiembre de 1995 a agosto de 1998 se les preguntó, para cada nacimiento, si habían querido quedar embarazada en ese momento, si hubiesen deseado esperar más tiempo, o si ya no querían más hijos. En el **Cuadro 4.4**, se puede ver que a nivel nacional el 82 por ciento de los nacimientos ocurridos fueron embarazos deseados en ese momento. Los nacimientos no deseados, 4 por ciento del total de mujeres no querían más hijos, fueron más frecuentes entre las mujeres con ninguna educación o entre las mayores de 30 años.

Para el total de nacimientos, el 14.1 por ciento de las mujeres querían esperar más tiempo. El deseo de esperar más tiempo, tiene una relación positiva con educación y una relación inversa con la edad de la madre. El porcentaje es casi el doble en Gran Asunción (22.3%) comparado con el Resto del País (12.2%).

### 4.4 Deseo de más hijos

A las mujeres casadas y unidas se les preguntó si deseaban tener otro hijo, en caso afirmativo, cuánto tiempo le gustaría esperar para tenerlo. A las embarazadas en el momento de la encuesta, se les hizo la misma pregunta pero poniendo énfasis en el deseo de otro hijo además del que estaban esperando en ese

momento. En el **Cuadro 4.5** se presenta la distribución de mujeres actualmente unidas según residencia, edad, número de hijos vivos tenidos y nivel de instrucción, por diferentes niveles de preferencia en sus intenciones reproductivas. A nivel nacional el 38.8 por ciento de las mujeres en unión no desea más hijos y 9.3 por ciento son esterilizadas o infértiles. Este deseo es ligeramente mayor entre las mujeres residentes en Gran Asunción y en áreas urbanas del país.

El deseo de limitar definitivamente el número de hijos aumenta con la edad. A medida que aumenta la edad, mayor es el porcentaje de mujeres unidas que no desea más hijos, pasando de 15 por ciento en el grupo de 15 - 19 años a más de 50 por ciento entre las que tienen 35 o más años de edad. El mismo patrón de preferencias reproductivas se observa con el número de hijos vivos tenidos, más de la mitad (51.6 por ciento) de las mujeres con 3 hijos declararon no desear más otro hijo.

Existe una relación inversa con los años de estudios y el deseo de no tener más hijos, la proporción que no desea más hijos entre las mujeres sin educación o que apenas completaron 2 años de estudio es de 50.2 por ciento y va descendiendo a medida que aumenta el nivel de escolaridad. Pero este deseo podría estar influenciado por la mayor paridez que experimentan las mujeres menos educadas.


**CUADRO 4.4**  
**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PLANEACION DE LOS NACIMIENTOS VIVOS EN EL PERIODO**  
**SEPTIEMBRE 1995 - AGOSTO 1998, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS.**  
**ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	PLANEACION DE NACIMIENTOS ULTIMOS 3 AÑOS			TOTAL	Nº DE CASOS
	QUERIA ENTONCES	QUERIA ESPERAR	NO QUERIA MAS HIJOS		
<b>TOTAL</b>	<b>82.0</b>	<b>14.1</b>	<b>4.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1539</b>
<b>AREA</b>					
Urbana	80.4	16.4	3.2	100.0	802
Rural	83.0	12.5	4.5	100.0	737
<b>REGION</b>					
Gran Asunción	75.7	22.3	2.0	100.0	375
Resto del País	83.4	12.2	4.4	100.0	1164
<b>EDUCACION</b>					
0-2 años	83.3	10.0	6.7	100.0	140
3-5 años	84.2	10.9	4.9	100.0	416
Primaria Completa	79.1	16.6	4.3	100.0	491
Secundaria Incompleta	81.5	17.0	1.5	100.0	265
Secundaria Completa y +	82.4	16.0	1.6	100.0	227
<b>EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO (AÑOS)</b>					
Menor a 20	81.1	17.9	1.0	100.0	219
20-29	82.9	15.8	1.3	100.0	790
30-44	80.7	9.7	9.6	100.0	530

**CUADRO 4.5**  
**DESEO ACTUAL DE TENER MAS HIJOS, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS MUJERES CASADAS /**  
**UNIDAS, 15-44 AÑOS. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	DESEO ACTUAL DE TENER MAS HIJOS								TOTAL	N° DE CASOS
	0-11 MESES	12-23 MESES	24+ MESES	INDECISA CUANDO	INDECISA	NO QUIERE MAS	ESTERILIZADA	INFERTIL		
<b>TOTAL</b>	<b>7.4</b>	<b>5.3</b>	<b>31.2</b>	<b>4.6</b>	<b>3.4</b>	<b>38.8</b>	<b>8.1</b>	<b>1.2</b>	<b>100.0</b>	<b>2386</b>
<b>AREA</b>										
Urbana	8.3	6.2	30.2	2.9	2.4	40.9	7.6	1.4	100.0	1394
Rural	6.5	4.3	32.3	6.3	4.5	36.6	8.5	1.1	100.0	992
<b>REGION</b>										
Gran Asunción	9.3	7.5	31.7	1.1	1.6	41.4	5.8	1.5	100.0	673
Resto del País	6.8	4.5	31.1	5.8	4.1	37.9	8.8	1.1	100.0	1713
<b>EDAD</b>										
15-19	8.2	6.7	63.7	5.1	1.1	15.3	0.0	0.0	100.0	130
20-24	4.6	5.9	60.7	5.0	4.7	18.0	1.1	0.0	100.0	360
25-29	7.8	5.1	44.9	4.7	5.3	28.7	3.5	0.0	100.0	494
30-34	8.0	5.7	25.4	5.6	3.6	43.2	8.0	0.5	100.0	570
35-39	7.3	7.2	11.0	4.9	2.1	52.3	13.5	1.7	100.0	469
40-44	8.5	1.6	4.2	2.1	1.8	59.2	17.5	5.1	100.0	360
<b>HIJOS NACIDOS VIVOS</b>										
0	30.8	9.2	43.7	4.9	0.9	6.5	0.0	3.9	100.0	216
1	10.9	8.3	55.0	7.0	3.2	13.2	0.7	1.7	100.0	412
2	6.7	8.8	37.7	6.6	3.5	30.5	6.1	0.1	100.0	533
3	2.3	2.4	23.6	2.3	3.0	51.6	14.0	1.9	100.0	430
4	2.4	2.6	23.0	4.0	3.7	49.5	14.3	0.5	100.0	295
5-6	2.6	2.2	17.9	3.3	5.9	56.3	10.6	1.2	100.0	302
7+	2.1	1.8	10.1	2.9	3.3	68.1	9.8	1.9	100.0	198
<b>EDUCACION</b>										
0-2 años	5.8	1.8	20.4	7.1	3.5	50.2	11.2	0.0	100.0	173
3-5 años	6.1	3.6	30.0	4.9	4.8	40.2	8.7	1.6	100.0	560
<b>Primaria</b>										
Completa	7.7	5.8	32.1	5.1	4.5	36.1	8.0	0.6	100.0	731
<b>Secundaria</b>										
Incompleta	5.8	6.2	39.0	2.8	0.6	36.8	7.6	1.2	100.0	435
<b>Secundaria</b>										
Completa y +	10.8	7.8	30.7	3.7	2.3	36.4	6.0	2.3	100.0	487

**GRAFICO 4.1**  
**DESEO ACTUAL DE TENER MAS HIJOS SEGUN EDAD:**  
**MUJERES CASADAS/UNIDAS DE 15-44 AÑOS DE EDAD, ENSMI-98**



## CAPITULO 5

# PLANIFICACION FAMILIAR: CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS

La Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil, 1998 (ENSMI-98) tuvo como uno de sus objetivos principales actualizar la información sobre conocimiento y uso de métodos de planificación familiar en el Paraguay. Esta información adquiere singular importancia no sólo como variable intermedia de la fecundidad, sino como insumo para los encargados de programas de planificación familiar y los responsables de la formulación de políticas de población y salud del país. El conocimiento del nivel de uso de los métodos anticonceptivos permite evaluar la efectividad de los programas de planificación familiar e identificar grupos con bajo acceso a los servicios y las características de las mujeres con mayor demanda insatisfecha.

En el presente capítulo se analizan los niveles de conocimiento y el uso actual de métodos anticonceptivos de acuerdo a características sociodemográficas de las mujeres en edad fértil. También se analizan las fuentes de obtención y las razones para no usar anticonceptivos. Se compara la prevalencia encontrada en la presente encuesta con los resultados de encuestas anteriores y de algunos países de América del Sur

### 5.1 Conocimiento de Métodos Anticonceptivos

El conocimiento se refiere a que las mujeres contestaron afirmativamente a la pregunta **¿Conoce o ha oído hablar de ... método anticonceptivo?**, para cada método en particular, no necesariamente a si sabe cómo usarlo correctamente, o si conoce cuáles son sus posibles contraindicaciones.

Los porcentajes de conocimiento de cada método en particular se presentan en el **Cuadro 5.1** para todas las mujeres y para las mujeres en unión. Como ya se había verificado en encuestas anteriores, el conocimiento de métodos anticonceptivos está bastante difundido entre las mujeres paraguayas, independientemente de su estado civil. Una gran mayoría conoce la píldora (94%), así como el condón (92.9%) y la inyección (92.3%). El DIU es conocido por el 80.7% y la esterilización femenina por el 78.9% de todas las mujeres. Solo un cuarto de ellas conoce la vasectomía y una minoría el norplant (5.4%).

Para las mujeres casadas o en unión, existe mayor conocimiento de prácticamente todos los métodos, también es mayor entre las mujeres casadas que residen en el Gran Asunción y en el área urbana respecto a cualquier otro lugar de residencia.

El conocimiento de los yuyos está muy difundido entre las mujeres paraguayas y especialmente entre las casadas o unidas. Los yuyos son hierbas nativas que se consumen en forma de infusión y a los cuales se les atribuyen propiedades anticonceptivas. Sin embargo esto no está demostrado científicamente, y se duda de su efectividad.

CUADRO 5.1

**CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS: PORCENTAJE DE TODAS LAS MUJERES Y MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS QUE CONOCEN ANTICONCEPTIVOS POR REGION Y AREA DE RESIDENCIA, SEGUN METODO ESPECIFICO. ENSMI-98**

METODO	TOTAL	REGION		AREA	
		GRAN ASUNCION	RESTO DEL PAIS	URBANA	RURAL
<b>TODAS LAS MUJERES</b>					
<b>N° DE CASOS</b>	<b>3598</b>	<b>1071</b>	<b>2527</b>	<b>2174</b>	<b>1424</b>
Píldora	94.0	96.7	92.9	96.3	91.0
Condón	92.9	98.2	90.8	97.1	87.7
Inyección	92.3	94.9	91.2	94.8	89.1
DIU	80.7	88.6	77.6	85.0	75.3
Esterilización femenina	78.9	87.0	75.7	85.3	70.9
Métodos vaginales	47.4	59.7	42.5	57.3	34.9
Retiro	48.0	57.0	44.4	54.1	40.3
Ritmo	51.8	71.2	44.1	63.4	37.3
Billings	32.1	44.0	27.5	41.4	20.6
Vasectomía	25.5	37.4	20.8	32.3	17.0
Norplant	5.4	6.5	4.9	6.1	4.5
Yuyos	85.0	85.7	84.8	86.3	83.4
<b>MUJERES EN UNION</b>					
<b>N° DE CASOS</b>	<b>2386</b>	<b>673</b>	<b>1713</b>	<b>1374</b>	<b>1012</b>
Píldora	96.2	98.8	95.4	98.1	94.3
Condón	95.4	97.1	94.8	96.8	93.9
Inyección	93.2	98.4	91.4	97.0	89.2
DIU	88.2	96.2	85.5	93.4	82.9
Esterilización femenina	85.3	93.7	82.4	91.4	79.0
Métodos vaginales	54.5	65.3	50.9	62.4	46.6
Retiro	52.5	75.3	44.8	66.1	38.8
Ritmo	49.6	62.8	45.0	61.7	37.2
Billings	33.4	47.6	28.6	45.2	21.5
Vasectomía	26.2	39.9	21.5	34.2	18.0
Norplant	5.2	6.5	4.8	5.6	4.8
Yuyos	91.5	91.9	91.3	92.8	90.1

En el Cuadro 5.2 se puede ver que no existen diferencias significativas entre el conocimiento de cualquier método (98.8%) y el conocimiento de un método moderno (99.3%) entre las mujeres casadas o unidas. Por área o región de residencia ambas categorías no presentan mayores diferencias.

## CUADRO 5.2

## PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS QUE CONOCEN ALGUN METODO SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	CONOCE CUALQUIER METODO	CONOCE UN METODO MODERNO <sup>1</sup>	NUMERO DE MUJERES
<b>TOTAL</b>	<b>98.8</b>	<b>99.3</b>	<b>2386</b>
<b>AREA</b>			
Urbana	99.7	99.7	1374
Rural	99.6	98.3	1012
<b>REGION</b>			
Gran Asunción	100.0	100.0	673
Resto del País	99.5	98.6	1713
<b>EDAD</b>			
15-19	100.0	99.0	133
20-24	99.5	98.4	360
25-29	99.7	98.5	494
30-34	100.0	99.6	570
35-39	99.3	99.3	469
40-44	99.4	98.9	360
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>			
0-2 años	99.2	96.1	173
3-5 años	99.1	98.2	560
Primaria Completa	100.0	99.7	731
Secundaria Completa o más	99.8	99.8	922
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA</b>			
No Trabaja	99.7	98.8	1463
Trabaja dentro de la Casa	99.3	98.6	298
Trabaja fuera de la Casa	99.7	99.7	625
<b>IDIOMA QUE HABLAN EN LA CASA</b>			
Guaraní	99.3	97.8	869
Español	100.0	100.0	394
Español y Guaraní	100.0	100.0	1079
Otro Idioma	98.2	98.2	44
<b>INDICE SOCIOECONOMICO</b>			
Bajo	99.4	97.4	613
Medio	99.8	99.8	745
Alto	99.8	99.8	1028

<sup>1</sup> Incluye DIU, condón, métodos vaginales, esterilización masculina y femenina.

## 5.2 Conocimiento del Período Fértil

El conocimiento que tienen las mujeres sobre su período fértil en el ciclo ovulatorio es muy importante considerando que en el Paraguay, como se verá más adelante, los métodos del ritmo, Billings y retiro representan en conjunto cerca del 10 por ciento del uso total. Para evaluar el grado de conocimiento, se

preguntó a todas las mujeres cuándo es más probable que puedan quedar embarazada durante el ciclo menstrual. En el **Cuadro 5.3** se resumen los resultados sobre conocimiento del ciclo reproductivo para el total de mujeres y para las que han usado abstinencia

El conocimiento correcto del período fértil es más elevado en las mujeres que han usado abstinencia (47.1%) respecto a todas las mujeres (24.8%).

Menos de la mitad de las usuarias de abstinencia (47.1%) respondió correctamente, es decir contestó que dos semanas después de la menstruación es el momento de mayor riesgo para que una mujer pueda quedar embarazada, esto indica que más de la mitad (52.9%) está usando incorrectamente los métodos de abstinencia.

Las tres cuartas partes de todas las mujeres entrevistadas no conocen el período de mayor riesgo para que una mujer pueda quedar embarazada.

### CUADRO 5.3

#### DISTRIBUCION PORCENTUAL DE TODAS LAS MUJERES Y DE LAS QUE HAN USADO ALGUNA VEZ ABSTINENCIA PERIODICA, SEGUN CONOCIMIENTO DEL PERIODO FERTIL. ENSMI-98

PERIODO FERTIL	TODAS LAS MUJERES	HAN USADO ABSTINENCIA PERIODICA
Una semana antes de la menstruación	9.5	13.1
Durante la menstruación	1.3	0.6
Una semana después de la menstruación	20.1	22.3
Dos semanas después de la menstruación	24.8	47.1
Tres semanas después de la menstruación	2.8	4.1
En cualquier tiempo	15.8	8.3
No sabe/No responde	25.7	4.4
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>3598</b>	<b>441</b>

### 5.3 Uso de Métodos Anticonceptivos: Tendencia de la Prevalencia de Uso

La prevalencia de métodos es entendida como el porcentaje de mujeres casadas o unidas que usan algún anticonceptivo en un momento determinado. A todas las mujeres se les preguntó si estaban usando actualmente algún método para no quedar embarazadas. En la ENSMI-98 la prevalencia llegó a 57.4% (incluye todos los métodos con excepción de yuyos o hierbas). La práctica anticonceptiva ha venido incrementándose continuamente en los últimos años, tal como se muestra en el **Cuadro 5.4**. Pasando de 37.6 por ciento en 1987 a 57.4 por ciento en 1998, incrementándose el uso de anticonceptivos en más del 50 por ciento en un poco más de 10 años.

Desde la encuesta anterior en 1995 (ENDSR-95), el aumento se dio con más intensidad en el área urbana, pasando de 56.2 por ciento a 65.4 por ciento. Si comparamos los resultados de 1998 con los de

1987<sup>1</sup>, se puede ver que el uso de métodos anticonceptivos aumentó con más fuerza fuera del Gran Asunción, pasando de 32 por ciento, en el resto del país, en 1987 a 54.4 por ciento en el año 1998. De acuerdo al Cuadro 5.5 y Gráfico 5.1, podemos notar que el incremento en el uso de anticonceptivos

CUADRO 5.4

**TENDENCIA DE LA PREVALENCIA DEL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS: PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	ENCUESTAS			
	EPF-1987	ENDS-90 (a)	ENDSR-95 (a)	ENSMI-98
<b>TOTAL</b>	<b>37.6</b>	<b>44.1</b>	<b>50.7</b>	<b>57.4</b>
<b>AREA</b>				
Urbana	-	53.3	56.2	65.4
Rural	-	33.5	45.0	49.3
<b>REGION</b>				
Gran Asunción	52.3	55.9	58.8	66.0
Norte	-	30.6	41.9	-
Centro-Sur	-	38.4	47.5	-
Este	-	40.7	50.2	-
Resto del País	32.0	-	-	54.4
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>				
0-2 años	-	25.6	32.6	36.5
3-5 años	25.9*	35.2	43.0	52.9
Primaria Completa	37.7	47.4	51.4	53.7
Secundaria Completa o más	60.6	61.3	64.4	69.4
<b>EDAD</b>				
15-19	22.5	31.1	37.2	42.2
20-24	37.3	37.5	49.2	57.2
25-29	43.2	49.9	56.1	55.9
30-34	38.9	49.3	57.4	57.5
35-39	38.7	50.5	57.7	64.7
40-44	31.6	41.5	48.0	56.2
45-49	-	32.7	25.9	-
<b>HIJOS NACIDOS VIVOS</b>				
0	21.7	19.4	25.0	24.9
1	34.2	40.5	51.2	60.9
2	51.9	54.2	60.0	69.0
3	50.0	55.7	60.0	69.0
4	42.4	40.3**	57.3	63.8
5-6	29.9		51.1	50.9
7 y +	14.8		36.0	42.1

(a) Mujeres de 15 a 49 años

\* Ninguna y Primaria incompleta

\*\* 4 o más hijos nacidos vivos

<sup>1</sup>En el diseño de la muestra de la Encuesta de Planificación Familiar de 1987 se tomaron dos estratos, igual que en la Encuesta de Salud Materno Infantil de 1998, Gran Asunción y Resto del País. En las encuestas de 1990 y 1995 el diseño de la muestra se basó en una división diferente.

se debió principalmente al mayor uso del DIU y en menor medida al aumento de la esterilización femenina, la inyección y el condón. El uso de métodos tradicionales permaneció casi invariable desde 1987, actualmente 1 de cada 10 mujeres casadas o unidas usan ritmo, retiro o Billings.

Aunque los yuyos (hierbas nativas) no están incluidos en la prevalencia total, deben ser tenidos en cuenta pues son usados por cerca del 5% de las mujeres casadas o unidas y representan mujeres que quieren evitar embarazos.

CUADRO 5.5

TENDENCIA DE LA PREVALENCIA DEL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS, SEGUN METODOS UTILIZADOS: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98

USO Y METODO	ENCUESTAS			
	EPF-1987	ENDS-90 (a)	ENDSR-95 (a)	ENSMI-98
<b>USAN</b>	<b>37.6</b>	<b>44.1</b>	<b>50.7</b>	<b>57.4</b>
<b>METODOS MODERNOS</b>	29.0	35.2	41.3	47.7
Píldora	13.5	13.6	13.5	13.1
DIU	5.1	5.7	7.6	11.1
Esterilización femenina	4.0*	7.4	6.8	8.0
Vasectomía	-	0.0	0.0	0.0
Inyección	3.6	5.2	6.2	7.5
Condón	2.3	2.6	6.5	7.3
Métodos vaginales	0.5	0.8	0.7	0.5
<b>METODOS TRADICIONALES</b>	8.6	8.9	9.5	9.7
Ritmo	3.8	3.3	3.0	2.8
Retiro	2.9	2.9	3.4	5.4
Billings	1.9	2.0	3.1	1.5
<b>Usan Yuyos</b>	<b>7.2</b>	<b>4.3</b>	<b>5.2</b>	<b>4.9</b>
<b>NO USAN</b>	<b>55.2</b>	<b>51.6</b>	<b>44.1</b>	<b>37.7</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>1416</b>	<b>3574</b>	<b>4586</b>	<b>2386</b>


(a) Mujeres de 15 a 49 años

\* Incluye un caso de Vasectomía

Para tener una perspectiva de las tendencias a nivel regional sobre el uso de métodos anticonceptivos, en el Cuadro 5.6 se compara a Paraguay con otros países de América del Sur. A nivel total, los porcentajes más altos de uso se dan en Brasil y Colombia. Nuestro país tiene mayor uso de anticonceptivos frente a Bolivia, donde más de la mitad de las mujeres casadas o unidas no usan métodos, y también respecto a Perú y Ecuador, si comparamos solo la prevalencia de métodos modernos.

GRAFICO 5.1

## USO ACTUAL DE METODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN UNION, EPF-87, ENDS-90, ENDSR-95/96 Y ENSMI-98



Fuente: Cuadro 5.5

En relación a cada método en particular, Paraguay tiene una mayor prevalencia de la píldora (13.1%) respecto de Bolivia, Perú y Ecuador. Similar a Colombia (12.9%) y más baja que la de Brasil (20.7%). En el uso de la inyección nuestro país (8.0%) tiene la prevalencia más alta entre los demás países comparados. El DIU es usado más frecuentemente en Perú (12.0%), Ecuador (11.8%), Colombia (11.1%) y Paraguay (11.1%). En cuanto a la esterilización femenina el uso de este método es todavía bajo (8.0%) entre las mujeres paraguayas, especialmente comparadas con las brasileras (40.1%), colombianas (25.7%) y ecuatorianas (19.8%).

En el **Cuadro 5.7** se presentan los niveles de uso actual de métodos, según método usado para todas las mujeres, para las actualmente casadas o unidas y para las mujeres no unidas (separadas, divorciadas, viudas y solteras). La prevalencia de uso de métodos anticonceptivos varía de 57.4 por ciento entre las mujeres casadas o unidas a 13.4 por cientos entre las mujeres que nunca han estado casadas.

El 41.1 por ciento de todas las mujeres en edad fértil usan actualmente métodos para planificar su familia. Entre las mujeres alguna vez unidas (separadas, divorciadas o viudas) el 25.9 por ciento de ellas usan actualmente algún método anticonceptivo.

CUADRO 5.6

## PREVALENCIA DEL USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS EN PAISES SELECCIONADOS: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 49 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98

USO Y METODO	PAIS Y PERIODO					
	BOLIVIA (1) (1998)	BRASIL (2) (1996)	COLOMBIA (3) (1995)	ECUADOR (4) (1994)	PARAGUAY (5) (1998) (a)	PERU (6) (1996)
<b>USAN</b>	<b>47.5</b>	<b>76.7</b>	<b>70.4</b>	<b>56.8</b>	<b>57.4</b>	<b>62.6</b>
<b>METODOS MODERNOS</b>	25.2	70.6	59.4	45.7	47.7	41.4
Píldora	3.8	20.7	12.9	10.2	13.1	6.2
DIU	11.1	1.1	11.1	11.8	11.1	12.0
Esterilización femenina	6.5	40.1	25.7	19.8	8.0	9.5
Vasectomía	0.0	2.6	0.7	0.1	0.0	0.2
Inyección	1.1	1.2	4.3	2.6	7.5	8.0
Condón	2.6	4.4	2.5	0.5	7.3	4.4
Métodos vaginales	0.1	0.1	1.4	0.6	0.5	0.7
Norplant	-	0.0	0.7	0.1	0.0	0.3
<b>METODOS TRADICIONALES</b>	22.3	6.1	11.0	11.1	9.7	21.2
Ritmo	20.0	3.0*	5.2	7.4	2.8	18.0
Retiro	2.3	3.1	5.8	3.5	5.4	3.2
Billings	-	-	-	0.2	1.5	-
<b>Usan Yuyos</b>	<b>0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>1.8</b>	<b>0.0</b>	<b>4.9</b>	<b>1.6</b>
<b>NO USAN</b>	<b>51.7</b>	<b>23.3</b>	<b>27.8</b>	<b>43.2</b>	<b>37.7</b>	<b>35.8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>6649</b>	<b>7584</b>	<b>6097</b>	<b>9146</b>	<b>2386</b>	<b>16885</b>

(1) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD, 1998-BOLIVIA

(2) PESQUISA NACIONAL SOBRE DEMOGRAFIA E SAUDE, 1996-BRASIL

(3) ENCUESTA NACIONAL DE DEMOGRAFIA Y SALUD, 1995-COLOMBIA

(4) ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD MATERNO INFANTIL, 1994-ECUADOR

(5) ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MATERNO INFANTIL, 1998-PARAGUAY

(6) ENCUESTA DEMOGRAFICA Y DE SALUD FAMILIAR, 1996-PERU

(a) Mujeres de 15 a 44 años

(\*) Incluye Billings

## 5.4 Diferencias en los Niveles de Uso

Las diferencias en los niveles de uso actual por región y área de residencia entre las mujeres casadas o unidas en edad fértil se presentan en el Cuadro 5.8 y Gráfico 5.2. La práctica anticonceptiva llega a 65.4% en el área urbana y a 49.3% en el área rural. La mayor prevalencia anticonceptiva se verifica en el Gran Asunción (66.0%).

## CUADRO 5.7

## USO ACTUAL DE ANTICONCEPTIVOS, SEGUN METODO, POR ESTADO CIVIL: MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98

USO Y METODO	TODAS LAS MUJERES	ESTADO CIVIL		
		CASADAS/UNIDAS	SEPARADAS/ DIVORCIADAS/ VIUDAS	SOLTERAS
<b>USAN ACTUALMENTE</b>	<b>41.1</b>	<b>57.4</b>	<b>25.9</b>	<b>13.4</b>
<b>METODOS MODERNOS</b>	<b>33.8</b>	<b>47.7</b>	<b>25.2</b>	<b>9.4</b>
Píldora	8.7	13.1	2.2	1.7
DIU	7.3	11.1	4.3	0.6
Esterilización femenina	5.2	8.0	5.3	0.0
Condón	6.2	7.3	4.5	4.4
Inyección	6.0	7.5	8.4	2.7
Métodos vaginales	0.3	0.5	0.3	0.0
<b>METODOS TRADICIONALES</b>	<b>7.3</b>	<b>9.7</b>	<b>0.7</b>	<b>4.0</b>
Ritmo	2.0	2.8	0.0	1.1
Retiro	4.2	5.4	0.7	2.4
Billings	1.1	1.5	0.0	0.4
Usan Yuyos	3.3	4.9	2.6	0.4
<b>NO USAN ACTUALMENTE</b>	<b>55.6</b>	<b>37.7</b>	<b>71.5</b>	<b>86.2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>3598</b>	<b>2386</b>	<b>201</b>	<b>1011</b>

Cabe mencionar algunas características importantes en el uso de métodos específicos según la residencia de las mujeres. El uso de la píldora es mayor fuera del Gran Asunción y en áreas rurales, alrededor de 14 por ciento de las mujeres optan por este método.

En el Gran Asunción, el DIU es el método de mayor preferencia, 17.8 por ciento de las mujeres lo utilizan, en segundo y tercer lugar de elección se ubican el condón (12.1%) y la inyección (9.0%). EL uso de la inyección anticonceptiva es más frecuente en áreas urbanas (10.1%).

En el Cuadro 5.9 se presenta el uso de cada método en particular según algunas características seleccionadas como edad, educación y número de hijos vivos tenidos por las mujeres. En cuanto a edad, ya vimos que el 57.4 por ciento de las mujeres de 15 a 44 años en unión, usa actualmente métodos anticonceptivos. El uso se incrementa desde 42.2% en las de 15 a 19 años, hasta 64.7% en el grupo de 35 a 39 años y luego desciende a 56.2% entre las de 40 a 44 años.


CUADRO 5.8

USO ACTUAL DE METODOS ANTICONCEPTIVOS POR REGION Y AREA DE RESIDENCIA, SEGUN USO Y METODO, DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98

USO Y METODO	TOTAL	REGION		AREA	
		GRANASUNCION	RESTO DEL PAIS	URBANA	RURAL
USAN ACTUALMENTE	57.4	66.0	54.4	65.4	49.3
METODOS MODERNOS	47.7	53.6	45.7	53.9	41.3
Píldora	13.1	8.4	14.8	12.1	14.2
DIU	11.1	17.8	8.9	13.4	8.8
Esterilización femenina	8.0	5.8	8.8	7.6	8.5
Condón	7.3	12.1	5.7	9.9	4.7
Inyección	7.5	9.0	7.0	10.1	4.9
Métodos vaginales	0.5	0.4	0.5	0.9	0.1
METODOS TRADICIONALES	9.7	12.4	8.8	11.4	8.0
Ritmo	2.8	5.7	1.8	4.0	1.5
Retiro	5.4	3.5	6.1	4.8	6.1
Billings	1.5	3.3	0.9	2.6	0.4
Usan Yuyos	4.9	2.8	5.7	3.3	6.7
NO USAN ACTUALMENTE	37.7	31.3	39.9	31.4	44.1
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº DE CASOS	2386	673	1713	1374	1012

GRAFICO 5.2

USO ACTUAL DE METODOS ANTICONCEPTIVOS SEGUN METODO USADO  
ENDSR-95/96 Y ENSMI-98



Fuente: Cuadro 5.5

■ ENSR 95/96 □ ENSMI 98

A partir de los grupos de edades 15 a 19 hasta 35 a 39 años se nota una mayor preferencia de las mujeres por el uso de la píldora, en las edades 35 a 49 años la elección se orienta a un método definitivo (esterilización femenina, entre 14 y 18 por ciento). El DIU es más usado en el grupo de 25 a 34 años. La preferencia por la inyección anticonceptiva se da con más fuerza en las edades 15 a 24 años, desde los 25 años en adelante se puede ver una declinación en su uso.

Respecto a la **educación** de las mujeres, se observa una asociación directa entre el aumento del nivel de instrucción y el uso de métodos de planificación familiar que va desde 36.5% para las mujeres sin ninguna educación o con dos años aprobados, hasta 69.4% para aquellas que alcanzaron el nivel secundario o superior.

Con relación al **número de hijos vivos** y la práctica anticonceptiva, se puede notar que en el Paraguay una de cada cuatro mujeres empieza a usar algún método sin tener ningún hijo. Las mujeres con 2 o 3 hijos son las que más usan anticonceptivos (69%). Existe un fuerte interés por parte de las mujeres por limitar el tamaño de su familia a partir del tercer hijo, lo que suele estar asociado a una mayor relevancia de la esterilización femenina.

El idioma habitualmente hablado en el hogar determina diferencias importantes en cuanto al uso de métodos anticonceptivos (**Cuadro 5.10, Gráfico 5.3**). Se observa un aumento en la prevalencia anticonceptiva en relación al idioma hablado, que va de menor a mayor uso de métodos según cual sea el idioma hablado: guaraní solo (46.3%), guaraní/español (61.4%), español solo (75.5%) y otro idioma (72.1%). El uso de métodos modernos entre las mujeres que sólo hablan guaraní es notoriamente más bajo (36.7%) comparado con las que hablan guaraní y español (50.7%) o sólo español (66.5%).

El uso del DIU, el condón y la inyección es más frecuente entre las mujeres que hablan guaraní y español y entre las que solo hablan español. Las mujeres que hablan otro idioma (la mayoría hablan portugués) recurren preferentemente a la esterilización como método para limitar el número de hijos.

## 5.5 Promedio de Hijos y de Edad al Iniciar el Uso de Anticonceptivos

EL análisis entre el promedio de hijos vivos y la edad que tienen las mujeres cuando usan por primera vez un método anticonceptivo permite saber qué tan temprano durante su vida reproductiva inician la planificación familiar, y si lo hacen con intenciones de limitar o espaciar su prole.

En el **Cuadro 5.11** se presenta el promedio de hijos vivos y la edad promedio que tenían las mujeres cuando usaron por primera vez algún método anticonceptivo de acuerdo al área de residencia, al nivel de instrucción y al primer método usado.

En el Paraguay, las mujeres esperan tener en promedio al menos un hijo vivo ó 21.9 años de edad, para empezar a usar algún anticonceptivo. Entre el área urbana y rural existe una diferencia de más de un hijo nacido vivo a favor de las mujeres rurales, quienes empiezan a usar algún método cuando ya tienen por lo menos 2.1 hijos vivos y 22.9 años en promedio.

De acuerdo al nivel de instrucción, se observa una tendencia decreciente entre el promedio de 3.1 hijos vivos que tienen las mujeres sin educación o con dos años aprobados y el promedio de 0.6 hijos vivos entre las que tienen educación secundaria completa o superior.

CUADRO 5.9

USO ACTUAL DE METODOS ANTICONCEPTIVOS, POR METODO, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	USO ACTUAL		METODO									NO USAN ACTUALMENTE		TOTAL	N° DE CASOS
	TOTAL	Píldora	DIU	Esterilización Femenina*	Condón	Inyección	Métodos Vaginales	Ritmo	Retiro	Billings	Yuyos	TOTAL			
<b>TOTAL</b>	<b>57.4</b>	<b>13.1</b>	<b>11.1</b>	<b>8.0</b>	<b>7.3</b>	<b>7.5</b>	<b>0.5</b>	<b>2.8</b>	<b>5.4</b>	<b>1.5</b>	<b>4.9</b>	<b>37.7</b>	<b>100.0</b>	<b>2386</b>	
<b>EDAD</b>															
15-19	42.2	13.0	5.0	0.0	7.6	10.3	0.0	1.1	5.2	0.0	2.4	55.4	100.0	133	
20-24	57.2	16.6	11.0	1.1	8.0	14.7	0.1	1.2	3.7	0.9	3.7	39.1	100.0	360	
25-29	55.9	14.4	15.0	3.5	5.8	7.4	0.4	1.4	6.0	2.2	6.1	37.9	100.0	494	
30-34	57.6	10.8	11.0	8.0	9.3	7.2	0.6	4.8	4.8	1.1	5.1	37.4	100.0	570	
35-39	64.7	15.0	11.3	13.5	7.1	5.2	0.6	3.2	7.3	1.4	2.8	32.6	100.0	469	
40-44	56.2	9.4	8.2	17.5	6.2	3.1	0.7	3.4	5.2	2.5	7.8	36.0	100.0	360	
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>															
0-2 años	36.5	11.5	3.5	11.2	2.3	2.5	0.0	0.3	5.3	0.0	8.5	55.0	100.0	173	
3-5 años	52.9	15.9	7.7	8.7	3.5	5.6	0.0	1.9	9.4	0.3	5.4	41.8	100.0	560	
Primaria Completa	53.7	14.1	9.0	8.0	7.2	7.0	0.4	2.3	4.3	1.3	7.2	39.1	100.0	731	
Secundaria															
Completa o más	69.4	10.7	17.5	6.7	11.8	10.9	1.0	4.5	3.3	3.1	1.9	28.7	100.0	922	
<b>HIJOS NACIDOS VIVOS</b>															
0	24.9	9.5	0.1	0.0	4.5	6.0	0.5	2.1	1.5	0.7	2.0	73.1	100.0	209	
1	60.9	13.5	13.6	0.7	9.3	13.2	0.0	2.6	6.2	1.9	3.4	35.8	100.0	396	
2	69.0	14.7	15.1	5.7	10.9	10.1	0.7	5.2	4.7	2.1	4.2	26.8	100.0	529	
3	69.0	10.4	15.7	14.3	9.2	6.6	1.1	3.4	6.2	2.1	5.3	25.7	100.0	412	
4	63.8	17.5	14.5	13.5	5.6	5.2	0.5	1.9	3.1	2.2	5.2	30.9	100.0	305	
5-6	50.9	15.2	4.7	11.0	5.3	5.9	0.2	1.7	6.1	0.8	8.5	40.6	100.0	300	
7 y +	42.1	9.7	6.9	10.1	2.5	2.7	0.0	0.6	9.6	0.0	5.9	52.0	100.0	235	

\* Incluye 1 caso de Vasectomía


CUADRO 5.10

**USO ACTUAL DE ANTICONCEPTIVOS, SEGUN METODO E IDIOMA HABITUALMENTE HABLADO EN EL HOGAR: MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98**

USO Y METODO	TOTAL PAIS	IDIOMA HABITUALMENTE HABLADO EN EL HOGAR			OTRO
		GUARANI	GUARANI/ ESPAÑOL	ESPAÑOL	
<b>USAN ACTUALMENTE</b>	<b>57.4</b>	<b>46.3</b>	<b>61.4</b>	<b>75.5</b>	<b>72.1</b>
<b>METODOS MODERNOS</b>	<b>47.7</b>	<b>36.7</b>	<b>50.7</b>	<b>66.5</b>	<b>67.4</b>
Píldora	13.1	14.7	10.8	13.0	19.6
DIU	11.1	8.0	13.6	16.7	0.0
Esterilización femenina	8.0	6.4	6.4	8.9	41.1
Condón	7.3	4.0	8.9	14.4	1.7
Inyección	7.5	3.7	10.1	12.7	5.0
Métodos vaginales	0.5	0.1	0.9	0.7	0.0
<b>METODOS TRADICIONALES</b>	<b>9.7</b>	<b>9.6</b>	<b>10.7</b>	<b>8.9</b>	<b>4.7</b>
Ritmo	2.8	1.3	4.0	4.4	0.0
Retiro	5.4	7.4	4.0	3.5	4.7
Billings	1.5	0.8	2.7	1.0	0.0
Usan Yuyos	4.9	7.6	4.1	0.6	0.0
<b>NO USAN ACTUALMENTE</b>	<b>37.7</b>	<b>46.1</b>	<b>34.5</b>	<b>24.0</b>	<b>27.9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>2386</b>	<b>869</b>	<b>1079</b>	<b>394</b>	<b>44</b>

GRAFICO 5.3

**USO ACTUAL DE ANTICONCEPTIVOS SEGUN IDIOMA HABLADO. ENSMI-98**



Analizando el primer método usado, se puede ver que con excepción de los vaginales y el DIU, la edad promedio para comenzar a usar un método temporal, va de 20.4 a 22.6 años. El promedio de hijos vivos, al primer uso para todos los métodos temporales varía de 0.3 a 2.5 hijos.

Las mujeres que nunca antes habían usado un método eligieron como primer método la esterilización femenina cuando tenían 30 años de edad y ya habían tenido 5 hijos vivos en promedio.

## 5.6 Fuente de Suministro

A las usuarias actuales de métodos modernos se les preguntó el lugar donde habían obtenido el método. En el Cuadro 5.12 y Gráfico 5.4, se presentan los resultados para la fuente de abastecimiento de los métodos modernos.

La “fuente” de obtención de anticonceptivos se clasificó en tres categorías: sector público, sector privado y otra fuente. Dentro de cada categoría se desagregan las principales instituciones o puntos de provisión de métodos. En el Paraguay, existen dos fuentes principales de suministro de métodos anticonceptivos, el Ministerio de Salud Pública (26.9%) y las farmacias (43.5%) que en conjunto cubren el 70% de la demanda.

CUADRO 5.11

NUMERO PROMEDIO DE HIJOS VIVOS Y EDAD PROMEDIO AL PRIMER USO DE ANTICONCEPTIVOS, POR CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD QUE ALGUNA VEZ HAN USADO ANTICONCEPTIVOS. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	PROMEDIO DE HIJOS VIVOS	EDAD PROMEDIO AL PRIMER USO
<b>TOTAL</b>	<b>1.3</b>	<b>21.9</b>
<b>AREA</b>		
Urbana	0.8	21.2
Resto del País	2.1	22.9
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>		
0-2 años	3.1	24.5
3-5 años	2.2	22.7
Primaria Completa	1.4	21.9
Secundaria Completa o más	0.6	21.1
<b>PRIMER METODO</b>		
Billings	0.3	22.6
Ritmo	0.5	21.1
Condón	0.6	20.4
Métodos Vaginales	0.8	25.0
Inyección	1.0	21.3
Retiro	1.1	20.8
Píldora	1.4	21.9
Yuyos	2.2	22.3
DIU	2.5	24.6
Esterilización Femenina y Vasectomía	5.0	30.2
Otros	3.0	21.0

En encuestas anteriores el aporte del CEPEP como fuente de abastecimiento de servicios fue mayor (EPF-1987: 13.6%; ENDS-90: 8.6%, ENDSR-95:7.0% y ENSMI-98: 3.6%). Cabe mencionar que a partir del año 1993, la institución cerró varias clínicas y enfatizó los servicios basados en la comunidad -principalmente rural- y en programas que implicaban asociación con instituciones de salud y con médicos privados de todo el país. Debido a ello, la mayor parte de las usuarias no identifican a los distribuidores comunitarios y a los médicos asociados privados con el CEPEP.

CUADRO 5.12


**FUENTE DE OBTENCION DE ANTICONCEPTIVOS MODERNOS, SEGUN FUENTE Y METODO: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD QUE USAN ACTUALMENTE METODOS. ENSMI-98**

FUENTE	TOTAL*	PILDORA	DIU	CONDON	ESTERILIZ. FEMENINA**	INYECCION
<b>SECTOR PUBLICO</b>	<b>29.7</b>	<b>38.8</b>	<b>48.5</b>	<b>6.3</b>	<b>41.2</b>	<b>8.3</b>
Ministerio de Salud Pública	26.9	38.3	44.3	6.3	30.4	8.0
Hospital Militar/Policial	0.2	0.0	0.8	0.0	0.3	0.0
Hospital de Clínicas	0.4	0.0	1.3	0.0	0.5	0.0
Cruz Roja	1.1	0.4	0.5	0.0	5.9	0.0
Instituto de Previsión Social	1.1	0.1	1.6	0.0	4.1	0.3
<b>SECTOR PRIVADO</b>	<b>63.5</b>	<b>55.4</b>	<b>50.1</b>	<b>79.7</b>	<b>46.2</b>	<b>89.6</b>
Sanatorio/Hospital Privado	11.2	1.1	24.2	0.1	36.2	1.5
Clínica/Médico Privado	5.2	2.3	14.9	0.0	5.7	2.6
Farmacia	43.5	51.2	0.0	79.1	0.0	84.0
CEPEP	3.6	0.8	11.0	0.5	4.3	1.5
<b>OTRA FUENTE</b>	<b>6.7</b>	<b>5.8</b>	<b>1.2</b>	<b>14.0</b>	<b>12.5</b>	<b>2.1</b>
Brasil/Argentina	2.2	0.6	0.6	0.0	12.2	0.0
OTRO	4.3	5.2	0.6	13.4	0.3	2.1
No sabe/No responde	0.2	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N° DE CASOS</b>	<b>1390</b>	<b>369</b>	<b>290</b>	<b>245</b>	<b>210</b>	<b>260</b>

\* Incluye 16 casos de métodos vaginales. \*\* 1 caso de vasectomía

En cuanto a cada método en particular, la píldora es adquirida principalmente en las farmacias (51.2%) y en los Centros y Puestos del Ministerio de Salud Pública (38.3 %). También el Ministerio de Salud es el principal proveedor del DIU (44.3%), casi 40% de las usuarias actuales de este método lo obtiene a través de clínicas o médicos privados y 11.0 por ciento de la demanda del DIU es satisfecho por el CEPEP.

El condón (79.1%) y la inyección (84.0%) son proveídos en mayor proporción por las farmacias. La demanda por esterilización femenina es satisfecha por el sector público en 41.2% y en 46.2% por el sector privado, otra fuente relativamente importante para la esterilización son los hospitales de la Argentina y del Brasil (12.2%).



A nivel de las dos regiones conformadas para este estudio, Gran Asunción y Resto del País, se pueden señalar algunos puntos relevantes presentados en el **Cuadro 5.13**:

- El sector público tiene mayor importancia en el Resto del País como fuente de obtención de métodos modernos. Mientras que el sector privado, la farmacia y el CEPEP tienen mayor participación en el Gran Asunción.
- La mayor demanda por la píldora se produce en las farmacias del Gran Asunción (75.3%). El DIU es obtenido por las usuarias del Gran Asunción en mayor medida del sector privado (54.5%). Situación que cambia en el Resto del País, donde el sector público es el principal proveedor de este método (62.2%). El CEPEP se destaca como proveedor del DIU en el Gran Asunción (16.7%).
- La inyección anticonceptiva es proveída en un alto porcentaje por las farmacias de todo el país, Gran Asunción (92.0%) y Resto del País (80.5%).
- Casi la mitad (48.0%) de las esterilizaciones femeninas del Gran Asunción se practican en el sector público, un poco más de un tercio (36.8%) en el sector privado y 15.2% en el CEPEP.
- En el Resto del País se realizan más esterilizaciones femeninas en establecimientos privados (43.1%) que en establecimientos del sector público (39.5%) y 15% son hechas en Brasil o Argentina.

## CUADRO 5.13

## FUENTE DE OBTENCION DE CUATRO PRINCIPALES METODOS MODERNOS, SEGUN REGION: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD QUE USAN ANTICONCEPTIVOS. ENSMI-98

REGION Y METODO	FUENTE DE OBTENCION							TOTAL	Nº DE CASOS
	FARMACIA	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	CEPEP	ARGENTINA BRASIL	OTRO	NO SABE		
<b>GRAN ASUNCION</b>									
<b>TOTAL</b>	<b>39.2</b>	<b>22.6</b>	<b>29.1</b>	<b>8.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>100.0</b>	<b>312</b>
Píldora	75.3	19.7	4.8	0.0	0.0	0.2	0.0	100.0	72
DIU	0.0	28.7	54.5	16.7	0.0	0.1	0.0	100.0	105
Inyección	92.0	1.1	5.8	0.1	0.0	1.0	0.0	100.0	83
Esteril.Femenina*	0.0	48.0	36.8	15.2	0.0	0.0	0.0	100.0	52
<b>RESTO DEL PAIS</b>									
<b>TOTAL</b>	<b>33.3</b>	<b>39.9</b>	<b>17.2</b>	<b>2.7</b>	<b>3.7</b>	<b>3.1</b>	<b>0.1</b>	<b>100.0</b>	<b>817</b>
Píldora	45.5	43.4	3.0	1.0	0.7	6.4	0.0	100.0	297
DIU	0.0	62.2	28.6	7.2	1.0	1.0	0.0	100.0	185
Inyección	80.5	11.4	3.4	2.1	0.0	2.5	0.0	100.0	177
Esteril.Femenina	0.0	39.5	43.1	1.6	15.2	0.3	0.3	100.0	158

\* Incluye 1 caso de Vasectomía

## 5.7 Tiempo a la Fuente

Una manera de medir el acceso que tienen las mujeres para obtener el método anticonceptivo es a través del tiempo que ellas necesitan para llegar a la fuente de aprovisionamiento.

A las usuarias actuales de métodos modernos se les preguntó cuánto tiempo les tomaba llegar desde sus casas a la fuente de suministro. A las no usuarias, se les preguntó si conocían un lugar para obtener métodos anticonceptivos y el tiempo que les tomaría llegar desde sus casas hasta dicho sitio.

El Cuadro 5.14, presenta la distribución porcentual de usuarias actuales de métodos modernos y de no usuarias por tiempo (en minutos) a la fuente de suministro de anticonceptivos, según área de residencia. Más de la mitad de las usuarias de métodos modernos (60.6%) declararon que pueden llegar a la fuente de abastecimiento en menos de 30 minutos. En el área urbana las tres cuartas partes de las usuarias actuales pueden obtener su método en ese tiempo, mientras que en zonas rurales esta situación sólo se da en un poco más de un tercio de las mujeres.

El acceso por parte de la población a métodos modernos, (Gráfico 5.5) medido a través de la percepción sobre el tiempo para llegar a la fuente de anticoncepción, ha mejorado desde el año 1990 cuando sólo un 43.3% de las mujeres de todo el país declararon poder llegar a una fuente de suministro en menos de 30 minutos, llegando a 58.2% en 1995 y a 60.6% en el año 1998. También en el área rural el acceso mejoró desde 1990 donde más de la mitad de las mujeres (54.2%) necesitaban más de una hora para aprovisionarse de métodos modernos, proporción que se redujo a 37.5% en 1998.

Entre las no usuarias de anticonceptivos, cerca de 20% de las mujeres que residen en áreas rurales no conocen donde proveerse de métodos de planificación familiar.

## CUADRO 5.14

**TIEMPO A LA FUENTE DE ANTICONCEPCION: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIAS DE METODOS MODERNOS Y NO USUARIAS DE METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, POR TIEMPO PARA LLEGAR A LA FUENTE DE ANTICONCEPCION SEGUN AREA DE RESIDENCIA. ENSMI-98**

MINUTOSA LA FUENTE DE ANTICONCEPCION	USUARIAS DE METODOS MODERNOS *			NO USUARIAS ** DE METODOS ANTICONCEPTIVOS		
	URBANO	RURAL	TOTAL	URBANO	RURAL	TOTAL
< 30 minutos	75.1	35.6	60.6	66.0	24.8	46.5
30-59	11.3	25.1	16.4	12.4	21.0	16.5
60 o más	7.6	37.5	18.6	4.9	30.6	17.0
No sabe tiempo	6.1	1.8	4.5	5.1	3.9	4.5
No sabe donde ir	NA	NA	NA	11.7	19.8	15.5
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>787</b>	<b>393</b>	<b>1180</b>	<b>813</b>	<b>570</b>	<b>1383</b>

\* Excluye Esterilización femenina y vasectomía

\*\* Mujeres no usuarias que son fértiles y desean usar algún método en el futuro.

## 5.8 Razones para Uso Actual

Como se mencionó en el Capítulo 4 existen fuertes motivaciones de las mujeres paraguayas para el espaciamiento y limitación del número de hijos. En este punto se analizan las razones del uso actual de métodos anticonceptivos, para espaciar o para limitar los nacimientos. En el Cuadro 5.15 y Gráfico 5.6, se ve que del total de usuarias de anticonceptivos, el 52.3 por ciento utiliza para espaciar los nacimientos y, el 37.6 por ciento para limitar su fecundidad, es decir para no tener más hijos. No se observan diferencias significativas entre área urbana y rural, como tampoco entre regiones.

Como es de esperar, las mujeres jóvenes usan más la anticoncepción para espaciar los nacimientos que para limitar el número de ellos, esta relación se invierte a medida que avanza la edad y así a partir de los 35 años, aumenta la proporción que usa para limitar la cantidad de hijos.


Respecto al nivel de instrucción, se puede ver que a medida que aumentan los años de estudios, se incrementa el porcentaje de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos para espaciar los embarazos.

Cuando el número de hijos vivos es menor a tres, el motivo principal de uso es para espaciar los nacimientos (más de 60 por ciento), en cambio entre las mujeres que tienen más de 3 hijos su motivación principal de uso es para limitar el número de nacimientos.


**GRAFICO 5.5**

**TIEMPO A LA FUENTE DE ANTICONCEPTIVOS**


**ENDSR - 90**




**ENDSR - 95/96**



**ENSMI - 98**





## 5.9 Uso Actual y Método Preferido a Usar

A todas las usuarias actuales, se les preguntó si seguirían usando el mismo método o preferirían usar otro distinto, en caso negativo, se les preguntó cuál método preferiría usar. Los resultados para cada método se presentan en el **Cuadro 5.16**. Cuando en el punto de intersección el método usado actualmente y el preferido coinciden, puede suponerse que existe satisfacción con el uso del método actual. Por el contrario, los porcentajes que se ubican por arriba y por debajo de la diagonal corresponden a mujeres no satisfechas con el anticonceptivos usado.

Es interesante destacar que cerca del 90 por ciento de las mujeres esterilizadas prefiere ese método a otro, también las usuarias del DIU en una proporción elevada (82.8%) no cambiaría el dispositivo por ningún otro método. Entre las mujeres que usan actualmente el condón y la inyección alrededor de un 26 por ciento estaría interesada en cambiar de método.

Entre las usuarias de métodos tradicionales (Billings, ritmo y retiro), 1 de cada 4 mujeres desearían usar cualquier otro método diferente al actual. Casi un tercio de las usuarias de yuyos desearía cambiar a otro método anticonceptivo.

En general, si las mujeres cambiaran su método actual las mayores preferencias serían para el DIU y la inyección.

CUADRO 5.15

**RAZON PARA USAR ANTICONCEPTIVOS, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS: MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD QUE USAN ANTICONCEPTIVOS. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	RAZON DE USO				TOTAL	N° DE CASOS
	ESPACIAR	NO MAS HIJOS	OTRAS RAZONES	NO SABE/ NO RESPONDE		
<b>TOTAL</b>	54.1	36.0	9.2	0.7	100.0	1803
<b>AREA</b>						
Urbana	54.1	36.5	8.6	0.7	100.0	1138
Rural	54.1	35.3	10.0	0.5	100.0	665
<b>REGION</b>						
Gran Asunción	56.1	33.6	9.6	0.7	100.0	565
Resto del País	53.2	37.0	9.0	0.7	100.0	1238
<b>EDAD</b>						
15-19	90.0	4.4	4.0	1.5	100.0	124
20-24	86.0	9.5	4.4	0.1	100.0	296
25-29	72.6	20.7	5.7	0.9	100.0	359
30-34	52.9	39.8	6.9	0.4	100.0	404
35-39	27.7	57.3	14.6	0.4	100.0	364
40-44	10.3	70.0	18.3	1.4	100.0	256
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>						
0-2 años	32.4	53.8	9.8	4.0	100.0	97
3-5 años	50.2	38.6	11.0	0.1	100.0	354
Primaria Completa	53.3	36.6	9.2	0.9	100.0	519
Secundaria Completa o más	59.6	31.8	8.2	0.4	100.0	833
<b>IDIOMA QUE HABLAN EN LA CASA</b>						
Guaraní	50.9	38.9	9.6	0.6	100.0	534
Español	60.5	31.8	7.6	0.1	100.0	376
Español y Guaraní	55.3	34.9	8.6	1.1	100.0	859
Otro Idioma (Portugués)	36.8	43.3	19.9	0.0	100.0	34
<b>HIJOS ACTUALMENTE VIVOS</b>						
0	86.8	2.2	10.1	0.9	100.0	188
1	86.9	7.7	5.2	0.1	100.0	312
2	62.0	27.4	10.5	0.4	100.0	434
3	34.3	55.5	8.7	1.4	100.0	324
4	36.8	51.6	11.6	0.0	100.0	236
5	32.5	54.4	12.9	0.2	100.0	127
6 y +	19.5	71.4	7.4	1.7	100.0	182
<b>METODO USADO</b>						
Esterilizadas	0.0	59.3	40.6	0.0	100.0	210
Métodos reversibles	63.1	31.6	4.7	0.6	100.0	1178
Métodos tradicionales	56.2	36.7	6.2	0.8	100.0	271
Yuyos	57.1	35.6	4.9	2.4	100.0	144

CUADRO 5.16

## DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS, CASADAS Y UNIDAS POR METODO USADO ACTUALMENTE, SEGUN METODO PREFERIDO A USAR. ENSMI-98

METODO PREFERIDO	TOTAL USUARIAS ACTUALES METODOS							
	Píldora	DIU	Condón	Inyección	Métodos Vaginales	Esterilizac. Femenina	Billings/Ritmo/Retiro	Yuyos
Píldora	79.4	0.0	2.2	5.9	0.0	2.7	8.6	6.3
DIU	8.4	82.8	10.2	11.0	6.3	1.6	3.2	7.3
Condón	0.1	1.0	74.2	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0
Inyección	3.8	0.9	3.7	74.5	13.2	2.6	4.5	3.1
Métodos Vaginales	0.4	0.0	0.4	0.0	69.8	0.0	0.0	0.1
Esterilización	2.2	3.6	2.9	3.3	0.6	87.8	1.7	2.5
Billings/Ritmo/Retiro	0.2	1.0	0.1	1.3	0.0	2.2	77.3	0.0
Yuyos	1.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	69.2
No Sabe/No Responde	4.5	9.5	6.2	4.0	9.5	2.4	4.3	11.7
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>308</b>	<b>334</b>	<b>135</b>	<b>207</b>	<b>17</b>	<b>210</b>	<b>159</b>	<b>135</b>

## 5.10 Percepción de usuarias actuales sobre el servicio recibido

A todas las usuarias actuales de métodos anticonceptivos modernos que dijeron haber obtenido el método en los establecimientos del Ministerio de Salud, o en clínicas o médicos privados en Paraguay, en el extranjero (Argentina, Brasil), o en el CEPEP, se les preguntó *¿Cuánto tiempo esperó para ser atendida?*. En el Cuadro 5.17, se presentan los resultados para tres métodos (píldora, DIU e Inyección) y el tiempo que esperó la usuaria para ser atendida. Casi la mitad de las mujeres (48.2 por ciento) esperó 30 minutos o más para recibir la píldora, o el DIU, o la inyección.

Más de un cuarto de las usuarias (27.5 por ciento) esperaron una hora o más para recibir cualquiera de los tres métodos mencionados

CUADRO 5.17

## TIEMPO DE ESPERA PARA SER ATENDIDA SEGUN TRES METODOS MODERNOS: PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS ATENDIDAS EN CLINICAS. ENSMI-98

METODO	PORCENTAJE		Nº DE CASOS
	>= 30 MINUTOS	>= 1 HORA	
Píldora	47.6	23.9	157
DIU	49.7	30.2	209
Inyección	40.2	26.1	40
<b>TOTAL</b>	<b>48.2</b>	<b>27.5</b>	<b>406</b>

La encuesta también indagó aspectos relacionados con la calidad de atención en los servicios clínicos donde la usuaria recibió atención en planificación familiar.

Se les hizo tres preguntas: Si recibió consejos e información sobre diferentes opciones de anticonceptivos; si la clínica, centro o puesto estaba limpio y confortable y si el establecimiento tenía adecuada privacidad. Luego se construyó un índice de acuerdo a la siguiente categorización: a las que respondieron afirmativamente a las tres preguntas se las clasificó en la categoría **muy bueno**; a las que contestaron afirmativamente en una o dos de las tres preguntas se las ubicó en la categoría **bueno/regular** y a las que no dieron ninguna respuesta positiva en el grupo **malo**.

En el **Cuadro 5.18** se presentan los resultados obtenidos. Más del 70 por ciento de las usuarias de cualquiera de los tres métodos modernos dijo que recibió información adecuada sobre métodos anticonceptivos, encontró la clínica limpia y confortable y tuvo privacidad adecuada, pero varía de 66.4 por ciento (píldora) hasta 81.9 por ciento (inyección), según el método anticonceptivo.

CUADRO 5.18

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES USUARIAS POR GRADO DE SATISFACCION CON EL SERVICIO RECIBIDO EN CLINICAS, SEGUN TRES METODOS. ENSMI-98**

METODO	TOTAL	OPINION CON EL SERVICIO RECIBIDO			Nº DE CASOS
		MUY BUENO	BUENO/REGULAR	MALO	
Píldora	100.0	64.4	34.5	1.2	157
DIU	100.0	73.7	26.3	0.0	209
Inyección	100.0	81.9	17.8	0.4	40
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>70.8</b>	<b>28.8</b>	<b>0.5</b>	<b>406</b>

### 5.11 Esterilización Femenina

En el Paraguay, la prevalencia anticonceptiva de la esterilización femenina es todavía baja en relación con otros países de la región, como vimos anteriormente (Cuadro 5.6). De acuerdo al **Cuadro 5.19** podemos notar que del total de las usuarias actuales casadas o unidas, apenas el 12.9 por ciento se encuentra esterilizada. Esta proporción es mayor entre las mujeres rurales y en el Resto del País.

En relación a la edad, a partir de los 35 años aumenta el porcentaje de mujeres que optan por la esterilización. Esto es comprensible pues las más jóvenes aun no tienen cumplido su ideal reproductivo.

Contrariamente a los patrones habituales de mayor prevalencia en las mujeres con más educación, en el caso de la esterilización, son las que no tienen educación o con primaria incompleta las que en mayor porcentaje están esterilizadas. Esto es porque en general recurren a la esterilización las que tienen mayor paridad.

Respecto al número de hijos vivos, se observa que a partir del tercer hijo existe un aumento en la preferencia por la anticoncepción quirúrgica.

A las mujeres casadas o unidas de 15 a 44 años, que estaban esterilizadas al momento de la encuesta, se les preguntó si estaban satisfechas con la operación. El **Cuadro 5.20** muestra que el 82.9 por ciento reportó conformidad con la decisión de operarse para no tener más hijos. Existen muy pocas variaciones en los porcentajes de mujeres satisfechas según las diversas características analizadas.

**CUADRO 5.19**

**PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD USUARIAS DE METODOS QUE ESTAN ESTERILIZADAS, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	PORCENTAJE	Nº DE CASOS
<b>TOTAL</b>	<b>12.9</b>	<b>1599</b>
<b>AREA</b>		
Urbana	11.0	974
Rural	15.3	625
<b>REGION</b>		
Gran Asunción	8.5	477
Resto del País	14.7	1122
<b>EDAD</b>		
15-19	0.0	68
20-24	1.8	244
25-29	5.7	326
30-34	12.7	378
35-39	20.1	341
40-44	27.3	242
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>		
0-2 años	24.8	92
3-5 años	14.9	334
Primaria Completa	13.2	485
Secundaria Completa o más	9.4	688
<b>NUMERO DE HIJOS VIVOS</b>		
0	0.0	73
1	1.1	263
2	7.8	405
3	19.2	310
4	19.5	226
5	17.0	122
6 y más	21.0	200

## CUADRO 5.20

## PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS ESTERILIZADAS QUE REPORTARON SATISFACCION CON EL METODO, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	PORCENTAJE	Nº DE CASOS
<b>TOTAL</b>	<b>82.9</b>	<b>201</b>
<b>AREA</b>		
Urbana	84.5	113
Rural	81.4	88
<b>REGION</b>		
Gran Asunción	83.4	48
Resto del País	82.8	153
<b>EDAD</b>		
20-24	*	4
25-29	*	14
30-34	73.6	54
35-39	87.5	61
40-44	86.1	68
<b>EDAD AL TIEMPO DE ESTERILIZARSE</b>		
15-24	*	22
25-29	82.5	48
30-34	84.7	71
35-39	84.6	52
40-44	*	8
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>		
0-2 años	*	22
3-5 años	78.4	45
Primaria Completa	83.6	61
Secundaria Completa y más	87.5	73
<b>NUMERO DE HIJOS VIVOS</b>		
1	*	3
2	74.5	28
3	81.8	57
4	88.5	41
5	*	24
6 y más	85.3	48

\* Menos de 25 casos



## CAPITULO 6

# NO USUARIAS DE ANTICONCEPTIVOS Y NECESIDAD DE SERVICIOS

En este capítulo se analiza a las mujeres casadas o unidas de 15 a 49 años que actualmente no usan anticonceptivos y las razones de no uso o de discontinuación de uso para las que usaron en el pasado. También se presenta la demanda potencial de los servicios de planificación, tomando como indicador el deseo y el método preferido para uso actual o futuro. Además, la población no cubierta con servicios de planificación familiar expuesta a un embarazo no deseado.

Asimismo, se incluyen las características de las mujeres usuarias actuales o anteriores de yuyos, no en forma exclusiva, sino que pueden estar usando otro método al mismo tiempo. Los datos incluyen todas las mujeres, no sólo las casadas y unidas.

CUADRO 6.1

## RAZON PARA NO USAR ANTICONCEPTIVOS POR REGION Y AREA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS QUE NO USAN ANTICONCEPTIVOS, ENSMI-98

RAZON PARA NO USAR	TOTAL PAIS	REGION		AREA	
		GRAN ASUNCION	RESTO DEL PAIS	URBANA	RURAL
<b>RELACIONADAS CON EMBARAZO FERTILIDAD Y ACTIVIDAD SEXUAL</b>	<b>76.7</b>	<b>82.7</b>	<b>75.0</b>	<b>82.7</b>	<b>72.2</b>
Embarazada actualmente	31.4	37.4	29.8	35.0	28.8
Postparto y lactancia	17.7	4.7	21.2	11.2	22.5
Deseo de embarazo	12.6	20.2	10.6	17.0	9.4
Menopausia/sub fecunda/operada	10.7	13.8	9.9	14.4	8.3
Sin vida sexual	4.2	6.6	3.5	5.4	3.3
<b>OTRAS RAZONES</b>	<b>23.3</b>	<b>17.3</b>	<b>25.0</b>	<b>17.3</b>	<b>27.8</b>
Razones de salud	4.3	3.7	4.4	4.6	4.0
Accesibilidad (geográfica, económica)	4.2	0.0	5.3	0.5	6.9
No le gusta	4.0	2.8	4.3	4.0	4.0
No conoce métodos	2.0	1.3	2.2	0.7	3.0
Compañero se opone	1.7	0.8	2.0	0.8	2.4
Fatalismo	1.7	0.0	2.1	0.7	2.4
Miedo a efectos colaterales	1.3	1.9	1.1	1.0	1.5
Otra	4.2	6.8	3.5	5.0	3.6
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>786</b>	<b>196</b>	<b>590</b>	<b>407</b>	<b>379</b>

## 6.1 Razones para no usar anticonceptivos

A las mujeres casadas o unidas no usuarias de métodos se les preguntó porqué no estaban usando algún anticonceptivo actualmente. Las razones se clasificaron en dos categorías: *razones relacionadas con el embarazo, fertilidad y actividad sexual*; y *otras razones*, que incluyen respuestas que tienen que ver con aspectos culturales, sociales, psicológicos y económicos. Los resultados se muestran en el Cuadro 6.1, para el total del país y por residencia.

A nivel nacional, el 76.7 por ciento de las mujeres que no usan se ubica en la primera categoría relacionada con embarazo, fertilidad y actividad sexual, el 49 por ciento de esa proporción debe ser considerada como demanda potencial para el uso de métodos anticonceptivos una vez finalizado el actual embarazo (31.4%) y el período de posparto y lactancia (17.7%).

Respecto a la segunda categoría, la causa más frecuentemente citada fue por razones de salud (4.3%) y accesibilidad (geográfica o económica), 4.2%. La accesibilidad geográfica o económica en el resto del país (5.3%) y en áreas rurales (6.9%) es una limitante importante para no usar métodos anticonceptivos.

## 6.2 Razón para Discontinuar su uso

A las mujeres que habían usado anticonceptivos en el pasado, pero actualmente no estaban usando, se les preguntó las razones para discontinuar su uso. En el Cuadro 6.2 se ve que entre las usuarias de métodos

CUADRO 6.2

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE USUARIAS ANTERIORES DE METODOS ANTICONCEPTIVOS, POR RAZON PARA DEJAR DE USAR EL ULTIMO METODO UTILIZADO, MUJERES CASADAS/UNIDAS DE 15-44 AÑOS. ENSMI-98

RAZON PARA DEJAR DE USAR	PILDORA	DIU	CONDON	INYECCION	METODOS NATURALES	OTRO	YUYOS
Para Embarazarse	37.8	72.3	38.0	40.0	56.1	23.8	18.0
Tuvo efectos colaterales	23.0	11.5	0.0	9.9	0.0	0.0	1.5
Fatalismo	6.5	0.0	4.2	0.0	0.2	0.0	14.2
No fue eficaz	6.4	7.9	11.3	6.1	19.6	36.1	31.1
No tuvo dinero	5.4	0.0	0.9	6.8	0.0	0.0	1.3
Descuido	5.1	0.0	18.2	8.1	19.8	0.0	18.0
Recomendación médica	4.5	7.8	0.0	14.9	0.0	6.0	1.3
Miedo a efectos colaterales	3.2	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
No había en existencia	2.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	1.5
Le quedó lejos	2.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.6
Dificultad de uso	1.3	0.5	16.0	3.8	0.0	0.0	0.9
Mala atención	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sin vida sexual	0.9	0.0	1.8	3.0	4.1	11.0	4.5
Menopausia	0.1	0.0	2.6	0.0	0.0	6.4	4.3
El compañero se opuso	0.0	0.0	6.4	3.1	0.0	16.7	0.4
No Sabe	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.3
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>154</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>110</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>104</b>

modernos, las dos razones reportadas con mayor frecuencia para dejar de usar fueron para embarazarse y porque tuvo efectos colaterales. Entre las usuarias de métodos naturales (Billings, ritmo y retiro) las principales razones son: para embarazarse (56%), no fue eficaz (19.6%) y descuido (19.8%).

### 6.3 Deseo de Uso Actual o futuro

A las mujeres en unión que no estaban usando métodos anticonceptivos y reportaron como causa de no uso razones diferentes a “edad avanzada”, “no le gusta”, o “problemas relacionados con la fertilidad”, se les preguntó si deseaban usar anticonceptivos en el presente o en el futuro, y a las que estaban interesadas se les preguntó qué método preferirían usar y dónde podrían obtenerlo.

CUADRO 6.3

**DESEO DE USO ACTUAL O FUTURO DE ANTICONCEPTIVOS Y CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE OBTENCION, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS: PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS QUE NO USAN ANTICONCEPTIVOS. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	DESEA USAR		CONOCE LUGAR	
	PORCENTAJE	Nº DE CASOS	PORCENTAJE	Nº DE CASOS
<b>TOTAL PAIS</b>	<b>65.1</b>	<b>745</b>	<b>86.9</b>	<b>481</b>
<b>AREA</b>				
Urbana	62.5	376	91.9	238
Rural	66.9	369	83.9	243
<b>REGION</b>				
Gran Asunción	58.3	177	86.5	107
Resto del País	66.7	568	87.0	374
<b>EDAD</b>				
15-19	73.9	49	68.1	41
20-24	77.5	104	83.3	78
25-29	75.9	157	89.1	120
30-34	75.6	188	94.3	137
35-39	59.9	129	85.6	74
40-44	27.8	118	83.6	31
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>				
0-2 años	61.7	81	72.2	52
3-5 años	66.2	222	85.1	144
Primaria Completa	67.7	236	90.4	159
Secundaria Completa y más	62.5	206	94.5	126
<b>NUMERO DE HIJOS</b>				
0	56.5	551	84.8	307
1	92.8	47	93.4	43
2	97.5	36	91.5	32
3	91.0	44	100.0	39
4 y más	86.2	67	83.2	60

\* Menos de 25 casos

En el **Cuadro 6.3** se observa que casi dos tercios (65.1%) de las mujeres en unión no usuarias desean usar anticonceptivos. Es mayor el porcentaje en mujeres de áreas rurales y que residen fueran del Gran Asunción y que son menores de 35 años. Se observa también que del total de no usuarias que desean usar anticonceptivos, el 86.9 por ciento conoce el lugar donde obtener los métodos.

En el **Cuadro 6.4**, se puede ver cuáles serían los métodos preferidos por las mujeres que tienen intenciones de usar anticonceptivos ahora o en el futuro. Los tres métodos con mayor posibilidad de demanda a nivel nacional son: la píldora 22%, el DIU 16.2% y la inyección 13.1%. Más de cuarto del total de mujeres en unión que desean usar algún método, no sabe qué anticonceptivo usar. Esta proporción llega a un tercio entre las mujeres rurales. En el Gran Asunción y en áreas urbanas existe mayor preferencia por el DIU (24.6 por ciento y 26.1 por ciento, respectivamente), mientras que en el resto del país y en áreas rurales hay mayor deseo de usar la píldora (22.5% y 23.6%).

**CUADRO 6.4**

**METODO PREFERIDO PARA USO ACTUAL O FUTURO, POR AREA Y REGION: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS QUE NO USAN ANTICONCEPTIVOS Y QUE DESEAN USAR AHORA O EN EL FUTURO. ENSMI-98**

METODO PREFERIDO	TOTAL PAIS	REGION		AREA	
		GRAN ASUNCION	RESTO DEL PAIS	URBANA	RURAL
Píldora	22.0	20.0	22.5	19.8	23.6
DIU	16.2	24.6	14.0	26.1	9.1
Condón	5.6	6.1	5.5	5.7	5.5
Inyección	13.1	14.1	12.8	16.4	10.8
Métodos Vaginales	0.5	0.0	0.6	0.5	0.5
Esterilización Femenina	5.9	3.7	6.5	3.8	7.4
Billings	0.6	2.1	0.2	1.4	0.0
Ritmo	4.2	13.4	1.8	7.8	1.6
Retiro	0.8	0.0	1.0	0.0	1.4
Yuyos	5.1	2.3	5.8	2.4	7.0
No sabe	26.0	13.7	29.2	16.1	33.1
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>519</b>	<b>124</b>	<b>395</b>	<b>265</b>	<b>254</b>

## 6.4 Usuarias de yuyos

El uso de yuyos como método anticonceptivo en el Paraguay tiene una prevalencia más alta respecto a otros países de América Latina. Actualmente la proporción llega a 5%, esto se refiere al uso del yuyo como único método.

En esta sección se presentan los datos de las usuarias actuales o anteriores de yuyos, que usan, pero no en forma exclusiva, sino simultáneamente con otro método. Los datos se refieren a todas las mujeres, no sólo a las casadas o unidas, que declararon haber usado yuyos alguna vez y/o continúan usando, sea exclusivamente o con otros métodos.

EL 85% de todas las mujeres entrevistadas reportó conocer los yuyos como método anticonceptivo. De ese total, 27.5 % dijo haber usado alguna vez como método para evitar un embarazo (**Cuadro 6.5**). Existe diferencia de uso entre área de residencia urbana (23.7%) y rural (32.4%).

El uso de yuyos es más alto en mujeres que residen fuera de Gran Asunción (30.8%), de 25 o más años, que no terminaron la educación primaria y que sólo hablan guaraní en la casa.

### CUADRO 6.5

#### USO ALGUNA VEZ DE YUYOS ENTRE MUJERES QUE HAN OIDO DE YUYOS Y USO ACTUAL ENTRE ESTAS MUJERES SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	USO ALGUNA VEZ DE YUYOS	Nº DE CASOS	USO ACTUAL DE YUYOS	Nº DE CASOS
<b>TOTAL</b>	<b>27.5</b>	<b>3139</b>	<b>19.2</b>	<b>993</b>
<b>AREA</b>				
Urbana	23.7	1936	18.0	561
Rural	32.4	1203	20.3	432
<b>REGION</b>				
Gran Asunción	19.2	938	17.2	241
Resto del País	30.8	2201	19.7	752
<b>EDAD</b>				
15-19	8.0	551	18.4	59
20-24	23.5	631	13.3	141
25-29	34.8	446	19.7	191
30-34	36.8	601	20.5	239
35-39	35.7	513	11.4	204
40-44	34.8	397	32.7	159
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>				
0-2 años	33.8	189	26.6	83
3-5 años	37.2	635	17.6	269
Primaria Completa	34.8	885	22.2	338
Secundaria Incompleta	20.6	761	13.7	179
Secundaria Completa y más	14.1	669	17.1	124
<b>IDIOMA HABLADO EN CASA</b>				
Guarani solo	36.3	1070	21.3	439
Español solo	16.5	550	13.4	107
Guarani y español	25.1	1484	18.3	444
Otro	6.6	35	*	3

\* Menos de 25 casos

## 6.5 Primer método usado y edad de uso

A todas las mujeres que han usado métodos anticonceptivos, se les preguntó cuál fue el primer método usado y la edad en que comenzó a usarlo. Un análisis del primer anticonceptivo usado se presenta en el **Cuadro 6.6**, revela que los yuyos son utilizados como primer método en 12.5% de los casos. En relación a la edad, se encontró que el uso de los yuyos como primer método es más común entre mujeres que no usan un anticonceptivo hasta los 30-44 años de edad (20.9%).

**CUADRO 6.6**

**PRIMER METODO ANTICONCEPTIVO USADO, POR EDAD DEL PRIMER USO, MUJERES QUE HAN USADO METODOS ALGUNA VEZ. ENSMI-98**

EDAD DEL PRIMER USO	PASTILLAS	INYECC.	YUYOS	CONDON	RITMO	RETIRO	DIU	BILLINGS	MET. VAGINALES	TOTAL	Nº DE CASOS
<b>TOTAL</b>	<b>39.6</b>	<b>22.0</b>	<b>12.5</b>	<b>9.4</b>	<b>5.0</b>	<b>4.3</b>	<b>3.3</b>	<b>2.5</b>	<b>1.4</b>	<b>100.0</b>	<b>790</b>
15-19	34.0	27.0	11.0	13.6	6.1	6.0	0.8	1.5	0.0	100.0	298
20-24	44.4	18.9	12.7	6.3	4.8	2.9	5.5	3.9	0.5	100.0	307
25-29	38.9	19.7	10.0	6.4	5.8	4.9	4.3	3.0	7.0	100.0	93
30-44	44.7	20.3	20.9	6.8	0.0	2.1	2.9	0.0	2.3	100.0	76
No Sabe	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100.0	16

\* Menos de 25 casos

## 6.6 Preferencia de otro método entre usuarias de yuyos

A las mujeres que estaban usando yuyos, se les preguntó si seguirían usando el mismo método o preferirían usar otro. A las que respondieron preferir otro, se les preguntó qué método preferirían usar y por qué razones no usaban el que preferían. Se encontró que 26% de las usuarias de yuyos dijeron que preferirían usar otro método.

En el **Cuadro 6.7** se puede ver que un tercio de las usuarias de yuyos que preferían otro método, preferirían usar métodos hormonales (píldora, 20.3% e inyección, 12.9%); 16.9% optaría por el DIU y 11.6% preferiría la ligadura tubárica. Se debe notar que más de un tercio (38.3%) de las mujeres usuarias de yuyos prefieren otro método pero no saben cual.

La principal razón para no usar el método preferido es la falta de dinero (36.3%), 17.4% respondió que les falta orientación médica, 16.1% mencionó que los yuyos son más baratos y 12.4% que los yuyos son más prácticos.

## 6.7 Necesidad de servicios de planificación familiar

Se identifican a las mujeres que están en riesgo de embarazo no planeado o que necesitan servicios de planificación familiar a todas las mujeres, independientemente de su estado civil, que no informaron problemas de infertilidad, no están embarazadas actualmente, no desean un embarazo, son sexualmente

## CUADRO 6.7

## USUARIAS DE YUYOS QUE PREFIEREN USAR OTRO METODO, POR METODO PREFERIDO Y RAZONES PARA NO USAR EL QUE PREFIEREN. ENSMI-98

PREFERENCIA DE METODOS	TOTAL
<b>METODO QUE PREFERIRIA USAR</b>	
Píldora	20.3
DIU	16.9
Inyección	12.9
Esterilización Femenina	11.6
No Sabe	38.3
<b>RAZONES PARA NO USAR EL QUE PREFERIRIA</b>	
Falta de Dinero	36.3
Falta Orientación Médica	17.4
Yuyos son más Baratos	16.1
Yuyos son más Prácticos	12.4
Salud	6.9
Disponibilidad	6.0
Lactando	1.6
Falta de Tiempo	1.5
Otro	1.7
<b>TOTAL N° DE CASOS</b>	<b>34</b>

## CUADRO 6.8

## DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS QUE NECESITAN SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR\* Y QUE NO NECESITAN, SEGUN RAZONES DE NO NECESIDAD POR ESTADO CIVIL Y RESIDENCIA. ENSMI-98

CONDICION REPORTADA	TOTAL	ESTADO CIVIL			AREA		REGION	
		CASADA UNIDA	VDA. SEP. DIVORCIADA	SOLTERA	URBANA	RURAL	GRAN ASUNCION	RESTO DEL PAIS
NECESITAN PF	<u>11.3</u>	<u>17.3</u>	<u>4.5</u>	<u>1.1</u>	<u>6.2</u>	<u>17.6</u>	<u>4.7</u>	<u>13.8</u>
NO NECESITAN	<u>88.8</u>	<u>82.8</u>	<u>95.5</u>	<u>99.0</u>	<u>93.9</u>	<u>82.5</u>	<u>95.2</u>	<u>86.3</u>
Usa anticonceptivo	41.1	57.4	25.9	13.4	45.5	35.6	45.9	39.2
Estéril o menop.	2.9	4.2	4.1	0.3	2.9	2.9	2.6	3.0
Embaraz. actualm.	7.9	11.8	4.9	1.3	7.0	9.1	7.2	8.2
Desea embarazo	3.5	5.0	2.9	1.0	3.8	3.2	4.7	3.1
Inactiva sexualm.	33.4	4.4	57.7	83.0	34.7	31.7	34.8	32.8
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N° DE CASOS</b>	<b>3598</b>	<b>2386</b>	<b>201</b>	<b>1011</b>	<b>2199</b>	<b>1399</b>	<b>1071</b>	<b>2527</b>

\*Necesidad de servicios: mujeres fértiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no están usando método.


activas y no están usando un método anticonceptivo o están usando un método tradicional con menor eficacia.

En el **Cuadro 6.8**, se presenta el porcentaje de mujeres de 15 a 44 años que necesitan servicios de planificación familiar, para el total de mujeres, por estado civil y por residencia. También se muestra el porcentaje de mujeres que no necesitan planificación familiar por las razones de no necesidad: las que están usando anticonceptivos, no son fértiles, están embarazadas actualmente, o desean embarazarse y no son sexualmente activas.

En el **Cuadro 6.9** se presenta el porcentaje de todas las mujeres de 15 a 44 años que necesitan servicios de planificación familiar. Para el total del país esta proporción es de 11.3 por ciento. La necesidad de servicios en áreas rurales es el doble (17.6%), a la encontrada en áreas urbanas (6.2%). En el Resto del País la necesidad es tres veces mayor (13.8%) que en Gran Asunción (4.7%).

A nivel nacional la necesidad es mayor entre las mujeres casadas (17.3%), entre las mayores de 25 años de edad (13% y más) y en mujeres sin educación que no habían completado la primaria.

Al analizar la necesidad de servicios de planificación familiar de acuerdo al criterio de necesidad de métodos modernos, en el **Cuadro 6.10**, vemos que para el total del país la necesidad aumenta a 17.6 por ciento. Las mujeres rurales se encuentran con mayores necesidades de métodos modernos (23.3%) respecto a las residentes en zonas urbanas (12.9%).



Las mismas tendencias encontradas en los dos cuadros anteriores para todas las mujeres, sin tener en cuenta su estado civil, se verifican en los siguientes dos cuadros, donde se analizan la necesidad de servicios de planificación familiar (**Cuadro 6.11**) y la necesidad de métodos modernos (**Cuadro 6.12**) para las mujeres casadas o unidas.

Los mayores porcentajes de necesidad se dan en zonas rurales (24.8%) y en mujeres de menor educación (33%, para las del nivel 0-2 años de estudio). La necesidad de métodos modernos alcanza a un tercio (32.5%) de las mujeres unidas de zonas rurales, con menor educación. El menor nivel de necesidad se encuentra en Gran Asunción (17.8%) frente a 28.9% para el Resto del País.

CUADRO 6.9

**NECESIDAD DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS:  
PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS EN RIESGO DE EMBARAZO NO PLANEADO DE ACUERDO CON EL  
CRITERIO DE NECESIDAD DE SERVICIOS (\*). ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	TOTAL		AREA				REGION			
			URBANA		RURAL		GRAN ASUNCION		RESTO DEL PAIS	
	NECESITA METODO		NECESITA METODO		NECESITA METODO		NECESITA METODO		NECESITA METODO	
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>TOTAL</b>	11.3	3598	6.2	2199	17.6	1399	4.7	1071	13.8	2527
<b>ESTADO CIVIL</b>										
Casada/Unida	17.3	2386	10.0	1394	24.8	992	7.8	673	20.6	1713
Vda./Separ./Divorciada	4.5	201	3.5	145	6.3	56	0.7	69	6.2	132
Soltera	1.1	1011	1.0	660	1.3	351	0.9	329	1.2	682
<b>EDUCACION</b>										
0-2 años	25.3	214	15.6	78	28.5	136	8.2	22	27.0	192
3-5 años	17.3	716	14.4	260	18.3	456	18.2	92	17.2	624
Primaria completa	13.5	988	10.0	531	16.7	457	8.7	238	14.8	750
Secundaria incompleta	5.3	923	3.1	672	11.2	251	2.0	329	7.2	594
Secundaria completa y +	4.1	757	3.3	658	10.0	99	2.9	390	5.5	367
<b>EDAD</b>										
15-19	4.3	766	1.1	457	8.5	309	0.8	200	5.6	566
20-24	8.7	602	4.9	397	14.6	205	2.8	204	11.8	398
25-29	12.8	609	6.7	375	19.8	234	5.2	192	15.8	417
30-34	17.8	655	9.4	362	26.0	293	8.5	202	21.3	453
35-39	12.3	544	7.4	338	17.7	206	3.0	147	15.1	397
40-44	17.4	422	12.8	270	24.3	152	11.8	126	19.8	296

(\*). Necesidad de servicios: mujeres fértiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no están usando método.

CUADRO 6.10

**NECESIDAD INSATISFECHA DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS: PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS EN RIESGO DE EMBARAZO NO PLANEADO DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE NECESIDAD DE METODOS MODERNOS (\*). ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	TOTAL		AREA				REGION			
			URBANA		RURAL		GRAN ASUNCION		RESTO DEL PAIS	
	NECESITA METODO MODERNO									
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>TOTAL</b>	<b>17.6</b>	<b>3598</b>	<b>12.9</b>	<b>2199</b>	<b>23.3</b>	<b>1399</b>	<b>11.7</b>	<b>1071</b>	<b>19.9</b>	<b>2527</b>
<b>ESTADO CIVIL</b>										
Casada/Unida	26.1	2386	19.7	1394	32.5	992	17.8	673	28.9	1713
Vda./Separ./Divorciada	5.2	201	4.5	145	6.3	56	3.0	69	6.2	132
Soltera	3.9	1011	4.3	660	3.1	351	4.4	329	3.6	682
<b>EDUCACION</b>										
0-2 años	30.7	214	21.5	78	33.7	136	8.2	22	32.9	192
3-5 años	25.0	716	21.2	260	26.3	456	18.4	92	25.5	624
Primaria completa	19.0	988	17.0	531	20.7	457	13.6	238	20.4	750
Secundaria incompleta	9.9	923	8.2	672	14.2	251	9.0	329	10.4	594
Secundaria completa y +	12.2	757	11.4	658	18.4	99	12.2	390	12.3	367
<b>EDAD</b>										
15-19	7.0	766	4.7	457	9.8	309	3.4	200	8.2	566
20-24	12.2	602	7.8	397	19.1	205	6.9	204	15.0	398
25-29	20.6	609	16.8	375	24.8	234	15.9	192	22.4	417
30-34	26.6	655	17.4	362	35.6	293	16.7	202	30.4	453
35-39	22.1	544	15.8	338	29.0	206	14.7	147	24.3	397
40-44	26.2	422	24.5	270	28.7	152	21.2	126	28.2	296

(\*) Necesidad de métodos modernos: mujeres fértiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no están usando método moderno.

## CUADRO 6.11

**NECESIDAD DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS:  
PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS EN RIESGO DE EMBARAZO NO PLANEADO  
DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE NECESIDAD DE SERVICIOS (\*). ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	TOTAL		AREA				REGION			
			URBANA		RURAL		GRAN ASUNCION		RESTO DEL PAIS	
	NECESITA METODO									
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>TOTAL</b>	<b>17.3</b>	<b>2386</b>	<b>10.0</b>	<b>1394</b>	<b>24.8</b>	<b>992</b>	<b>7.8</b>	<b>673</b>	<b>20.6</b>	<b>1713</b>
<b>EDUCACION</b>										
0-2 años	29.5	173	17.1	61	33.1	112	6.2	16	31.3	157
3-5 años	22.8	560	19.9	196	23.7	364	23.4	71	22.7	489
Primaria Completa	19.1	731	13.4	397	24.3	334	11.7	174	21.2	557
Secundaria Incompleta	10.9	435	6.0	314	21.8	121	4.7	163	14.1	272
Secundaria Completa y +	6.5	487	5.4	426	16.7	61	4.6	249	9.0	238
<b>EDAD</b>										
15-19	23.9	133	5.6	64	37.8	69	4.0	29	28.1	104
20-24	16.4	360	10.8	219	22.3	141	7.0	99	19.4	261
25-29	15.9	494	7.9	301	24.6	193	6.6	151	19.4	343
30-34	19.8	570	11.0	305	27.6	265	9.4	176	23.8	394
35-39	13.5	469	8.1	285	18.7	184	2.3	116	16.5	353
40-44	18.8	360	13.8	220	25.5	140	13.6	102	20.8	258

(\*) Necesidad de servicios: mujeres fértiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no están usando método.

CUADRO 6.12

NECESIDAD INSATISFECHA DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS: PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS EN RIESGO DE EMBARAZO NO PLANEADO DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE NECESIDAD DE METODOS MODERNOS (\*). ENSMI-98

CARACTERISTICAS	TOTAL		AREA				REGION			
			URBANA		RURAL		GRAN ASUNCION		RESTO DEL PAIS	
	NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO	
	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>TOTAL</b>	<b>26.1</b>	<b>2386</b>	<b>19.7</b>	<b>1394</b>	<b>32.5</b>	<b>992</b>	<b>17.8</b>	<b>673</b>	<b>28.9</b>	<b>1713</b>
<b>EDUCACION</b>										
0-2 años	34.9	173	25.3	61	37.6	112	6.2	16	37.1	157
3-5 años	33.1	560	29.6	196	34.2	364	23.6	71	33.9	489
Primaria completa	26.5	731	22.3	397	30.3	334	18.2	174	28.8	557
Secundaria incompleta	18.2	435	14.2	314	27.3	121	17.8	163	18.5	272
Secundaria completa y +	17.7	487	17.0	426	24.7	61	17.3	249	18.3	238
<b>EDAD</b>										
15-19	29.1	133	15.4	64	39.4	69	4.3	29	34.2	104
20-24	22.1	360	15.1	219	29.5	141	12.8	99	25.1	261
25-29	24.2	494	19.7	301	29.0	193	19.3	151	26.0	343
30-34	29.9	570	20.6	305	38.0	265	18.5	176	34.2	394
35-39	24.3	469	17.2	285	31.3	184	15.0	116	26.8	353
40-44	28.0	360	26.5	220	30.2	140	24.5	102	29.5	258

(\*) Necesidad de métodos modernos: mujeres fértiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no están usando método moderno.

## CAPITULO 7

# ADULTAS JOVENES

El interés por el comportamiento reproductivo de mujeres jóvenes y adolescentes ha adquirido mayor relevancia en los últimos años como consecuencia del aumento de embarazos en adolescentes y el inicio de relaciones sexuales a edades tempranas. En la ENSMI-98, se obtuvo información sobre el tema, usando un módulo especial solamente para las 1.361 mujeres de 15 a 24 años de edad. En esta sección se presentan datos sobre fecundidad, primera relación sexual, actividad sexual actual, uso de anticonceptivos y educación sexual.

### 7.1 Fecundidad

En el Cuadro 7.1 se compara el porcentaje acumulativo de jóvenes que habían alcanzado la menarquía en varias edades, según su edad actual. Los datos de la cohorte indican que la edad de la menarquía (inicio de la menstruación) en Paraguay está en un leve descenso. A los 12 años, 38.2% de las mujeres que actualmente tienen 15-17 años alcanzaron la menarquía comparado con 37.3% para las que tienen 18-19 y 33.6% o menos (19.1%) para las que tienen 20 años o más. Se nota un descenso también en el promedio de edad a la cual alcanzaron la menarquía. Las que actualmente tienen entre 20 y 22 años, alcanzaron la menarquía a los 13.2 años, en promedio, y las que tienen 23 años o más alcanzaron la menarquía a los 13.9 años, en promedio.

CUADRO 7.1

PORCENTAJE ACUMULATIVO DE MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON LA MENARQUIA A VARIAS EDADES, POR EDAD ACTUAL. ENSMI-98

EDAD A MENARQUIA	TOTAL	EDAD ACTUAL			
		15-17	18-19	20-22	23-24
<11	1.8	1.3	0.8	1.5	5.1
11	9.6	9.0	9.1	10.3	10.1
12	33.6	38.2	37.3	33.6	19.1
13	65.9	78.9	66.9	60.3	47.0
14	86.2	94.3	89.3	81.5	73.1
15	95.7	99.7	95.5	93.8	90.7
16+	99.5	99.7	98.9	100.0	99.4
Todavía no menstruó	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
No recuerda/responde	0.3	0.0	1.1	0.0	0.6
Promedio de edad	13.3	13.0	13.3	13.2	13.9
Nº DE CASOS	1361	475	291	369	226

\* Excluye 7 mujeres sin información de año

## CUADRO 7.2

## DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD POR NUMERO Y PROMEDIO DE EMBARAZOS, SEGUN EDAD Y REGION DE RESIDENCIA. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	NUMERO DE EMBARAZOS			TOTAL	PROMEDIO DE EMBARAZOS	NUMERO DE MUJERES
	0	1	2 y más			
<b>TOTAL</b>	63.6	17.8	18.5	100.0	0.5	1368
<b>EDAD</b>						
15-17	92.5	6.3	1.2	100.0	0.1	475
18-19	66.3	25.3	8.4	100.0	0.4	291
20-22	50.0	23.4	26.6	100.0	0.8	370
23-24	23.4	22.4	54.3	100.0	1.3	232
<b>REGION</b>						
Gran Asunción	68.8	18.4	12.7	100.0	0.4	404
Resto del País	61.4	17.6	21.0	100.0	0.6	964
<b>AREA</b>						
Urbana	69.3	17.5	13.2	100.0	0.4	854
Rural	55.7	18.3	26.1	100.0	0.7	514

La maternidad en Paraguay se inicia a temprana edad. Como se puede ver en el **Cuadro 7.2**, el 36.3 por ciento de las adultas jóvenes informaron haber tenido un embarazo o más. La proporción que reportó haber tenido un embarazo o más asciende con la edad, desde 7.5 por ciento entre las mujeres de 15 a 17 años a 76.7 por ciento entre las de 23 a 24 años de edad.

El porcentaje de mujeres sin ningún embarazo subió de 60.6 por ciento en 1995 a 63.6 por ciento en 1998, este aumento de tres puntos porcentuales no es estadísticamente significativo, pero es consistente en todas las variables analizadas, con excepción del grupo 23-24 años donde bajó de 25.6 por ciento a 23.4 por ciento entre 1995 y 1998.

## 7.2 Primera experiencia sexual

Según el **Cuadro 7.3**, más de la mitad (53.9 por ciento) de las mujeres jóvenes han tenido relaciones sexuales, este porcentaje es un poco más bajo que la cifra encontrada en 1995, 56.3 por ciento, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. Como es de esperar las relaciones premaritales aumentan con la edad, de 18.2 por ciento en las mujeres de 15 a 17 años a 65.4 por ciento en las de 23 a 24 años.

Según nivel de instrucción, las mujeres que tienen secundaria incompleta, reportaron el porcentaje más bajo de relaciones sexuales. También en la encuesta de 1995 se presentó esta situación, por análisis secundarios de los datos sabemos que las mujeres de esa categoría de educación todavía están cursando sus estudios y tienen características diferentes de las del grupo de primaria completa o de las del grupo secundaria o más.

CUADRO 7.3

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE REPORTARON HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES, POR EDAD, RESIDENCIA Y NIVEL DE INSTRUCCION, ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	RELACION SEXUAL			NO TUVO RELACIONES SEXUALES	TOTAL	N° DE CASOS
	TUVO RELACIONES SEXUALES	PRE MARITAL	MARITAL			
<b>TOTAL</b>	<b>53.9</b>	<b>44.5</b>	<b>9.5</b>	<b>46.1</b>	<b>100.0</b>	<b>1351*</b>
<b>EDAD</b>						
15-17	19.8	18.2	1.6	80.2	100.0	472
18-19	56.6	49.2	7.4	43.4	100.0	287
20-22	72.9	60.5	12.4	27.1	100.0	368
23-24	89.0	65.4	23.6	11.0	100.0	224
<b>REGION</b>						
Gran Asunción	53.7	48.6	5.1	46.3	100.0	399
Resto del País	54.0	42.7	11.3	46.0	100.0	952
<b>AREA</b>						
Urbana	52.4	46.9	5.6	47.6	100.0	844
Rural	56.0	41.0	15.0	44.0	100.0	507
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>						
0-5 años	72.2	51.4	20.8	27.8	100.0	248
Primaria completa	57.8	47.2	10.6	42.2	100.0	317
Secund. Incompleta	39.4	34.6	4.8	60.6	100.0	549
Secundaria o más	58.0	53.4	4.6	42.0	100.0	237

\* Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 7 mujeres que falta información

En muchos casos, la pareja de la mujer joven en su primera relación sexual no es un joven sino un hombre mayor. Los datos del **Cuadro 7.4** indican que para 39.5% de las jóvenes que han tenido relaciones sexuales, su primera pareja fue 6 años o más, mayor que ella (47.5% si fue una relación marital, 37.8% si fue una relación premarital). Esta tendencia es más marcada entre las más jóvenes: de las mujeres que tuvieron su primera relación antes de cumplir 18 años, entre 40 y 50 por ciento tuvieron una pareja 6 años o más mayor que ella.

En el **Cuadro 7.5** se presenta el porcentaje de mujeres de 15 a 24 años cuya primera relación sexual fue premarital, por edad a la primera relación, según nivel educativo.

Para el total de mujeres de esas edades, en el 82.6 por ciento de los casos la primera experiencia sexual fue premarital. Según nivel de instrucción, vemos que aumenta el porcentaje de relación premarital, a medida que aumenta el nivel educativo. Esto es consistente para las diferentes edades. Es decir que independientemente de la edad, la primera relación premarital aumenta con los años de estudio.

La información del **Cuadro 7.6** revela que la jóvenes que reportaron relaciones sexuales premaritales empezaron su actividad sexual a una edad muy temprana, 32.2 por ciento antes de cumplir 16 años. Esta

CUADRO 7.4

EDAD DE LA PRIMERA PAREJA POR ESTADO CIVIL Y EDAD A LA PRIMERA RELACION, MUJERES DE 15-24 AÑOS CON EXPERIENCIA SEXUAL (DISTRIBUCION PORCENTUAL). ENSMI-98

CARACTERISTICAS	EDAD DE LA PRIMERA PAREJA						TOTAL	N° DE CASOS
	Más joven	Misma edad	1-2 años mayor	3-5 años mayor	6+ años mayor	No sabe		
TOTAL	2.5	5.4	13.3	36.7	39.5	2.6	100.0	790*
Marital	0.0	7.4	3.7	40.2	47.5	1.3	100.0	130
Premarital	3.1	5.0	15.3	35.9	37.8	2.9	100.0	660
<b>EDAD A LA 1ra. RELACIÓN**</b>								
<15	1.7	0.0	7.7	45.9	39.3	5.4	100.0	99
15	0.0	2.3	9.5	33.4	51.6	3.3	100.0	159
16-17	0.9	4.6	14.8	37.2	40.4	2.2	100.0	285
18-19	6.1	9.5	15.4	32.9	34.1	2.0	100.0	189
20-24	2.0	8.1	19.7	43.7	26.2	0.2	100.0	55

\*Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación

\*\* Excluye 3 mujeres adicionales quien no recuerdan la edad a la primera relación

situación no ha cambiado desde 1995. Nuevamente vemos que a menor educación mayor es el porcentaje de relaciones premaritales en menores de 16 años, estas son mujeres que viven principalmente en áreas rurales, y sabemos también que las mujeres con menor educación son en su mayoría del área rural.

CUADRO 7.5

PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-24 AÑOS CON EXPERIENCIA SEXUAL CUYA PRIMERA RELACION FUE PREMARITAL, POR EDAD A LA PRIMERA RELACION SEXUAL SEGUN NIVEL EDUCATIVO. ENSMI-98

CARACTERISTICA	TOTAL	EDAD A LA PRIMERA RELACION		
		<15	15-17	18-24
TOTAL	82.6 (787)*	78.1 (99)	84.0 (444)	82.4 (244)
<b>NIVEL DE EDUCACION</b>				
0-5 años	71.6 (189)	78.4 (47)	72.0 (107)	64.1 (35)
Primaria Completa	81.7 (214)	93.6 (29)	80.5 (126)	80.1 (59)
Secundaria Incompleta	87.8 (229)	** (18)	93.3 (155)	86.8 (56)
Secundaria Completa y más	92.1 (155)	** (5)	94.7 (56)	90.6 (94)

\*Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 3 mujeres adicionales quen no recordaron la edad a la primera relación

\*\* Menos de 25 casos

CUADRO 7.6

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE REPORTARON HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES PREMARITALES POR EDAD CUANDO LA PRIMERA RELACION, SEGUN REGION, RESIDENCIA Y EDUCACION. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	EDAD CUANDO LA PRIMERA RELACION					NO SABE	TOTAL	N° DE CASOS
	< 15	15	16-17	18-19	20-24			
<b>TOTAL</b>	<b>12.2</b>	<b>20.0</b>	<b>32.5</b>	<b>26.7</b>	<b>8.3</b>	<b>0.3</b>	<b>100.0</b>	<b>660</b>
<b>REGION</b>								
Gran Asunción	7.3	16.3	28.0	37.4	11.1	0.0	100.0	218
Resto del País	14.6	21.8	34.6	21.5	7.0	0.4	100.0	442
<b>AREA</b>								
Urbana	8.9	16.8	35.6	29.2	9.4	0.0	100.0	433
Rural	17.6	25.1	27.3	22.8	6.5	0.7	100.0	227
<b>EDUCACION</b>								
0-5 años	26.8	23.5	26.2	12.8	9.4	1.2	100.0	141
Primaria Completa	11.3	29.5	31.9	24.8	2.4	0.0	100.0	177
Secund.Incompleta	9.1	17.8	43.0	24.4	5.8	0.0	100.0	207
Secund.Completa y +	1.3	8.7	25.9	47.3	16.8	0.0	100.0	135

En el Cuadro 7.7, se compara la experiencia sexual premarital de las mujeres de 15 a 24 años según las tres encuestas (1987, 1995 y 1998) que tuvieron módulo de adultas jóvenes. Se puede ver que para el total del país, desde 1987 a 1995 hubo un aumento significativo de 35 por ciento a 47 por ciento. Sin embargo, desde 1995 a 1998 se observa una disminución de 47 por ciento a 44.5 por ciento, pero esta diferencia no es estadísticamente significativa. Se puede decir entonces que en los últimos tres años no hubo una disminución, estadísticamente se ha nivelado, en la actividad sexual premarital.


La misma tendencia observada a nivel nacional, se presenta por regiones y para las edades 15-19 y 20-24, las diferencias no son significativas, con excepción del grupo 20-24 años para el total del país, donde sí se encontró que la disminución de 68.1 por ciento a 62.2 por ciento entre 1995 y 1998 fue estadísticamente significativa.

CUADRO 7.7

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE REPORTARON HABER TENIDO RELACIONES SEXUALES PREMARITALES POR REGION Y EDAD. ENSMI-98. COMPARADO CON LA ENCUESTA DE PLANIFICACION FAMILIAR 1987, Y ENDSR95/96**

RESIDENCIA	EPF-1987			ENDSR-1995/96				ENSMI-1998*				
	TOTAL	15-19	20-24	N° DE CASOS	TOTAL	15-19	20-24	N° DE CASOS	TOTAL	15-19	20-24	N° DE CASOS
<b>TOTAL</b>	<b>35.1</b>	<b>21.2</b>	<b>48.7</b>	<b>875</b>	<b>47.0</b>	<b>30.9</b>	<b>68.1</b>	<b>2131</b>	<b>44.5</b>	<b>30.0</b>	<b>62.2</b>	<b>1351*</b>
<b>REGION</b>												
Gran Asunción	39.5	25.1	52.8	428	52.5	36.5	73.7	513	48.6	29.8	66.1	399
Resto del País	33.1	19.5	46.8	447	44.7	28.6	65.7	1618	42.7	30.0	60.2	952

\* Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 7 mujeres sin información.



### 7.3 Uso de anticonceptivos

De las adultas jóvenes que declararon actividad sexual, las que utilizaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual premarital fueron 31.3 por ciento, **Cuadro 7.8**. Lo que representa un aumento respecto a 1995, cuando fue 23.5 por ciento (**Cuadro 7.9**). Este aumento es debido sobre todo a un incremento en el uso del condón, que pasó de 7.4% a 14%, también aumentó el porcentaje de uso del retiro.

El porcentaje de uso de métodos anticonceptivos en la primera relación para las casadas o unidas no aumentó desde 1995. Concentrándonos en la columna de las mujeres que usaron anticonceptivos en su primera relación sexual (antes de la unión), notamos un aumento en el porcentaje de uso en las mujeres menores de 18 años, cuya edad de la pareja era menor o igual al de ella, en todas las áreas geográficas y en todos los niveles educativos, con excepción de las mujeres con secundaria completa.

En el **Cuadro 7.10** podemos ver que a pesar de que el número de casos es bajo, los porcentajes sugieren que cuando la primera relación es marital y el tiempo que conocía a su pareja es mayor a dos años, mayor es la probabilidad de usar anticonceptivos.

Cuando la relación es premarital, al igual que en 1995, el tiempo que la joven conocía a su pareja cuando tuvo su primera experiencia sexual no tiene ningún impacto en el uso de un método anticonceptivo.

En el **Cuadro 7.11** se observa que, de las jóvenes que han tenido una relación sexual premarital, las que tuvieron un curso de educación sexual usaron un método anticonceptivo dos veces más (45.8%) en relación a las que no tuvieron un curso de educación sexual (20.8%). Los hallazgos de esta encuesta confirman los datos de 1995, pues esta diferencia ya se había encontrado ese año.

## CUADRO 7.8

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE USO ANTICONCEPTIVOS  
EN SU PRIMERA RELACION SEXUAL, POR ESTADO CIVIL CUANDO LA PRIMERA  
RELACION SEGUN EDAD, REGION, AREA DE RESIDENCIA Y EDUCACION. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	ESTADO CIVIL CUANDO LA PRIMERA RELACION					
	TOTAL MUJERES		ANTES DE UNION		CASADAS O UNIDAS	
	%	Nº DE CASOS	%	Nº DE CASOS	%	Nº DE CASOS
<b>TOTAL*</b>	<b>31.3</b>	<b>778</b>	<b>33.2</b>	<b>652</b>	<b>21.6</b>	<b>126</b>
<b>EDAD A LA PRIMERA RELACION**</b>						
<=15	23.3	254	26.9	220	6.2	34
16-17	31.8	283	32.9	237	25.6	46
18-24	38.1	238	39.0	193	33.9	45
<b>EDAD DE LA PAREJA</b>						
Menor o misma edad	45.1	61	50.5	53	***	8
1-2 años mayor	32.9	114	32.3	104	***	10
3-5 años mayor	32.3	254	35.3	211	19.2	43
6 y + años mayor	28.9	328	30.4	266	23.1	62
No sabe/No responde	1.1	21	1.2	18	***	3
<b>REGION</b>						
Gran Asunción	41.1	236	42.3	215	***	21
Resto del País	27.0	542	28.7	437	20.2	105
<b>AREA</b>						
Urbana	39.3	487	39.3	429	39.6	58
Rural	20.3	291	23.2	223	12.0	68
<b>EDUCACION</b>						
0-5 años	15.2	187	18.5	139	6.4	48
Primaria completa	26.9	212	27.3	175	25.0	37
Secundaria incompleta	39.7	227	40.1	206	***	21
Secundaria completa y +	47.3	152	46.8	132	***	20

\*Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 12 mujeres sin información sobre método usado

\*\* Excluye 3 mujeres adicionales que no recordaron la edad a la primera relación

\*\*\* Menos de 25 casos

En el **Cuadro 7.12** se presentan las razones de no uso de anticonceptivos en la primera relación sexual. Para las relaciones premaritales la primera causa fue porque no esperaba tener relaciones (47.3 por ciento) y luego porque no conocía ningún método (28.7 por ciento). Para las relaciones maritales, la principal razón fue porque no conocía ningún método.

En el **Cuadro 7.13** se presentan datos sobre el porcentaje de mujeres con experiencia sexual premarital y el uso de métodos anticonceptivos en la primera relación en algunos países de América Latina, según encuestas realizadas en diferentes años. Las mujeres paraguayas, tanto de las edades 15-19 como 20-24


**CUADRO 7.9**  
**METODO ANTICONCEPTIVO USADO DURANTE LA PRIMERA RELACION SEXUAL**  
**PREMARITAL, POR METODO, COMPARADO CON ENDSR-95/96, ENSMI-98**

USUARIAS DE METODOS	ENSMI/1998	ENDSR/1995-96
<b>DE RECONOCIDA EFICACIA</b>	<b>33.2</b>	<b>23.5</b>
Condón	14.0	7.4
Píldora	4.9	4.8
Inyección	3.1	3.2
Retiro	7.9	3.3
Billings	0.7	2.2
Ritmo	2.1	2.0
Otros	0.2	0.7
<b>DE EFICACIA NO RECONOCIDA (YUYOS)</b>	<b>0.3</b>	<b>1.6</b>
No Usuarías	66.8	74.8
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N° DE CASOS</b>	<b>652*</b>	<b>1080**</b>

\*Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 12 mujeres sin información sobre método usado en la primera relación.

\*\*Excluye 12 mujeres cuya primera relación fue una violación.

**GRAFICO 7.2**  
**METODO ANTICONCEPTIVO USADO DURANTE LA PRIMERA RELACION SEXUAL**  
**PREMARITAL POR METODO COMPARADO CON ENDSR-95/96, ENSMI-98**



Fuente Cuadro 7.9

**CUADRO 7.10**  
**USO DE UN METODO ANTICONCEPTIVO EN LA PRIMERA RELACION SEXUAL SEGUN CUANTO TIEMPO**  
**CONOCIA A SU PAREJA, POR ESTADO CIVIL CUANDO LA PRIMERA RELACION, MUJERES 15-24 AÑOS DE EDAD.**  
**ENSMI-98**

TIEMPO QUE CONOCIA A SU PAREJA	UNIDAS		NO UNIDAS	
	%	N	%	N
<b>TOTAL*</b>	<b>21.6</b>	<b>126</b>	<b>33.2</b>	<b>652</b>
< 1 año	15.7	37	40.1	261
1 año	14.4	40	27.5	171
2-3 años	45.4	28	27.4	155
4+ años	**	15	31.4	54
No sabe	**	6	**	11

\*Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 12 mujeres sin información sobre método usado.

\*\*Menos de 25 casos.

**CUADRO 7.11**

**PORCENTAJE DE MUJERES 15-24 AÑOS DE EDAD QUE USARON UN METODO ANTICONCEPTIVO EN SU PRIME-**  
**RA RELACION SEXUAL PREMARITAL SEGUN SI HABIA TENIDO UN CURSO EN EDUCACION SEXUAL ANTES DE**  
**LA RELACION, POR NIVEL DE INSTRUCCION. ENSMI-98**

NIVEL DE INSTRUCCION	TUVO EDUCACION SEXUAL		NO TUVO EDUCACION SEXUAL	
	%	Nº DE CASOS	%	Nº DE CASOS
<b>TOTAL*</b>	<b>45.8</b>	<b>326</b>	<b>20.8</b>	<b>326</b>
0-5 años	37.8	20	15.2	119
Primaria completa	38.0	61	21.5	114
Secundaria y más	48.3	245	28.3	93

\*Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 12 mujeres sin información sobre método usado en la primera relación

**CUADRO 7.12**  
**RAZONES DE NO USO DE ANTICONCEPTIVOS CUANDO LA PRIMERA RELACION**  
**SEXUAL PREMARITAL Y MARITAL. ENSMI-98**

RAZON DE NO USO	TIPO DE RELACION SEXUAL	
	PREMARITAL	MARITAL
No esperaba tener relaciones	47.3	4.3
No conocía ningún método	28.7	58.4
Quería tener un hijo	5.1	16.4
Pensaba que no podía embarazarse	5.2	2.4
Oposición de la pareja	4.4	8.8
Vergüenza de comprarlo	2.2	3.4
Otro	2.8	6.1
No sabe/No responde	4.4	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>451</b>	<b>92</b>

años, presentan el segundo porcentaje más alto de relaciones sexuales premaritales, entre el grupo de países comparados. Más alto aún que Brasil. En cuanto al uso de anticonceptivos en la primera relación, el porcentaje es similar al Brasil, más bajo que Jamaica y más alto que en los demás países de la región.

CUADRO 7.13

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE REPORTARON EXPERIENCIA SEXUAL PREMARITAL Y USO DE ANTICONCEPTIVOS EN LA PRIMERA RELACION SEXUAL. COMPARACION CON ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA. ENSMI-98**

PAIS	AÑO DE ENCUESTA	PORCENTAJE		
		CON EXPERIENCIA SEXUAL PREMARITAL		USO ANTICONCEPTIVO EN LA 1RA. RELACION
		15-19	20-24	15-24
Paraguay	1998	30.0	62.2	33.2
Jamaica	1997	51.4	89.9	55.7
Brasil	1996	29.1	58.5	33.1
Puerto Rico	1995	24.9	46.1	27.1
Honduras	1996	22.9	50.0	6.5
Costa Rica	1991	21.7	39.9	22.4
El Salvador	1998	20.4	42.2	9.5
Ecuador	1994	16.3	35.2	3.9
R.Dominicana	1992	15.3	24.6	16.4

## 7.4 Actividad sexual actual

Del total de jóvenes, 40.8% son sexualmente activas ahora (es decir, han tenido relaciones sexuales en los últimos 3 meses): 96.8% de las jóvenes actualmente unidas y 15.8% de las no unidas (**Cuadro 7.14**). Entre las jóvenes no unidas, se observa que una gran parte de las que están teniendo relaciones sexuales las tienen esporádicamente: solamente 10.2% de ellas las han tenido en las últimas 4 semanas. Más jóvenes no unidas de 20-24 años están sexualmente activas (22.0% en los últimos 3 meses) que las de 15-19 años (12.8% en los últimos 3 meses).

De todas las jóvenes que han tenido relaciones sexuales en los últimos 3 meses, un alto porcentaje 63.5%, declaró haber usado un método anticonceptivo la última vez (56.4% de las unidas y 82.8% de las no unidas). Entre las unidas, el método más usado es la pastilla (28.7%), seguido del inyectable (24.2%) y el DIU (16.4%), con muy poca variación entre las de 15-19 años y las de 20-24. Entre las no unidas, los métodos más usados son el condón (35.1%), el retiro (17.9%), el inyectable (15.6%) y la pastilla (14.3%), con diferencias entre las de 15-19 y 20-24 años en el uso de la píldora y el retiro. La píldora es más usada por el grupo de edades 20-24 años (24.8%) y el retiro es más usado por las de 15-19 años (26.1%).

## CUADRO 7.14

ACTIVIDAD SEXUAL Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS POR ESTADO CIVIL,  
MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98

ACTIVIDAD SEXUAL	TOTAL DE MUJERES 15-24 AÑOS DE EDAD			TOTAL	UNIDA		NO UNIDA		
	TOTAL	15-19	20-24		15-19	20-24	TOTAL	15-19	20-24
% sexualmente activa, total de jóvenes									
últimas 4 semanas	34.1	20.6	50.8	87.6	90.2	86.6	10.2	7.9	15.1
últimos 3 meses	40.8	25.7	59.4	96.8	96.9	96.8	15.8	12.8	22.0
Número de casos	1368	766	602	493	133	360	875	633	242
% sexualmente activa, jóvenes con experiencia sexual									
últimas 4 semanas	63.0	59.2	65.0	88.1	90.2	87.2	30.2	34.6	26.4
últimos 3 meses	75.3	74.1	76.0	97.3	96.9	97.5	46.5	55.9	38.6
Número de Casos	800	294	506	488	133	355	312	161	151
% usó un método la última vez, sexualmente activas -									
3 meses	63.5	61.2	64.7	56.4	46.2	60.3	82.8	82.0	83.9
Número de Casos	639	221	418	475	128	347	164	93	71
% que usaron método									
Píldora	23.6	15.9	27.6	28.7	29.4	28.5	14.3	5.4	24.8
Inyección	21.2	21.4	21.2	24.2	25.0	24.0	15.6	18.6	12.2
Condón	21.2	26.2	18.7	13.8	15.2	13.3	35.1	34.7	35.7
Retiro	11.5	19.7	7.4	8.1	11.4	7.2	17.9	26.1	8.2
DIU	11.6	4.8	15.0	16.4	11.1	17.9	2.7	0.0	5.9
Ritmo	5.6	8.7	4.0	2.2	2.5	2.1	11.8	13.4	10.0
Billings	0.6	0.1	0.8	0.7	0.1	0.9	0.2	0.0	0.5
Vaginales	0.3	0.4	0.2	0.2	0.0	0.2	0.4	0.7	0.0
Otro	4.4	3.0	5.1	5.7	5.3	5.9	2.0	1.2	2.9
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Número de Casos	433	142	291	304	70	234	129	72	57

Como se mencionó anteriormente, una gran parte de las no unidas que están teniendo relaciones sexuales las tienen esporádicamente. El Cuadro 7.15 muestra que 80.3 por ciento de las jóvenes adultas no unidas que tuvieron relaciones sexuales en las últimas 4 semanas tuvieron solamente de 1 a 4 relaciones sexuales en ese período de tiempo.

CUADRO 7.15

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE FRECUENCIA DE RELACIONES SEXUALES: JOVENES ADULTAS QUE  
TUVIERON RELACIONES SEXUALES EN LAS ULTIMAS 4 SEMANAS,  
POR EDAD Y ESTADO CIVIL. ENSMI-98**

FRECUENCIA DE RELACIONES	TOTAL DE MUJERES 15-24 AÑOS DE EDAD			UNIDAS TOTAL	NO UNIDAS		TOTAL	15-19	20-24
	TOTAL	15-19	20-24		15-19	20-24			
1-4 veces	41.3	42.1	40.9	31.1	21.8	34.8	80.3	84.1	76.2
5-8 veces	16.3	14.3	17.3	18.8	19.7	18.4	6.8	3.2	10.8
9-12 veces	17.4	12.3	20.0	21.8	18.2	23.2	0.9	0.0	2.0
13 veces y más	12.5	15.9	10.8	15.6	23.6	12.5	0.4	0.0	0.9
No sabe/No responde	12.5	15.4	11.0	12.7	16.7	11.2	11.5	12.7	10.2
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>534</b>	<b>175</b>	<b>359</b>	<b>430</b>	<b>118</b>	<b>312</b>	<b>104</b>	<b>57</b>	<b>47</b>

## 7.5 Educación sexual

El Cuadro 7.16 muestra el porcentaje de jóvenes que tuvo un curso de educación sexual por grupos de edades y lugar donde recibió el curso, según los resultados de la ENSMI-98.

El porcentaje de jóvenes que recibió un curso de educación sexual en la escuela solamente y en la escuela y fuera de ella aumentó de 52% en 1995 a 61% en 1998. Esta subida se registra en todos los grupos de edades en relación a la encuesta de 1995. La proporción que tuvo un curso en la escuela es mayor entre las más jóvenes y disminuye a mayor edad.

Más jóvenes de 15-19 años que jóvenes de 20-24 años recibieron curso o charla de educación sexual en la escuela o colegio, lo que indica un incremento importante en la educación sexual en los últimos años (Cuadro 7.17). La educación sexual es mayor en Asunción que en el Resto del País, pero la diferencia más destacada se verifica entre el área urbana y rural.

CUADRO 7.16

**PORCENTAJE DE JOVENES QUE TUVIERON UN CURSO EN EDUCACION SEXUAL,  
POR LUGAR DONDE TUVO EL CURSO Y GRUPOS DE EDAD. ENSMI-98**

LUGAR DONDE TUVO EL CURSO	TOTAL	EDAD, GRUPOS DE 5 AÑOS		EDAD, GRUPOS DE 2-3 AÑOS			
		15-19	20-24	15-17	18-19	20-22	23-24
En escuela solamente	48.3	56.1	38.8	58.8	51.8	39.6	37.4
En escuela y fuera	12.2	10.5	14.2	9.3	12.5	14.2	14.2
Fuera de escuela solamente	3.4	2.9	4.1	2.6	3.4	3.5	5.2
Ninguno	35.4	30.3	41.7	29.0	32.4	42.8	39.7
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>1368</b>	<b>766</b>	<b>602</b>	<b>475</b>	<b>291</b>	<b>370</b>	<b>232</b>

## CUADRO 7.17

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON ALGUNA LECCION, CURSO O CHARLA SOBRE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA O COLEGIO, POR EDAD, SEGUN REGION Y AREA DE RESIDENCIA. ENSMI-98**

RESIDENCIA	TOTAL	EDAD, GRUPOS DE 5 AÑOS			EDAD, GRUPOS DE 2-3 AÑOS		
		15-19	20-24	15-17	18-19	20-22	23-24
<b>TOTAL</b>	<b>60.5</b>	<b>66.7</b>	<b>53.0</b>	<b>68.2</b>	<b>64.2</b>	<b>53.7</b>	<b>51.6</b>
Nº de Casos	1368	766	602	475	291	370	232
<b>REGION</b>							
Gran Asunción	76.9	80.2	74.0	81.1	78.5	75.3	71.5
Nº de Casos	404	200	204	121	79	121	83
Resto del País	53.5	61.9	41.9	63.5	59.4	42.2	41.4
Nº de Casos	964	566	398	354	212	249	149
<b>AREA</b>							
Urbana	75.9	80.9	70.3	83.4	77.1	72.4	66.2
Nº de Casos	854	457	397	277	180	254	143
Rural	38.7	48.2	25.7	49.8	45.2	22.3	31.2
Nº de Casos	514	309	205	198	111	116	89

En cuanto a los temas cubiertos en los cursos, más de 85 por ciento incluyen desarrollo del cuerpo, aparato reproductor masculino y femenino, y la menstruación (**Cuadro 7.18**). Al igual que en la encuesta de 1995, “métodos anticonceptivos” es el tema menos tratado en los cursos de educación sexual, con solamente 68.6 por ciento.

## CUADRO 7.18

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD CUYO CURSO EN EDUCACION SEXUAL INCLUYO TEMAS SELECCIONADOS, POR REGION Y AREA DE RESIDENCIA, SEGUN TEMAS. ENSMI-98**

TEMAS	TOTAL DEL PAIS	REGION		AREA	
		GRAN ASUNCION	RESTO DEL PAIS	URBANA	RURAL
Menstruación o regla	96.7	95.8	97.2	96.7	96.5
Aparato Reproductor Femenino	95.1	95.8	94.7	96.4	91.6
Aparato Reproductor Masculino	94.5	94.9	94.3	95.8	91.0
Desarrollo del Cuerpo en la Pubertad	94.2	96.2	93.0	95.8	89.6
Embarazo y Parto	85.8	85.0	86.3	87.5	81.2
Relaciones Sexuales	84.1	85.1	83.5	86.6	77.2
SIDA	78.3	71.9	82.2	78.0	79.1
Enfermedades de Transmisión Sexual	77.9	80.3	76.4	80.2	71.3
Métodos Anticonceptivos	68.6	64.7	70.9	69.8	65.3
<b>Nº de Casos</b>	<b>840</b>	<b>294</b>	<b>546</b>	<b>605</b>	<b>235</b>

## 7.6 Conocimientos y actitudes

Los datos en el Cuadro 7.19 indican que solamente 20.3% de las jóvenes conocen cuál es el período más fértil dentro del ciclo menstrual. El porcentaje es más bajo entre las más jóvenes, las que viven en áreas rurales o el Resto del País, y las que tienen menos educación. Más mujeres que tuvieron un curso en educación sexual donde se trató el tema de la menstruación pudieron identificar correctamente el período más fértil frente a las que no tuvieron un curso (24.5% comparado con 14.2%).

**CUADRO 7.19**  
**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD QUE CONOCEN CUANDO ES MAS PROBABLE QUEDARSE EMBARAZADA DURANTE EL CICLO MENSTRUAL, POR REGION Y AREA, SEGUN HA ASISTIDO A UN CURSO DE EDUCACION SEXUAL QUE TRATO EL TEMA DE LA MENSTRUACION. ENSMI-98**

CARACTERISTICA	TOTAL DE MUJERES		CON EDUCACION SEXUAL		SIN EDUCACION SEXUAL	
	%	Nº de Casos	%	Nº de Casos	%	Nº de Casos
<b>TOTAL</b>	20.3	1368	24.5	820	14.2	548
<b>EDAD</b>						
15-19	16.3	766	19.9	499	9.6	267
20-24	25.2	602	31.7	321	18.4	281
<b>AREA</b>						
Urbana	24.4	854	27.2	591	16.8	263
Rural	14.4	514	17.3	229	12.7	285
<b>REGION</b>						
Gran Asunción	28.7	404	30.6	289	23.3	115
Resto del País	16.7	964	20.9	531	12.1	433
<b>INSTRUCCION</b>						
0-5 años	9.4	251	8.8	36	9.6	215
Primaria Completa	13.1	324	8.2	119	15.8	205
Secund.Incompleta	22.8	552	23.3	452	20.5	100
Secund.Completa y +	36.3	241	38.3	213	22.2	28

A todas las jóvenes que han tenido relaciones sexuales, se les preguntó cuál es el método que consideran más apropiado para jóvenes de su edad (Cuadro 7.20). En la encuesta de 1995, los métodos más citados fueron pastillas (23.1%), inyectables (20.9%), y condón (18.9%). En la encuesta de 1998, son los mismos métodos, pero en el siguiente orden: condón (27.2%), pastillas (21.9%) e inyectable (18%). Igual que en 1995, un quinto de las jóvenes no saben que responder.

En cuanto al uso de un método anticonceptivo, 37.8% de las jóvenes que han tenido relaciones sexuales creen que es la mujer la que debe tomar la iniciativa de usar anticonceptivos, 12.1% el hombre, y 44.2% los dos juntos (Cuadro 7.21). La proporción que respondió "los dos juntos" aumentó desde 1995, cuando fue sólo de 31.2 por ciento.

## CUADRO 7.20

## METODO ANTICONCEPTIVO CONSIDERADO MAS APROPIADO PARA JOVENES, POR GRUPOS DE EDAD, MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98

METODO CONSIDERADO MAS APROPIADO	GRUPOS DE EDAD		
	TOTAL	15-19	20-24
Condón	27.2	29.3	26.1
Pastillas	21.9	18.2	23.9
Inyección	18.0	20.3	16.7
DIU	4.9	1.7	6.7
Métodos Naturales	3.9	4.9	3.4
Retiro	1.1	1.3	0.9
Otro	0.7	1.9	0.0
Yuyos	1.6	2.5	1.0
No Sabe/No Responde	20.7	19.8	21.2
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N° DE CASOS</b>	<b>800</b>	<b>294</b>	<b>506</b>

## CUADRO 7.21

## OPINION SOBRE QUIEN DEBE TOMAR LA INICIATIVA PARA USAR UN METODO, POR NIVEL DE INSTRUCCION MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD. ENSMI-98

NIVEL DE INSTRUCCION	OPINION SOBRE QUIEN DEBE INICIAR USO DE UN METODO					TOTAL	N° DE CASOS
	HOMBRE	MUJER	LOS DOS JUNTOS	OTRO	NO SABE/ NO RESPONDE		
<b>TOTAL</b>	<b>12.1</b>	<b>37.8</b>	<b>44.2</b>	<b>0.4</b>	<b>5.4</b>	<b>100.0</b>	<b>800</b>
0-5años	10.4	37.5	35.9	1.5	14.7	100.0	194
Primaria Completa	12.9	49.5	33.1	0.0	4.5	100.0	218
Secund.Incompleta	16.0	29.8	53.5	0.0	0.7	100.0	232
Secund.Completa y +	8.2	34.5	57.3	0.0	0.0	100.0	156

Como se observa en el Cuadro 7.22, 4 de cada 10 jóvenes no piensan que una mujer puede embarazarse la primera vez que tiene relaciones. El 15.2% piensa que es el hombre quien decide los hijos que debe tener la pareja, proporción que desciende con más educación. El 62.9% está de acuerdo que es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio, porcentaje que se mantiene por encima de 60% en todos los niveles de instrucción excepto en el más alto, donde solamente 48.7% está de acuerdo.

CUADRO 7.22

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD DE ACUERDO CON DECLARACIONES REFERENTES A LA FECUNDIDAD, POR NIVEL DE INSTRUCCION. ENSMI-98**

DECLARACION	TOTAL	NIVEL DE INSTRUCCION				
		0-2 AÑOS	3-5 AÑOS	6 AÑOS	7-11 AÑOS	12 Y MÁS
Una mujer puede embarazarse la primera vez que tiene relaciones sexuales	61.5	50.4	55.2	47.0	65.6	79.8
Es el hombre quien decide los hijos que debe tener la pareja	15.2	21.2	22.6	22.6	11.9	4.4
Es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio	62.9	64.6	67.4	60.4	69.4	48.7
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>1368</b>	<b>50</b>	<b>201</b>	<b>324</b>	<b>552</b>	<b>241</b>

Entre las jóvenes que nunca tuvieron relaciones sexuales o cuya primera relación fue marital, la proporción que cree que es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio es de 76% (Cuadro 7.23). Sin embargo, (46.5%) de las jóvenes que dijeron que es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio ya tuvieron relaciones premaritales, mostrando que su comportamiento es diferente a su ideal. Más jóvenes de 15-19 años creen que es preferible que se llegue virgen al matrimonio (67.3%) frente a mujeres de 20-24 años (57.9%).


CUADRO 7.23

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD DE ACUERDO CON LA DECLARACION QUE ES PREFERIBLE QUE LA MUJER LLEGUE VIRGEN AL MATRIMONIO POR RELACION CON SU PRIMERA PAREJA SEXUAL. ENSMI-98**

RELACION CON LA PRIMERA PAREJA	ES PREFERIBLE QUE LA MUJER LLEGUE VIRGEN AL MATRIMONIO			TOTAL	Nº DE CASOS
	SI	NO	NO SABE		
<b>TOTAL</b>	<b>63.1</b>	<b>24.5</b>	<b>12.4</b>	<b>100.0</b>	<b>1350*</b>
Nunca tuvo relaciones	76.2	13.5	10.3	100.0	560
Relaciones Maritales	77.2	11.4	11.4	100.0	130
Relaciones Premaritales	46.5	38.8	14.7	100.0	660
<b>EDAD</b>					
15-19	67.3	19.5	13.2	100.0	758
20-24	57.9	30.6	11.4	100.0	592

\* Excluye 8 mujeres que no respondieron y 10 mujeres cuya primera relación fue una violación

**GRAFICO 7.3**  
**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD DE ACUERDO**  
**CON LA DECLARACION QUE ES PREFERIBLE QUE LA MUJER LLEGUE VIRGEN AL MATRIMONIO**  
**SEGUN EXPERIENCIA SEXUAL Y EDAD ACTUAL, ENSMI-98**



Fuente Quadro 7.2



## CAPITULO 8

# SALUD DE LA MADRE Y DEL NIÑO

En este capítulo se presenta información sobre la salud materno infantil en el Paraguay y se incluyen los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil-98 (ENSMI-98) respecto a atención prenatal y del parto, lugar de ocurrencia del parto, aplicación de toxoide antitetánico, tipo de parto, control del recién nacido y lactancia materna. El conocimiento de estos aspectos permite evaluar la cobertura de los programas de salud e identificar a los grupos menos favorecidos de acuerdo a ciertas características sociodemográficas de la madre.

### 8.1 Control Prenatal y Lugar de Atención del Parto

En la ENSMI-98 se indagó sobre ciertas características de los nacimientos ocurridos entre setiembre de 1995 a agosto de 1998. Los datos refieren al uso de servicios durante el embarazo, parto y postparto para los hijos nacidos vivos en los últimos 3 años antes de la encuesta.

Del total de niños nacidos vivos en los 3 años anteriores a la encuesta, en 88.0 por ciento de ellos, sus madres concurren al control prenatal por lo menos una vez (**Cuadro 8.1**). Este tipo de control es más generalizado en madres que terminaron la primaria o tienen nivel secundario (93 por ciento y más), en madres primerizas (92.6 por ciento), de áreas urbanas (95.4 por ciento) o residentes en Gran Asunción (97.4 por ciento).

En madres sin educación o con apenas 2 años de estudio; solamente 66 por ciento de ellas tuvieron por lo menos un control prenatal. El oportuno y periódico control del desarrollo del embarazo disminuye el riesgo de muerte tanto materna como fetal y favorece la adecuada atención del parto.

En el **Cuadro 8.1** también se presenta la distribución porcentual del lugar donde las madres recibieron su control prenatal. A nivel del país, el 67.3 por ciento usaron los servicios del sector público, el 15.9 por ciento de las mujeres embarazadas recibieron atención en el sector privado, y el 12 por ciento no asistieron a ningún control prenatal.

Las coberturas que presentan los diferentes establecimientos del sector público y privado<sup>1</sup>, de acuerdo a los ámbitos geográficos, tienen comportamientos porcentuales diferentes. Por ejemplo, los controles en clínicas privadas fueron más comunes en el área urbana (29 por ciento) y en Gran Asunción (31.7 por ciento) comparado con controles en el área rural, donde acuden más al sector público.

---


<sup>1</sup> Sector Público y Privado, definidos en el Capítulo 5 de este informe.

CUADRO 8.1

**PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS QUE TUVIERON ATENCION PRENATAL Y LUGAR DONDE RECIBIERON LA ATENCION: NACIDOS VIVOS ENTRE SEPTIEMBRE 1995 Y AGOSTO 1998. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	CONTROL PRENATAL		LUGAR DE ATENCION			NUNCA FUE	TOTAL	N° DE CASOS
	SI	NO	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	OTRO/ NO SABE			
<b>TOTAL</b>	88.0	12.0	67.3	15.9	4.8	12.0	100.0	1540
<b>AREA</b>								
Urbana	95.4	4.6	61.8	29.0	4.6	4.6	100.0	802
Rural	82.9	17.1	71.2	6.9	4.9	17.1	100.0	738
<b>REGION</b>								
Gran Asunción	97.4	2.6	65.3	31.7	0.3	2.6	100.0	375
Resto del País	85.9	14.1	67.8	12.2	5.8	14.1	100.0	1165
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>								
0-2 años	66.4	33.6	48.2	7.9	10.3	33.6	100.0	140
3-5 años	84.0	16.0	68.9	10.7	4.3	16.0	100.0	417
Primaria Completa	93.6	6.4	81.4	8.1	4.1	6.4	100.0	491
Secundaria Incompleta	94.0	6.0	73.5	15.2	5.3	6.0	100.0	265
Secundaria Completa y más	97.1	2.9	41.0	54.2	1.9	2.9	100.0	227
<b>ORDEN DE NACIMIENTO</b>								
1	92.6	7.4	62.9	25.9	3.8	7.4	100.0	342
2-3	90.5	9.5	67.7	18.3	4.6	9.5	100.0	564
4-5	85.3	14.7	70.2	9.7	5.4	14.7	100.0	338
6+	81.9	18.1	68.6	7.8	5.5	18.1	100.0	296

**GRAFICO 8.1**  
**PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS QUE TUVO CONTROL PRENATAL Y QUE LO TUVO EN EL PRIMER TRIMESTRE ENTRE NACIDOS VIVOS SEPT. 1995 - AGOSTO 1998, SEGUN NIVEL EDUCATIVO DE LA MADRE, ENSMI-98**



Fuente Cuadro 8.1 y 8.2

Nivel Educativo

Como se muestra en el **Cuadro 8.2**, a nivel nacional, 12 por ciento de madres no acudieron a ningún control prenatal, y 3.4 por ciento de las madres realizaron uno sólo, 19.1 por ciento acudieron a dos o tres controles, y 9.0 por ciento realizó cuatro. En el 55.7 por ciento de los nacimientos, las madres se realizaron el número adecuado, ( cinco y más controles). Se muestra la situación más crítica para tener controles en áreas rurales, donde solamente 39.7 por ciento de las mujeres embarazadas tuvieron controles suficientes.

Las madres sin instrucción o con poca instrucción (0-2 años) y que no terminaron la primaria (3-5 años), están lejos de alcanzar los niveles adecuados de control prenatal (5 y más), apenas 26.3 y 36.3 por ciento para ambos grupos mencionados.

En referencia al trimestre del primer control (**Cuadro 8.2**), los datos nacionales indican que solamente el 34.8 por ciento de las mujeres embarazadas recibieron atención prenatal en el primer trimestre (lo recomendado), más de la mitad (53.2%) en el segundo o tercer trimestre, y el resto (12.0 por ciento) no lo recibió. La asistencia tardía al primer control (en el 2do. o 3er. trimestre) es mayor en las áreas rurales (60.4%) y entre las mujeres con menor educación y con mayor paridez.

CUADRO 8.2

**PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS POR NUMERO DE CONTROLES PRENATALES Y TRIMESTRE DEL PRIMER CONTROL. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	NUMERO DE CONTROLES						TRIMESTRE DEL PRIMER CONTROL			TOTAL	N°.DE CASOS
	0	1	2-3	4	5 y más	NS/NR	Ningún	1er	2/3er		
<b>TOTAL</b>	12.0	3.4	19.1	9.0	55.7	0.8	12.0	34.8	53.2	100.0	1538
<b>AREA</b>											
Urbana	4.6	1.0	7.8	6.4	78.9	1.2	4.6	52.5	42.8	100.0	800
Rural	17.0	5.1	27.0	10.7	39.7	0.6	17.0	22.6	60.4	100.0	738
<b>REGION</b>											
Gran Asunción	2.7	0.9	4.0	7.0	84.5	0.9	2.7	56.0	41.3	100.0	374
Resto del País	14.1	4.0	22.6	9.4	49.0	0.8	14.1	29.9	56.0	100.0	1164
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>											
0-2 años	33.6	5.6	25.0	8.7	26.3	0.9	33.6	21.4	45.1	100.0	140
3-5 años	16.0	5.3	29.6	11.0	36.3	1.8	16.0	22.9	61.1	100.0	418
Primaria Completa	6.4	3.0	18.3	10.1	62.2	0.0	6.4	34.5	59.1	100.0	491
Secundaria Incompleta	6.0	1.5	9.0	9.0	74.6	0.0	6.0	39.7	54.3	100.0	265
Secundaria Completa y más	2.9	0.0	2.1	1.6	92.1	1.2	2.9	70.7	26.4	100.0	224
<b>ORDEN DE NACIMIENTO</b>											
1	7.4	1.6	12.9	5.5	72.2	0.3	7.4	48.0	44.5	100.0	342
2-3	9.6	3.6	14.3	7.7	64.7	0.2	9.6	40.3	50.2	100.0	561
4-5	14.7	2.4	23.7	10.4	48.2	0.6	14.7	27.3	58.0	100.0	338
6+	18.0	6.2	29.1	13.4	30.9	2.6	18.0	19.4	62.7	100.0	297

## 8.2 Vacuna Antitetánica Durante el Embarazo

La aplicación de la vacuna antitetánica durante el embarazo es para prevenir al niño de contraer el tétano neonatal y a la mujer de contraer el tétano obstétrico, producto de las deficientes condiciones de higiene que rodean al parto. La importancia de esta vacuna es mayor para los partos no atendidos profesionalmente y en zonas de alta prevalencia.

Al nivel nacional, la ENSMI-98 encontró una cobertura de 89 por ciento de aplicación de esta vacuna en los embarazos de los últimos tres años anteriores a la encuesta (**Cuadro 8.3**). Este tipo de vacunación es más común entre madres en áreas urbanas (92.4 por ciento) y Gran Asunción (92.7 por ciento).

Las madres que no completaron el nivel primario tienen porcentajes más bajo de aplicación de esta vacuna. Las que completaron el ciclo primario o tienen nivel secundario, reportaron proporciones mayores a 90 por ciento. También las mujeres que tuvieron menos de 4 hijos, en más del 90 por ciento de los casos se aplicaron la vacuna antitetánica durante el embarazo.

**CUADRO 8.3**  
**PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS PARA LOS**  
**CUALES RECIBIERON LA VACUNA ANTITETANICA DURANTE EL**  
**EMBARAZO. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	VACUNA ANTITETANICA			TOTAL	N° DE CASOS
	SI	NO	NS/NR		
<b>TOTAL</b>	<b>89.1</b>	<b>10.6</b>	<b>0.3</b>	<b>100.0</b>	<b>1535</b>
<b>AREA</b>					
Urbana	92.4	7.4	0.2	100.0	797
Rural	86.8	12.8	0.3	100.0	738
<b>REGION</b>					
Gran Asunción	92.7	7.3	0.0	100.0	374
Resto del País	88.3	11.4	0.4	100.0	1161
<b>NIVEL DE INSTRUCCIÓN</b>					
0-2 años	74.0	26.0	0.0	100.0	139
3-5 años	87.7	11.7	0.6	100.0	417
Primaria C completa	92.4	7.6	0.0	100.0	490
Secundaria Incompleta	90.0	9.4	0.6	100.0	263
Secundaria Completa y más	97.3	2.7	0.0	100.0	226
<b>ORDEN DE NACIMIENTO</b>					
1	91.4	8.6	0.0	100.0	341
2-3	92.7	7.1	0.3	100.0	561
4-5	86.7	13.3	0.0	100.0	337
6+	83.4	15.7	1.0	100.0	296

### 8.3 Lugar de Atención y Tipo de Asistencia Profesional del Parto

En el Cuadro 8.4 se presenta la distribución de los nacidos vivos en los últimos 3 años anteriores a la encuesta, por lugar de atención del parto, institucional y domiciliario. Para los institucionales se presenta el porcentaje en instituciones públicas y privadas, y para los partos domiciliarios se presenta información sobre quien asistió al parto.


A nivel nacional, el 56.3 por ciento de los partos fueron institucionales, 39.3 domiciliarios y 4.4% en otro lugar. De los partos institucionales, 43.8 por ciento ocurrió en instituciones públicas y 12.5 por ciento en centros privados. Los partos institucionales son más comunes en áreas urbanas (81.3%) y Gran Asunción (92.9%), para las mujeres con educación secundaria o superior (93.7) y para los primeros partos de una mujer (73.5%).

De los partos domiciliarios, una pequeña proporción lo tuvo con una obstetra profesional (4.5 por ciento), 31.8 por ciento con parteras empíricas, los demás partos domiciliarios fueron con familiares o solas (3%). Los partos domiciliarios con una partera son más frecuentes en áreas rurales (46.2 por ciento) y en el Resto del País (38.1 por ciento); y para mujeres menos educadas (50.9).

CUADRO 8.4

#### DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS NACIDOS VIVOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS, POR LUGAR DE ATENCION DEL PARTO. ENSMI-98

CARACTERISTICAS	PARTO INSTITUCIONAL			PARTO DOMICILIARIO					Nº. DE CASOS	
	TOTAL	PUBLICO	PRIVADO	TOTAL	OBSTETRA	PARTERA	SOLA	OTRO/NS		
<b>TOTAL</b>	56.3	43.8	12.5	39.3	4.5	31.8	3.0	4.4	100.0	1541
<b>AREA</b>										
Urbana	81.3	58.7	22.6	15.1	2.5	11.0	1.5	3.7	100.0	802
Rural	39.0	33.4	5.5	56.2	5.9	46.2	4.1	4.9	100.0	739
<b>REGION</b>										
Gran Asunción	92.9	67.7	25.2	6.2	0.8	5.0	0.4	0.8	100.0	375
Resto del País	47.7	38.2	9.5	47.1	5.3	38.1	3.7	5.2	100.0	1166
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>										
0-2 años	21.8	21.3	0.5	65.8	7.7	50.9	7.1	12.4	100.0	140
3-5 años	41.0	34.0	6.9	56.3	5.3	47.0	3.9	2.8	100.0	418
Primaria Completa	60.9	53.0	8.0	35.6	5.3	28.9	1.3	3.5	100.0	491
Secundaria Incompleta	72.8	60.0	12.9	23.0	2.3	17.2	3.5	4.1	100.0	265
Secundaria Completa y más	93.7	47.3	46.5	2.7	0.2	1.6	0.9	3.5	100.0	227
<b>ORDEN DE NACIMIENTO</b>										
1	73.5	51.9	21.6	22.3	2.6	18.5	1.2	4.1	100.0	342
2-3	67.6	51.1	16.5	28.2	5.1	20.0	3.0	4.2	100.0	564
4-5	41.3	36.9	4.4	53.1	5.5	44.8	2.7	5.6	100.0	338
6+	34.7	30.1	4.6	61.8	4.3	52.0	5.5	3.5	100.0	297



**CUADRO 8.5**

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PARTOS INSTITUCIONALES EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS POR TIPO DE ASISTENCIA PROFESIONAL. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	QUIEN ASISTIO EL PARTO				TOTAL	N°. DE CASOS
	MEDICO	OBSTETRA	ENFERMERA	OTRO/NS		
<b>TOTAL</b>	52.1	42.3	5.6	0.0	100.0	641
<b>AREA</b>						
Urbana	60.9	36.8	2.2	0.1	100.0	361
Rural	43.8	47.4	8.7	0.0	100.0	280
<b>REGION</b>						
Gran Asunción	69.6	30.3	0.1	0.0	100.0	153
Resto del País	46.9	45.8	7.2	0.1	100.0	488
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>						
0-2 años	52.7	47.3	0.0	0.0	100.0	40
3-5 años	53.5	36.2	10.3	0.0	100.0	173
Primaria Completa	55.3	41.7	2.9	0.1	100.0	245
Secundaria Incompleta	38.5	55.4	6.1	0.0	100.0	129
Secundaria Completa y más	70.7	25.8	3.6	0.0	100.0	54
<b>ORDEN DE NACIMIENTO</b>						
1	60.6	33.8	5.7	0.0	100.0	144
2-3	48.5	46.0	5.3	0.1	100.0	241
4-5	51.0	44.7	4.3	0.0	100.0	137
6+	49.1	43.4	7.5	0.0	100.0	119

El **Cuadro 8.5** muestra la distribución de los partos institucionales (se excluye del análisis los partos ocurridos en la casa) en los últimos 3 años por tipo de profesional que asistió el parto.

En más de la mitad de los partos institucionales, la atención profesional del parto la realiza el médico (52.1%), 42.3 por ciento la obstetra y 5.6 por ciento la enfermera o la auxiliar de enfermería.

Médicos atendieron los partos institucionales más frecuentemente en áreas urbanas (60.9 por ciento) que en áreas rurales (43.8 por ciento). Aumenta la atención de médicos cuando la madre vive en Gran Asunción (69.6%) o tiene secundaria completa y más (70.7%). Es importante la atención de la obstetra en zonas rurales (47.4 por ciento).

## 8.4 Tipo de Parto

Los hallazgos de la ENSMI-98 presentados en el **Cuadro 8.6** indican que el 16.5 por ciento de los partos fueron por cesárea, y el otro 83.5 por ciento fueron por vía vaginal.

El porcentaje de cesáreas en áreas urbanas es 5 veces más que el porcentaje de cesáreas en áreas rurales (31.5 contra 6.2 por ciento).

Las tasas más altas de cesáreas se encuentran entre los partos de mujeres con nivel secundario incompleto (17.2%) y entre las que completaron el nivel secundario o tienen nivel superior (47.4%). También entre los primeros (24.8%) o segundos partos (20.7%).

**CUADRO 8.6**

**TIPO DE PARTO: PARTOS DE NACIDOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS. ENSMI-98**

CARACTERÍSTICAS	TIPO DE PARTO		TOTAL	Nº. DE CASOS
	VAGINAL	CESAREA		
<b>TOTAL</b>	83.5	16.5	100.0	1540
<b>AREA</b>				
Urbana	68.5	31.5	100.0	802
Rural	93.8	6.2	100.0	738
<b>REGION</b>				
Gran Asuncion	63.3	36.7	100.0	375
Resto del País	88.2	11.8	100.0	1165
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>				
0-2 años	94.5	5.5	100.0	140
3-5 años	90.7	9.3	100.0	418
Primaria Completa	85.5	14.5	100.0	490
Secundaria Incompleta	82.8	17.2	100.0	265
Secundaria Completa y más	52.6	47.4	100.0	227
<b>ORDEN DE NACIMIENTO</b>				
1	75.2	24.8	100.0	342
2-3	79.3	20.7	100.0	563
4-5	88.7	11.3	100.0	338
6+	93.6	6.4	100.0	297

Cabe mencionar que la Organización Panamericana de Salud en su plan de reducción de la mortalidad materna indica que la tasa de cesárea no debe ser mayor al 15%. Una tasa mayor surge que se están haciendo cesáreas innecesarias, que también tienen cierto riesgo para la mortalidad materna.

## 8.5 Control del niño sano

La prevalencia de control médico del niño después del nacimiento tiene gran significado en las prácticas de medicina preventiva para la sistematización del examen del niño «sano», así como el examen médico del niño enfermo, ya que las dos vertientes permiten identificar las condiciones de desarrollo del niño, como las de prevenir y tratar oportunamente las condiciones de morbilidad.

Según demuestran los datos del **Cuadro 8.7**, del total de niños nacidos vivos entre setiembre de 1995 y agosto de 1998, el 79.0% fueron llevados al control médico del recién nacido para el total del país. Existe algún predominio del control médico del niño en el Gran Asunción (96.7%) y en áreas urbanas, donde 93.1% de los niños fueron llevados al control.

Respecto a la educación, las cifras son más altas entre madres que tienen más años de instrucción; el 56.8% de los hijos de madres con ningún año aprobado o con 2 años de estudio fueron llevados al control, frente al 86.9% de los hijos de madres con secundaria incompleta y 97.5% de los hijos de madres con secundaria completa o superior.

Considerando los niños que se hicieron control médico, el 12.4 por ciento de ellos concurren en condiciones de enfermos y el 87.6% con estado sano. El control de niños en condición de enfermos no presenta diferencias entre áreas urbanas (12.9%) y rurales (12%). Según nivel de instrucción la frecuencia del control del niño enfermo disminuye con más años de instrucción.

En cuanto al lugar en el que se realizó el control del niño, el primer lugar ocupan los servicios públicos (establecimientos del Ministerio de Salud Pública, principalmente), con 77.5% y luego el sector privado con 19.5% y las parteras, 3.0%.

Respecto a la edad del niño al primer control médico, el 61.8% lo hacen antes de cumplir el primer mes de vida y el 20.5% cumplido el mes de edad y sólo 7.7% cuando los infantes tienen 3 meses o más. Valores destacados de control antes del primer mes se registran en áreas urbanas (81.3%) y Gran Asunción (83.4%). Cuando la educación de la mujer es secundaria o superior en casi el 100% de los casos, el primer control se produce antes o cumplido el mes de edad (99.4%).

## 8.6 Iniciación de la Lactancia Materna

En el **Cuadro 8.8** se muestran el porcentaje de los últimos nacidos vivos en los últimos 3 años que recibieron lactancia materna, alguna vez (94.2%), en la primera hora (30.4%) y en el primer día (69.0%). En general, las mujeres de áreas urbanas (92.7%) y de Gran Asunción (92.4%) son las que tienden a amamantar menos que las mujeres rurales (95.4%) o del Resto del País (94.7%).

CUADRO 8.7

PORCENTAJE DE LOS NACIDOS VIVOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS LLEVADOS PARA EL CONTROL DEL RECIEN NACIDO, SEGUN CARACTERISTICAS AL PRIMER CONTROL, ENSMI-98

CARACTERISTICAS	TOTAL	AREA		REGION		NIVEL DE INSTRUCCIÓN				
		URBANA	RURAL	ASUNCION	RESTO DEL PAIS	0-2 AÑOS	3-5 AÑOS	PRIMARIA COMPLETA	SECUNDARIA INCOMPLETA	SECUNDARIA COMPLETA O +
<b>CONTROL DEL RECIEN NACIDO</b>										
Sí	79.0	93.1	69.9	96.7	75.3	56.8	71.9	82.4	86.9	97.5
No	21.0	6.9	30.1	3.3	24.7	43.2	28.1	17.6	13.1	2.5
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0N°. de
Casos	970	543	427	254	716	67	233	320	177	173
<b>ESTADO DE SALUD DEL NIÑO</b>										
Enfermo	12.4	12.9	12.0	8.5	13.5	20.8	16.9	8.8	9.1	11.3
Sano	87.6	87.1	88.0	91.4	86.5	79.2	83.1	91.1	90.9	88.7
NS/NR	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
<b>LUGAR DE ATENCION</b>										
Publico	77.5	67.3	86.5	69.7	79.7	80.8	88.8	83.0	78.2	44.8
Privado	19.5	30.0	10.2	29.8	16.7	7.9	9.3	16.0	15.8	53.8
Partera/Otro/NS	3.0	2.7	3.2	0.5	3.7	11.3	1.9	1.0	6.0	1.4
<b>EDAD DEL NIÑO AL PRIMER CONTROL</b>										
< 1mes	61.8	81.3	44.6	83.4	55.8	35.9	46.9	63.5	69.2	88.9
1 mes	20.5	11.4	28.5	13.6	22.4	37.5	25.1	18.6	18.4	10.5
2 meses	9.6	4.9	13.7	2.5	11.6	13.7	10.7	13.0	8.2	0.3
3+	7.7	2.4	12.4	0.6	9.7	12.9	15.9	4.9	4.3	0.3
NS/NR	0.4	0.0	0.7	0.0	0.5	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N°. DE CASOS</b>	<b>863</b>	<b>514</b>	<b>349</b>	<b>245</b>	<b>618</b>	<b>48</b>	<b>192</b>	<b>289</b>	<b>165</b>	<b>169</b>

El inicio precoz de la lactancia materna es beneficioso para la salud de la madre y del niño. Si la madre empieza a dar pecho inmediatamente después del parto, se produce una descarga de oxitocina y causa contracciones del útero que contribuyen a la disminución del sangrado postparto. Además, al mamar en forma precoz, el niño ingiere calostro, que contribuye a su protección contra varios tipos de bacterias y otros organismos dañinos (McCann et al., 1984).

En el mismo cuadro, se presenta también el tiempo que transcurrió entre el parto y cuando comenzó a dar el pecho por primera vez la madre. El 30.4% le dio el pecho en la primera hora y el 69.0% en el primer día del parto.

CUADRO 8.8

**PORCENTAJE DE LOS NACIDOS VIVOS EN LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS, QUE RECIBIERON LACTANCIA MATERNA, SEGUN TIEMPO AL INICIARLA. ENSMI-98**

CARACTERÍSTICAS	LE DIO LACTANCIA MATERNA			N° DE CASOS
	ALGUNA VEZ	EN LA PRIMERA HORA	EN EL PRIMER DÍA	
<b>TOTAL</b>	94.2	30.4	69.0	1251
<b>AREA</b>				
Urbana	92.7	29.9	72.8	676
Rural	95.4	30.8	66.1	575
<b>REGION</b>				
Gran Asunción	92.4	31.7	77.6	318
Resto del País	94.7	30.0	66.8	933
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>				
0-2 años	93.5	22.3	55.0	106
3-5 años	96.5	32.7	68.3	326
Primaria Completa	92.1	31.2	70.0	402
Secundaria Incompleta	93.1	30.3	72.6	212
Secundaria Completa y más	95.5	30.1	75.5	205

## 8.7 Duración de la Lactancia

La duración promedio de lactancia en Paraguay es de 11.5 meses, **Cuadro 8.9**. Este nivel ya se había encontrado en la Encuesta de 1995. La duración de la lactancia disminuye en madres que residen en áreas urbanas (9.6 meses), en Gran Asunción (8.9 meses) y con mayor nivel de instrucción (7.2 meses las que tienen nivel secundario o superior).

**CUADRO 8.9**

**DURACION PROMEDIO EN MESES DE LA LACTANCIA MATERNA:  
NACIDOS VIVOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	DURACION PROMEDIO (MESES)	Nº. DE CASOS
<b>TOTAL</b>	11.5	2958
<b>AREA</b>		
Urbana	9.6	1520
Rural	12.7	1438
<b>REGION</b>		
Gran Asunción	8.9	722
Resto del País	12.2	2236
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>		
0-2 años	.	275
3-5 años	13.1	816
Primaria Completa	11.6	925
Secundaria Incompleta	10.3	488
Secundaria Completa y más	7.2	454



## CAPITULO 9

# ABUSO VERBAL Y FISICO DE LA MUJER

El CEPEP incluyó en la ENSMI-98, por segunda vez en este tipo de encuestas, un módulo sobre maltratos hacia la mujer y relaciones en el hogar. El objetivo fue obtener información sobre antecedentes de maltratos en su niñez o en el hogar; el acceso de la mujer al ingreso familiar; sus opiniones acerca de la equidad en las relaciones de pareja y prevalencia de la violencia conyugal.

### 9.1 Antecedentes de Violencia entre los Padres

Los antecedentes de maltrato en el hogar entre los padres, durante la niñez o adolescencia de los hijos, ha sido identificado como uno de los mayores factores de riesgo para el maltrato en las edades adultas (1,2). Como los patrones de comportamiento violento frecuentemente pasan de generación a generación, para las mujeres adultas, haber visto o escuchado maltrato entre los padres puede resultar en que ellas sean víctimas de maltrato por un esposo o compañero.

En Paraguay, 18.2% de las mujeres reportaron haber escuchado o visto a sus padres maltratarse cuando eran niñas o adolescentes (**Cuadro 9.1**). Existe diferencia entre mujeres residentes en áreas urbanas y rurales, con un porcentaje menor de mujeres en áreas rurales reportando haber escuchado o visto a sus padres maltratarse. En cuanto a edad, mujeres con 35 años o más reportaron con menos frecuencia haber escuchado o visto maltrato entre los padres (15.1%) comparadas con mujeres más jóvenes. Hubo poca variación en los porcentajes por años de educación e idioma hablado.

---

<sup>(1)</sup> Straus MA, Gelles RJ. Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptations to Violence in 8,145 Families. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1990.

<sup>(2)</sup> Deitz P

## CUADRO 9.1

## PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD QUE DURANTE SU NIÑEZ O ADOLESCENCIA ALGUNA VEZ VIO O ESCUCHO A SUS PADRES MALTRATARSE FÍSICAMENTE. ENSMI-98

CARACTERÍSTICAS	ALGUNA VEZ VIO O ESCUCHO A SUS PADRES MALTRATARSE	Nº DE CASOS
<b>TOTAL</b>	<b>18.2</b>	<b>3598</b>
<b>AREA</b>		
Urbana	20.0	2199
Rural	16.0	1399
<b>EDAD ACTUAL</b>		
15-24	19.1	1368
25-34	19.5	1264
35-44	15.1	966
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>		
0-5 años	18.4	930
Primaria Completa	16.4	988
Secundaria Incompleta	19.5	923
Secundaria Completa y más	18.6	757
<b>IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR</b>		
Guaraní	17.9	1204
Guaraní/Español	18.3	1678
Español	18.5	661
Otro idioma	19.2	55

## 9.2 Violencia Física Hacia las Mujeres

En total, 17.6% de las mujeres paraguayas reportaron haber recibido maltrato físico alguna vez en su vida (**Cuadro 9.2**). No se encontró diferencias entre mujeres residentes en áreas urbanas y rurales. El porcentaje aumenta suavemente con la edad, y disminuye con los años de educación.

Tal como esperamos, las mujeres separadas, divorciadas, o viudas reportaron con más frecuencia haber sido maltratadas (35.6%) comparadas con mujeres actualmente casadas (19.4%) o las solteras (12.5%). Por tanto, es importante tomar en cuenta la posibilidad de baja respuesta, especialmente de las mujeres casadas, por miedo de posibles represalias.

Mujeres que hablan Guaraní u otros idiomas informaron con más frecuencia haber sido maltratadas, comparadas con las que hablan Guaraní/Español o sólo Español.

Los datos parecen confirmar lo encontrado en una investigación previa en que las mujeres expuestas durante su niñez a maltrato físico entre sus padres tienen más probabilidad de recibir maltratos físicos alguna vez en su vida (1).

Mientras que 12.0% de las mujeres que reportaron no haber visto maltrato entre sus padres reportaron haber sido maltratadas, 42.4% de las mujeres que habían visto maltrato entre sus padres habían sido víctimas de maltratos físicos.

**CUADRO 9.2**  
**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD QUE ALGUNA VEZ HAN RECIBIDO MALTRATOS FÍSICOS. ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	ALGUNA VEZ RECIBIO MALTRATOS FISICOS	Nº DE CASOS
<b>TOTAL</b>	<b>17.6</b>	<b>3598</b>
<b>AREA</b>		
Urbana	17.7	2199
Rural	17.5	1399
<b>EDAD ACTUAL</b>		
15-24	15.5	1368
25-34	18.2	1264
35-44	20.2	966
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>		
0-5 años	20.0	930
Primaria Completa	16.9	988
Secundaria Incompleta	17.5	923
Secundaria Completa y más	15.0	757
<b>ESTADO CIVIL</b>		
Casada/Unida	19.4	2386
Separada/Divorciada/Viuda	35.6	129
Soltera	12.5	1083
<b>IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR</b>		
Guaraní	19.1	1204
Guaraní/Español	16.7	1678
Español	15.3	661
Otro idioma	24.5	55
<b>PADRES SE MALTRATARON</b>		
No	12.0	2884
Si	42.4	714

### 9.3 Tipos de Violencia Recibidas por las Mujeres de sus Parejas

A todas las mujeres que habían tenido pareja, se les preguntó si alguna vez: 1) si habían peleado con un pareja o ex-pareja (verbalmente); 2) si habían recibido insultos verbales de una pareja o ex-pareja; y 3) si habían recibido golpes físicos de una pareja o ex-pareja, (**Cuadro 9.3**). En total, más de la mitad de las mujeres (55.0%) respondió que había peleado con una pareja o ex pareja. Las mujeres que reportaron con menos frecuencia haber peleado alguna vez, eran las residentes de áreas rurales (48.7%), las más jóvenes (52.2%), y las que no tenían educación o tenían 5 años de estudio (49.6%). Mujeres separadas, divorciadas, o viudas reportaron la prevalencia más alta de haber peleado (67%).

## CUADRO 9.3

## PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD QUE HAN TENIDO PAREJA ALGUNA VEZ, SEGUN SU EXPERIENCIA POR TIPO DE VIOLENCIA DE SU PAREJA(\*). ENSMI-98

CARACTERISTICAS	ALGUNA VEZ HAN PELEADO	ALGUNA VEZ INSULTADA	ALGUNA VEZ GOLPEADA	Nº DE CASOS
<b>TOTAL</b>	<b>55.0</b>	<b>30.0</b>	<b>8.6</b>	<b>3343</b>
<b>AREA</b>				
Urbana	60.1	31.9	8.9	2044
Rural	48.7	27.7	8.2	1299
<b>EDAD ACTUAL</b>				
15-24	52.2	23.1	5.4	1131
25-34	56.0	32.0	9.9	1251
35-44	57.4	37.1	11.4	961
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>				
0-5 años	49.6	31.0	11.3	891
Primaria Completa	52.3	31.2	8.9	936
Secundaria Incompleta	56.9	25.5	6.8	787
Secundaria Completa y más	63.8	31.7	6.2	729
<b>ESTADO CIVIL</b>				
Casada/Unida	54.2	32.4	9.5	2385
Separada/Divorciada/Viuda	67.0	56.1	32.1	129
Soltera	55.1	20.9	3.4	829
<b>IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR</b>				
Guaraní	50.2	31.2	6.5	1124
Guaraní/Español	62.2	32.7	8.3	1549
Español	49.2	23.5	7.1	616
Otro idioma	56.8	19.5	10.8	54
<b>EDAD PRIMERA UNION**</b>				
Soltera	55.1	20.9	3.4	829
19 años	55.0	34.1	11.2	1314
20-29 años	55.6	34.8	10.4	1078
30 y más	46.5	17.3	5.0	114

\* Pareja: incluye marido, compañero, novio, exmarido, excompañero, exnovio u otra pareja.

\*\* Faltan 8 casos de edad no declarada a la primera unión.

Casi un tercio (30.0%) de las mujeres reportaron haber recibido insultos verbales de una pareja o ex-pareja. El porcentaje que había recibido insultos verbales aumenta con la edad. Hubo poca variación por nivel de educación y área de residencia. Más de la mitad de las mujeres separadas, divorciadas, y viudas reportaron haber recibido insultos (56.1%), comparadas con las actualmente casadas (32.4%) y las solteras (20.9%). Entre las mujeres alguna vez casadas, las que se casaron con menos de 19 años de edad o con 20-29 años de edad reportaron con más frecuencia haber recibido insultos (34.1% y 34.8%, respectivamente), comparadas con las que se casaron con 30 años de edad o más (17.3%).

En total, 8.6% de las mujeres informaron haber recibido golpes físicos de una pareja o ex-pareja. Así como el hecho de haber sido insultada, la frecuencia de haber sido golpeada aumenta con la edad, y disminuye con más altos niveles de instrucción. Mientras que 11.3% de las mujeres con 0 a 5 años de instrucción reportaron haber recibido golpes, 6.2% de las que tienen 12 años o más de instrucción declararon haber sido golpeadas. El haber sido golpeada varió poco por área de residencia o idioma.

La variación más resaltante se notó según el estado civil actual. Casi un tercio de las mujeres separadas, divorciadas, y viudas (32.1%), reportó haber recibido golpes de un pareja o ex-pareja, comparado con las actualmente casadas/unidas (9.5%) y las solteras (3.4%). Otra vez, es importante recordar la posibilidad de baja respuesta entre las mujeres actualmente casadas o unidas por miedo a represalias. Entre las mujeres alguna vez casadas, la proporción que reportó haber sido golpeada era más alta para las que se casaron con menos de 19 años de edad.

## 9.4 Relaciones Domésticas

La violencia intrafamiliar está relacionada con el ambiente presente en el hogar, y con las actitudes y autodefinición de sus miembros. La Encuesta de 1998 incluyó, por primera vez en el Paraguay, tres preguntas diseñadas a determinar: 1) la medida en que las entrevistadas colaboran con sus parejas en decisiones importantes, 2) la calidad de la relación entre la pareja, y 3) las actitudes de la entrevistada sobre el abuso físico. En la presentación de estos datos, comparamos las mujeres no abusadas y las que alguna vez habían recibido abuso, para determinar si existen diferencias entre los dos grupos.

El **Cuadro 9.4** indica que entre las mujeres nunca abusadas, la mayoría de parejas hicieron decisiones juntas, sobre visitas familiares (77.7%), cuando obtener atención médica para los hijos (49.7%), como disciplinar a los hijos (63.5%), uso de anticonceptivos (52.3%) y como gastar el ingreso del hogar (66.8%). Sólo en el tema de selección de alimentos que cocinar la mujer parecía tomar más responsabilidad para las decisiones (14.9% ambos, en comparación con 77.7% mujer sola).

Comparando las mujeres no abusadas con las que alguna vez en sus vidas fueron abusadas, se nota un patrón muy distinto entre los dos grupos. Las mujeres abusadas respondieron en mayor proporción, en relación a las no abusadas, que el esposo o compañero, o ella sola toman las decisiones en forma separada.

Entre las abusadas, el esposo tomaba decisiones sólo sobre visitas familiares (26.7% entre abusadas comparado con 10.8% entre no abusadas). Atención médica para los hijos (19.8% comparado con 9.2% entre no abusadas), como disciplinar a los hijos (19.5% comparado con 8%), uso de anticonceptivos (17.5% comparado con 6%) y como gastar el ingreso (30.1% comparado con 14.7%). En cada uno de estos elementos, la mujer sola, alguna vez abusada, también tomaba más decisiones, que las mujeres no abusadas. Esto se debe principalmente al hecho de que muchas de las abusadas viven sin esposo, debido al divorcio y separación.

CUADRO 9.4

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ CASADAS/UNIDAS, SEGÚN LA PERSONA DE SU FAMILIA QUE TOMA DECISIONES, COMPARANDO MUJERES ABUSADAS ALGUNA VEZ Y NUNCA ABUSADAS. ENSMI-98**

DECISIONES	NUNCA ABUSADA	ALGUNA VEZ ABUSADA
<b>VISITAS FAMILIARES</b>		
Entrevistada	11.8	13.4
El esposo/compañero	10.8	26.7
Ambos	77.0	58.6
No sabe/No responde	0.5	1.2
<b>ALIMENTOS QUE COCINAR DIARIAMENTE</b>		
Entrevistada	77.7	75.4
El esposo/compañero	2.5	7.3
Ambos	14.9	14.7
No sabe/No responde	4.8	2.6
<b>ATENCION MEDICA PARA LOS HIJOS</b>		
Entrevistada	32.3	39.0
El esposo/compañero	9.2	19.8
Ambos	49.7	33.6
No sabe/No responde	8.8	7.6
<b>COMO DISCIPLINAR A LOS HIJOS</b>		
Entrevistada	17.7	24.5
El esposo/compañero	8.0	19.5
Ambos	63.5	47.8
No sabe/No responde	10.8	8.2
<b>USO DE ANTICONCEPTIVOS</b>		
Entrevistada	28.1	37.1
El esposo/compañero	6.0	17.5
Ambos	52.3	38.4
No sabe/No responde	13.6	7.0
<b>COMO GASTAR EL INGRESO FAMILIAR</b>		
Entrevistada	16.9	25.9
El esposo/compañero	14.7	30.1
Ambos	66.8	43.9
No sabe/No responde	1.5	0.1
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>2020</b>	<b>566</b>

El Cuadro 9.5 muestra patrones similares. Entre las no abusadas, más de la tercera parte de las mujeres reportaron que al esposo o compañero le gusta pasar el tiempo libre con ella (79.1%), que él le consulta su opinión en diferentes temas (77.3%). Que el esposo o compañero es cariñoso con ella (86.2%), y que le respeta sus derechos (88.3%).

Entre las mujeres alguna vez abusadas, el porcentaje de mujeres que reportaron estos aspectos en su relación de pareja, frecuentemente era más bajo, y la proporción que respondió que su pareja nunca pasaba el tiempo libre con ella, nunca consultaba su opinión, nunca era cariñoso con ella o nunca le respetaba sus derechos era mucho mayor.

## CUADRO 9.5

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ CASADAS/UNIDAS, SEGUN COMO SE RELACIONA CON SU ESPOSO/COMPAÑERO, COMPARANDO MUJERES ABUSADAS ALGUNA VEZ Y NUNCA ABUSADAS. ENSMI-98**

RELACION CON EL ESPOSO/COMPAÑERO	NUNCA ABUSADA	ALGUNA VEZ ABUSADA
<b>AL ESPOSO LE GUSTA PASAR EL TIEMPO LIBRE CON ELLA</b>		
Frecuentemente	79.1	58.3
A veces	19.4	31.1
Nunca	1.0	10.3
No sabe/No responde	0.6	0.3
<b>EL ESPOSO/COMPAÑERO CONSULTA SU OPINION SOBRE DIFERENTES TEMAS</b>		
Frecuentemente	77.3	52.8
A veces	17.6	29.9
Nunca	4.6	17.2
No sabe/No responde	0.5	0.1
<b>EL ESPOSO/COMPAÑERO ES CARIÑOSO CON ELLA</b>		
Frecuentemente	86.2	66.7
A veces	12.6	24.6
Nunca	0.7	8.7
No sabe/No responde	0.5	0.0
<b>EL ESPOSO/COMPAÑERO LE RESPETA SUS DERECHOS</b>		
Frecuentemente	88.3	54.5
A veces	10.6	32.1
Nunca	0.6	13.4
No sabe/No responde	0.5	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>2020</b>	<b>566</b>

No obstante las diferencias existentes entre las mujeres nunca abusadas y las abusadas alguna vez, en relación a las dos preguntas analizadas en los cuadros 9.4 y 9.5.

En el **Cuadro 9.6** vemos que no existen diferencias significativas entre los dos grupos de mujeres, acerca de si la mujer cree que el esposo/compañero tiene razón en pegarle a ella en diferentes situaciones preguntadas: si ella descuida la casa o los niños; si ella sale sin avisarle; si ella se niega a tener relaciones sexuales con él y si él sospecha que ella le engaña con otro. Por lo menos 70% de las mujeres, en ambos grupos coincidieron en que el hombre no tiene razón de pegarle a ella en cualquiera de las cuatro situaciones mencionadas.

**CUADRO 9.6**

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD ALGUNA VEZ CASADAS/UNIDAS, SEGUN SU OPINION ACERCA DEL DERECHO DEL ESPOSO/COMPAÑERO DE PEGARLE A SU ESPOSA, COMPARANDO MUJERES ABUSADAS ALGUNA VEZ Y NUNCA ABUSADAS. ENSMI-98**

SITUACIONES PLANTEADAS	NUNCA ABUSADA	ALGUNA VEZ ABUSADA
<b>ELLA DESCUIDA DE LA CASA O DE LOS NIÑOS</b>		
Tiene razón	21.6	23.5
No tiene razón	73.3	73.0
No sabe/No responde	5.0	3.5
<b>ELLA SALE SIN AVISARLE</b>		
Tiene razón	20.6	26.0
No tiene razón	74.5	70.1
No sabe/No responde	4.8	3.9
<b>ELLA SE NIEGA A TENER RELACIONES SEXUALES CON EL</b>		
Tiene razón	14.4	15.2
No tiene razón	77.8	79.5
No sabe/No responde	7.7	5.4
<b>EL ESPOSO SOSPECHA QUE LE ENGAÑA CON OTRO</b>		
Tiene razón	19.5	21.2
No tiene razón	75.6	74.0
No sabe/No responde	4.8	4.7
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>2020</b>	<b>566</b>

Los **Cuadros 9.7** y **9.8** se refieren a las mujeres que alguna vez fueron golpeadas por un esposo o compañero.

A las mujeres golpeadas se les preguntó si la última vez que su esposo o compañero le golpeó, él había tomado alguna bebida alcohólica. En el **Cuadro 9.7** se puede ver que más de la mitad de las mujeres (53.4%) respondió que su esposo había tomado en esa ocasión.

## CUADRO 9.7

## DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS QUE HAN RECIBIDO GOLPES DE UN ESPOSO/COMPañERO, SEGUN SI EL HABIA TOMADO BEBIDA ALCOHOLICA LA ULTIMA VEZ QUE LE PEGO. ENSMI-98

ESTADO DEL ESPOSO	ALGUNA VEZ ABUSADA
<b>EL ESPOSO HABIA TOMADO BEBIDA ALCOHOLICA CUANDO LE PEGO</b>	
Si	53.4
No	46.4
No Sabe/No Responde	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>325</b>

A las mujeres golpeadas por un esposo/compañero también se les preguntó a quién acudían cuando eran golpeadas (**Cuadro 9.8**). En total, 43.5% de las mujeres respondió que no acudía a nadie. Entre ellas, 33.6% reportó que acudía a un familiar, mientras 10.7% informó haber acudido a las autoridades. Aproximadamente 11% acudió a vecino(a)s o amigo(a)s.

## CUADRO 9.8

## DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS QUE HAN RECIBIDO GOLPES DE UN ESPOSO/COMPañERO, SEGUN A QUIEN ACUDIA. ENSMI-98

A QUIEN ACUDIA	MUJERES GOLPEADAS POR EL ESPOSO/COMPañERO
A nadie	43.5
Familiar	33.6
Autoridad	10.7
Vecina/o	7.0
Amiga/o	3.8
No sabe/No recuerda	1.4
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>325</b>



## ANEXO A

# LA PRECISION DE LOS RESULTADOS: ERRORES DE MUESTREO

Las estimaciones de una encuesta pueden ser afectadas por dos tipos de errores: (1) **errores de muestreo** y (2) **errores no muestrales**. **Errores no muestrales** consisten en errores hechos en la recolección y procesamiento de datos, e incluyen errores en localizar y entrevistar la vivienda correcta, errores en la formulación de las preguntas o en cómo las entrevistadas entienden las preguntas, y errores en la entrada de datos.

**Error de muestreo** es una medida de la variabilidad que se observaría entre todas las muestras posibles si fueran seleccionadas usando el mismo diseño de muestra. Para toda la población de la muestra y para subgrupos mayores, la muestra de la ENSMI-98 es lo suficientemente grande de manera tal que el error de muestreo para la mayoría de las estimaciones es pequeño. Para subgrupos pequeños los errores de muestreo son mayores y pueden afectar la seguridad de las estimaciones.

El error de muestreo se mide por medio del **error estándar** de una estadística, cual es la raíz cuadrada de la varianza de la estadística. El error estándar puede ser usado para calcular intervalos de confianza para cualquier estadística. Por ejemplo, el intervalo de confianza de 95 por ciento para un valor puede ser calculado si se le suma y resta a este mismo valor 1.96 veces su error estándar.

El **error estándar de una estimación estadística, usando un diseño multietápico como el usado para la ENSMI-98, es más complejo que el error estándar basado en el muestreo al azar simple y tiende a ser mayor que el error estándar producido por una muestra al azar simple. El incremento en el error estándar debido al uso de un diseño multietápico es conocido como el efecto del diseño y se define como la razón entre la varianza de la estimación con el diseño actualmente usado y la varianza de la estimación que resultaría si se usara una muestra al azar simple. Basado en experiencias con estudios similares el efecto del diseño está entre 1.2 y 2.0 para la mayoría de las variables.**

El Cuadro A-1 muestra ejemplos del intervalo de confianza del 95 por ciento del estimado de una proporción bajo diferentes tamaños de la muestra, asumiendo un efecto del diseño de 1.6. Presenta la mitad de la longitud para intervalos de 95 por ciento de confianza para tamaños de la muestra entre 25 y 3200 y correspondientes a proporciones estimadas desde 0.5/95.0 a 0.50/0.50. La fórmula usada para calcular la mitad de la longitud de intervalos para el 95 por ciento de confianza es:

$$(\text{Media longitud del intervalo de confianza del 95\%}) = (1.96) \text{ SQRT } \{(1.6) (P) (1-P) / n\}$$

donde **p** es el estimado de la proporción, **n** es el número de casos (no ponderados) usados para calcular la proporción y 1.6 es el efecto del diseño. Puede ocurrir que para una proporción estimada de 0.30 y un tamaño de la muestra de 200, la mitad del rango del intervalo de confianza es 0.08, por lo que el intervalo

de confianza por 95 por ciento para el estimado de la proporción será entre 0.22 y 0.38. Si el tamaño de la muestra hubiera sido 3.200 en vez de 200, el intervalo de confianza del 95 por ciento sería de 0.28 a 0.32.

El efecto del diseño actual para variables individuales variará dependiendo en cómo los valores de esas variables se distribuyen en las unidades primarias de muestreo (UPM) de la muestra. Esto se puede calcular usando softwares avanzados para análisis de encuestas. Los valores del Cuadro A-1 se dan como ejemplos de cómo el rango del intervalo de confianza puede variar dependiendo de los valores de la proporción y del número de casos usados en el cálculo y asumiendo un efecto de diseño promedio de 1.6.

**CUADRO A-1**

**MITAD DE LA LONGITUD DE INTERVALOS DE CONFIANZA DEL 95% QUE  
CORRESPONDE A UNA MUESTRA DADA (N) Y PROPORCION ESTIMADA  
ASUMIENDO UN EFECTO DE DISEÑO DE 1.6**

TAMAÑO DE LA MUESTRA	PROPORCION ESTIMADA (P)					
	0.050/0.95	0.10/0.90	0.20/0.80	0.30/0.70	0.40/0.60	0.50/0.50
25	0.108	0.149	0.198	0.227	0.243	0.248
50	0.076	0.105	0.140	0.161	0.172	0.175
100	0.054	0.074	0.099	0.114	0.121	0.124
200	0.038	0.053	0.070	0.080	0.086	0.088
400	0.027	0.037	0.050	0.057	0.061	0.062
800	0.019	0.026	0.035	0.040	0.043	0.044
1600	0.014	0.019	0.025	0.028	0.030	0.031
3200	0.010	0.013	0.018	0.020	0.021	0.022
4800	0.008	0.011	0.014	0.016	0.018	0.018
6400	0.007	0.009	0.012	0.014	0.015	0.016

Encuesta Nacional De Salud Materno Infantil 1998 (ENSMI-98)

**ANEXO B**

**AREAS PRIORITARIAS DE AID: DEPARTAMENTOS DE  
CENTRAL, CORDILLERA Y MISIONES**

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS CUADROS  
DE ANEXO B Y LOS DEL INFORME FINAL

ANEXO <u>B</u>	INFORME <u>FINAL</u>
1	3.1
2	3.2
3	3.3
4	3.6
5	3.7
6	4.4
7	4.5
8	5.1
9	5.5
10	5.9
11	5.15
12	5.19
13	5.13
14	5.12
15	6.8
16	6.11
17	6.10
18	6.12
19	8.1 / 8.2
20	8.4 / 8.5
21	8.7
22	7.1
23	7.2
24	7.3
25	7.9
26	7.14
27	7.17
28	7.18
29	7.20
30	7.21
31	7.22

## CUADRO 1

### RESULTADO DE ENTREVISTAS POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MATERNO INFANTIL, PARAGUAY, 1998 (ENSMI-98)

RESULTADO DE ENTREVISTAS	DEPARTAMENTOS			
	TOTAL DEL PAIS	CORDILLERA	MISIONES	CENTRAL
<b>Nº DE VIVIENDAS</b>	<b>5936</b>	<b>957</b>	<b>989</b>	<b>1664</b>
Entrevista Completa	<u>98.1</u>	<u>98.2</u>	<u>99.2</u>	<u>97.7</u>
Vivienda con MEF	62.0	50.7	53.3	70.8
Vivienda sin MEF	27.5	35.3	31.9	22.1
Vivienda Desocupada o Destruida	9.9	13.7	13.6	6.3
Moradores Ausentes	0.1	0.1	0.0	0.2
Rechazo	0.4	0.1	0.3	0.4
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>MUJERES</b>	<b>3667</b>	<b>485</b>	<b>527</b>	<b>1178</b>
Entrevista Completa	<u>98.1</u>	<u>98.1</u>	<u>99.2</u>	<u>97.8</u>
Ausente	0.6	0.6	0.2	0.3
Rechazo	1.1	0.8	0.4	1.9
Otras Razones	0.2	0.4	0.2	0.1
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Nº de Mujeres con Entrevista Completa	3598	476	523	1151

## CUADRO 2

### CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS \* POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, PARAGUAY, ENSMI-98

CARACTERISTICAS	TOTAL DEL PAIS	DEPARTAMENTOS		
		CORDILLERA	MISIONES	CENTRAL
<b>CONDICION DE LA VIVIENDA</b>				
Propia	78.6	89.0	72.5	74.4
Alquilada	11.6	1.9	8.5	12.6
Gratuita	12.5	9.1	18.7	13.0
Otro/No responde	0.1	0.0	0.2	0.0
<b>FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>				
Tubería en la casa	45.2	34.2	39.8	74.3
Tubería en el patio	6.2	14.3	7.2	10.1
Pozo con bomba de mano	3.1	4.7	5.0	1.7
Pozo con bomba electrica	8.9	5.9	4.7	5.8
Pozo sin bomba de mano	28.0	28.8	34.4	5.6
Río, manantial	3.4	5.1	1.1	0.0
Traje del vecino	3.7	6.1	5.9	1.5
Otro/No responde	1.4	0.9	1.9	1.0
<b>SERVICIO SANITARIO</b>				
Baño moderno conectado a red publica	10.1	3.3	2.8	12.6
Baño moderno con pozo ciego	40.1	32.4	37.1	70.6
Letrina municipal	2.0	3.1	3.2	3.2
Letrina común	47.0	60.4	56.4	12.7
Otro/No responde	0.7	0.9	0.4	0.9
<b>COMBUSTIBLE PARA COCINAR</b>				
Gas	60.8	49.6	65.1	91.8
Leña/Carbón	38.1	49.6	34.4	7.3
Otro	0.7	0.6	0.4	0.9
<b>PORCENTAJE QUE TIENE ENERGIA ELECTRICA</b>				
	88.4	94.3	89.4	99.7
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>3598</b>	<b>476</b>	<b>523</b>	<b>1151</b>

\* Numero de viviendas con entrevista individual completa.

### CUADRO 3

#### DISPONIBILIDAD DE BIENES EN LAS VIVIENDAS\*, POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS PARAGUAY: ENSMI-98

<b>DISPONIBILIDAD DE BIENES</b>	<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>CORDILLERA</b>	<b>DEPARTAMENTOS MISIONES</b>	<b>CENTRAL</b>
Radio	89.0	90.7	88.2	94.2
Televisor	78.8	80.5	82.5	96.4
Heladera	66.6	65.8	64.4	91.4
Lavarropa	43.1	22.2	31.4	67.3
Teléfono	24.3	7.4	12.5	41.2
Video	22.7	12.7	18.4	34.2
Auto particular	25.3	10.7	22.8	37.8
Motocicleta	10.8	10.9	12.6	8.8
<b>N° DE VIVIENDES</b>	<b>3598</b>	<b>476</b>	<b>523</b>	<b>1151</b>

\* Numero de viviendas con entrevista individual completa.

## CUADRO 4

### CARACTERISTICAS DE MUJERES DE 15 A 44 ANOS DE EDAD ENTREVISTADAS POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98

CARACTERISTICAS	TOTAL DEL PAIS	DEPARTAMENTOS		
		CORDILLERA	MISIONES	CENTRAL
<b>EDAD</b>				
15-24	47.0	44.9	48.6	47.0
24-34	28.4	31.2	27.3	27.9
35-44	24.7	24.0	24.0	25.1
<b>NIVEL DE INSTRUCCION</b>				
0-5 años	29.6	27.4	30.5	9.8
Primaria completa	25.1	32.5	25.0	23.1
Secundaria y mas	45.4	40.1	44.5	67.2
<b>ACTIVIDAD ECONOMICA</b>				
No Trabaja	61.5	65.6	63.3	52.4
Trabaja dentro de la casa	13.1	13.0	15.1	12.0
Trabaja fuera de la casa	25.2	21.3	21.0	35.2
<b>AREA DE RESIDENCIA</b>				
Urban	55.6	26.6	54.8	93.1
Rural	44.4	73.4	45.2	6.9
<b>IDIOMA QUE HABLAN EN LA CASA</b>				
Guarani	33.5	49.6	36.8	9.1
Español	18.4	9.0	14.9	29.8
Español y Guarani	46.6	41.3	48.3	61.0
Portugues	1.5	0.0	0.0	0.0
<b>ESTADO CIVIL</b>				
Unida/Casada	66.3	57.0	61.9	59.5
Viuda/Separada/Divorciada	3.6	4.1	3.0	4.1
Soltera	30.1	38.9	35.0	36.3
<b>HIJOS ACTUALMENTE VIVOS</b>				
0-1	46.2	47.6	47.1	54.7
2-3	30.1	25.6	28.2	31.5
4+	23.6	26.8	24.7	13.9
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
Nº de Mujeres con Entrevista Completa	3598	476	523	1151

## CUADRO 5

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 AÑOS ENCUESTADAS EN TRES DEPARTAMENTOS  
PRIORITARIOS POR GRUPOS DE EDAD SEGUN ESTADO CIVIL Y NIVEL EDUCATIVO, ENSMI-98

CARACTERISTICAS	TOTAL DEL PAIS	<u>CORDILLERA</u>					<u>MISIONES</u>					<u>CENTRAL</u>					
		TOTAL	15-24	25-34	35-44	TOTAL	15-24	25-34	35-44	TOTAL	15-24	25-34	35-44				
<b>ESTADO CIVIL</b>																	
Unida/Casada	61.4	57.0	25.7	78.1	88.0	61.9	35.4	83.3	91.5	59.5	33.3	82.1	83.				
Viuda/Separada/ Divorciada	3.6	4.1	2.9	4.7	5.5	3.0	1.4	4.5	4.6	4.1	0.5	4.9	10.				
Soltera	35.0	38.9	71.4	17.3	6.4	35.0	63.2	12.3	3.9	36.3	66.1	13.0	6.				
<b>EDUCACION</b>																	
0-5 años	29.6	27.4	18.2	28.3	43.3	30.5	22.2	32.1	45.4	9.8	6.0	9.4	17.				
Primaria completa	25.1	32.5	25.2	37.8	39.4	25.0	24.5	27.2	23.6	23.1	17.4	23.7	32.				
Secundaria completa y +	45.4	40.1	56.6	33.9	17.3	44.5	53.3	40.7	31.0	67.2	76.6	66.9	49.				
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>10</b>				
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>3598</b>	<b>476</b>	<b>188</b>	<b>152</b>	<b>136</b>	<b>523</b>	<b>234</b>	<b>154</b>	<b>135</b>	<b>1151</b>	<b>447</b>	<b>386</b>	<b>31</b>				

## CUADRO 6

### DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA PLANEACION DE LOS NACIMIENTOS VIVOS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 1995-AGOSTO 1998, POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98

	PLANEACION DE NACIMIENTOS ULTIMOS 3 ANOS			<u>TOTAL</u>	N° DE CASOS
	QUERIA ENTONCES	QUERIA ESPERAR	NO QUERIA MAS HIJOS		
<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>82.0</b>	<b>14.1</b>	<b>4.0</b>	<b>100.0</b>	<b>1539</b>
<b>CORDILLERA</b>	74.0	19.5	6.5	100.0	181
<b>MISIONES</b>	79.5	14.5	6.0	100.0	229
<b>CENTRAL</b>	77.0	18.5	4.6	100.0	484

## CUADRO 7

### DESEO ACTUAL DE TENER MAS HIJOS, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS MUJERES CASADAS/UNIDAS, 15-44 ANOS POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98

REGION	DESEO ACTUAL DE TENER MAS HIJOS								TOTAL	N° DE CASOS
	0-11 MESES	12-23 MESES	24+ MESES	INDECISA CUANDO	IN-DECISA	NO QUIERE MAS	ESTERI-LIZADA	IN-FERTIL		
<b>Total del Pais</b>	<b>7.4</b>	<b>5.3</b>	<b>31.2</b>	<b>4.6</b>	<b>3.4</b>	<b>38.8</b>	<b>8.1</b>	<b>1.2</b>	<b>100.0</b>	<b>2386</b>
<b>Cordillera</b>	9.2	7.8	29.8	3.7	4.4	40.9	4.2	0.0	100.0	296
<b>Misiones</b>	5.7	4.2	32.5	3.8	3.1	37.2	12.1	1.5	100.0	352
<b>Central</b>	7.3	6.9	30.5	1.2	2.1	44.6	6.2	1.2	100.0	770

**CUADRO 8**

**CONOCIMIENTO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS: PORCENTAJE DE TODAS LAS MUJERES Y MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS QUE CONOCEN ANTICONCEPTIVOS POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, SEGUN METODO ESPECIFICO, ENSMI-98**

<b>METODO</b>	<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>CORDILLERA</b>	<b>MISIONES</b>	<b>CENTRAL</b>
<b>TODAS LAS MUJERES</b>				
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>3598</b>	<b>476</b>	<b>523</b>	<b>1151</b>
Pildora	94.0	92.4	92.6	97.0
Condon	92.9	88.8	93.7	98.1
Inyeccion	92.3	89.6	91.8	96.8
DIU	80.7	81.5	81.9	89.6
Esterilizacion femenina	78.9	70.4	76.2	87.2
Metodos vaginales	47.4	44.6	46.8	59.9
Retiro	48.0	44.3	42.5	53.6
Ritmo	51.8	46.9	47.4	67.8
Billings	32.1	25.9	27.8	40.3
Vasectomia	25.5	17.6	20.3	32.4
Norplant	5.4	4.6	5.7	5.0
Yuyos	85.0	85.7	86.1	88.5
<b>MUJERES EN UNION</b>				
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>2386</b>	<b>296</b>	<b>352</b>	<b>770</b>
Pildora	96.2	96.3	98.1	98.6
Condon	95.4	91.4	94.7	98.0
Inyeccion	93.2	95.8	96.8	98.5
DIU	88.2	89.7	90.9	96.0
Esterilizacion femenina	85.3	78.0	85.8	93.7
Metodos vaginales	54.5	51.9	53.6	61.4
Retiro	52.5	51.0	51.0	60.0
Ritmo	49.6	44.1	50.8	70.7
Billings	33.4	26.8	31.9	42.3
Vasectomia	26.2	17.3	20.4	31.8
Norplant	5.2	3.7	4.6	4.3
Yuyos	91.5	93.1	93.9	94.7

**CUADRO 9**

**USO ACTUAL DE METODOS ANTICONCEPTIVOS POR DEPARTAMENTOS  
PRIORITARIOS, SEGUN USO Y METODO, DISTRIBUCION PORCENTUAL DE  
MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 ANOS DE EDAD, ENSMI-98**

<b>USO Y METODO</b>	<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>CORDILLERA</b>	<b>MISIONES</b>	<b>CENTRAL</b>
<b>USAN ACTUALMENTE</b>	<b>57.4</b>	<b>57.8</b>	<b>70.4</b>	<b>64.6</b>
<b>METODOS MODERNOS</b>	<b>47.7</b>	<b>51.6</b>	<b>62.1</b>	<b>54.3</b>
Pildora	13.1	14.9	22.1	10.4
DIU	11.1	14.2	13.4	15.2
Esterilizacion femenina	8.0	4.2	11.9	6.1
Condon	7.3	5.7	5.6	11.0
Inyeccion	7.5	11.7	8.0	11.1
Metodos vaginales	0.5	0.8	1.2	0.4
<b>METODOS TRADICIONALES</b>	<b>9.7</b>	<b>6.3</b>	<b>8.3</b>	<b>10.3</b>
Ritmo	2.8	1.1	1.7	3.6
Retiro	5.4	3.4	3.8	3.4
Billings	1.5	1.8	2.8	3.4
<b>USAN YUYOS</b>	<b>4.9</b>	<b>10.0</b>	<b>4.8</b>	<b>2.6</b>
<b>NO USAN ACTUALMENTE</b>	<b>37.7</b>	<b>32.1</b>	<b>24.8</b>	<b>32.8</b>
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>N° DE CASOS</b>	<b>2386</b>	<b>296</b>	<b>352</b>	<b>770</b>

## CUADRO 10

**USO ACTUAL DE METODOS ANTICONCEPTIVOS SEGUN CARACTERISTICAS  
SELECCIONADAS POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS: MUJERES CASADAS Y  
UNIDAS DE 15 A 44 ANOS DE EDAD, ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	<u>TOTAL DEL PAIS</u>		<u>CORDILLERA</u>		<u>MISIONES</u>		<u>CENTRAL</u>	
	USO ACTUAL (%)	Nº DE CASOS (N)	USO ACTUAL (%)	Nº DE CASOS (N)	USO ACTUAL (%)	Nº DE CASOS (N)	USO ACTUAL (%)	Nº DE CASOS (N)
<b>TOTAL</b>	<b>57.4</b>	<b>2386</b>	<b>57.8</b>	<b>296</b>	<b>70.4</b>	<b>352</b>	<b>64.6</b>	<b>770</b>
<b>AREA</b>								
Urbana	65.4	1394	61.2	89	73.8	193	65.6	654
Rural	49.2	992	56.8	207	66.6	159	52.6	116
<b>EDAD</b>								
15-24	53.1	493	55.8	46	69.3	85	64.7	151
25-34	56.8	1064	50.5	133	72.4	144	60.2	358
35-44	60.7	829	68.1	117	68.8	123	70.1	261
<b>HIJOS NACIDOS VIVOS</b>								
0-1	46.8	628	40.5	56	64.6	85	49.8	244
2	70.0	533	64.3	68	86.5	73	75.4	199
3	65.9	430	65.5	52	68.3	66	72.2	143
4	67.8	295	56.3	37	69.5	52	62.1	92
5+	45.8	500	60.7	83	62.8	76	69.6	92
<b>EDUCACION</b>								
Primaria	50.7	1464	54.5	219	64.9	222	57.0	363
Secundaria	69.4	922	68.3	77	79.9	130	70.4	407

**CUADRO 11**

**RAZON PARA USAR ANTICONCEPTIVOS, SEGUN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS:  
MUJERES DE 15 A 44 ANOS DE EDAD QUE USAN ANTICONCEPTIVOS, ENSMI-98  
(DISTRIBUCION PORCENTUAL)**

	RAZON DE USO				TOTAL	N° DE CASOS
	ESPACIAR	NO MAS HIJOS	OTRAS RAZONES	NO SABE/ NO RESPONDE		
<b>TOTAL DEL PAIS</b>	54.1	36.0	9.2	0.7	100.0	1803
<b>CORDILLERA</b>	52.6	39.2	7.3	0.8	100.0	225
<b>MISIONES</b>	54.4	36.0	8.9	0.7	100.0	287
<b>CENTRAL</b>	52.5	41.7	5.3	0.4	100.0	615

## CUADRO 12

### PORCENTAJE DE MUJERES CASADA Y UNIDAS DE 15 A 44 AÑOS DE EDAD ESTRILIZADAS SEGUN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS Y CARACTERISTICAS SELECCIONADAS, ENSMI-98

CARACTERISTICAS	TOTAL DEL PAIS		CORDILLERA		MISIONES		CENTRAL	
	%	(N)	%	(N)	%	(N)	%	(N)
<b>TOTAL</b>	<b>12.9</b>	<b>1599</b>	<b>6.2</b>	<b>200</b>	<b>15.8</b>	<b>260</b>	<b>9.1</b>	<b>548</b>
<b>AREA</b>								
Urbana	11.1	974	9.5	59	14.1	145	8.9	471
Rural	15.2	625	5.3	141	17.8	115	12.1	77
<b>EDAD</b>								
15-24	1.4	312	0.0	27	4.4	64	0.0	103
25-34	9.2	704	3.3	85	18.1	106	5.9	248
35-44	23.4	583	11.5	88	20.5	90	17.2	197
<b>HIJOS NACIDOS VIVOS</b>								
0-1	0.8	346	0.0	25	0.0	59	1.3	142
2	7.8	405	6.2	49	5.7	64	2.9	160
3	19.2	310	1.8	41	28.7	48	14.8	106
4	19.5	226	0.0	28	21.0	40	14.6	74
5+	19.3	322	14.5	57	29.7	49	30.1	66
<b>EDUCACION</b>								
Primaria	15.3	910	8.0	145	14.4	155	11.7	240
Secundaria	9.4	688	1.4	55	17.7	105	7.5	308

### CUADRO 13

FUENTE DE OBTENCION DE CUATRO PRINCIPALES METODOS MODERNOS,\* SEGUN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 ANOS DE EDAD QUE USAN ANTICONCEPTIVOS, ENSMI-98

	FUENTE DE OBTENCION							TOTAL	Nº DE CASOS
	FARMACIA	SECTOR PUBLICO	SECTOR PRIVADO	CEPEP	ARGENTINA BRASIL	OTRO	NO SABE		
TOTAL DEL PAIS	34.9	35.1	20.5	4.3	2.7	2.4	0.0	100.0	1128
CORDILLERA	28.2	56.5	11.0	0.3	0.0	2.9	1.1	100.0	149
MISIONES	24.6	51.1	21.1	0.3	0.0	2.9	0.0	100.0	202
CENTRAL	41.6	25.7	21.0	10.9	0.0	0.8	0.0	100.0	369

\*Pildora, DIU, Inyeccion, y Esterilizacion Feminina

**CUADRO 14**

**FUENTE DE OBTENCION DE ANTICONCEPTIVOS MODERNOS, SEGUN FUENTE Y METODO:  
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 ANOS QUE USAN ACTUALMENTE  
METODOS MODERNOS POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98**

FUENTE DE OBTENCION	TOTAL	METODO				
		PILDORA	DIU	CONDON	INYECCION	ESTERILIZ. FEMENINA
<b>CORDILLERA</b>						
SECTOR PUBLICO	50.2	64.3	86.3	*	19.4	*
FARMACIA	37.2	30.3	0.0	*	61.8	*
SECTOR PRIVADO	13.2	5.4	13.7	*	18.8	*
CEPEP	1.2	0.0	0.0	*	0.0	*
NO SABE	0.1	0.0	0.0	*	0.0	*
TOTAL	100.0	100.0	100.0	*	100.0	*
Nº DE CASOS	169	50	44	20	40	15
<b>MISIONES</b>						
SECTOR PUBLICO	46.9	52.6	67.4	20.4	28.7	46.5
FARMACIA	29.5	34.8	0.0	57.5	66.6	0.0
SECTOR PRIVADO	22.6	12.6	31.5	16.0	4.7	53.5
CEPEP	0.2	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0
NO SABE	0.8	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº DE CASOS	231	79	45	29	35	43
<b>CENTRAL</b>						
SECTOR PUBLICO	19.8	28.8	28.7	0.3	5.4	50.4
FARMACIA	51.4	69.4	0.0	83.0	91.7	0.0
SECTOR PRIVADO	20.0	1.1	45.8	15.8	2.0	34.3
CEPEP	8.3	0.0	25.5	0.0	0.8	13.8
OTRO	0.5	0.7	0.0	0.6	0.0	1.5
NO SABE	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
TOTAL	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Nº DE CASOS	472	105	100	103	103	61

\* Menos de 25 casos

### CUADRO 15

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 44 ANOS QUE NECESITAN SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR\* POR ESTADO CIVIL Y DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98**

	<b>TOTAL</b>	<b>CASADA UNIDA</b>	<b>ESTADO CIVIL DIVORCIADA SEP/VIUDA</b>	<b>SOLTERA</b>
<b>TOTAL DEL PAIS</b> (N° DE CASOS)	<b><u>11.3</u></b> <b>(3598)</b>	<b><u>17.3</u></b> <b>(2386)</b>	<b><u>4.5</u></b> <b>(201)</b>	<b><u>1.1</u></b> <b>(1011)</b>
<b>CORDILLERA</b> (N° DE CASOS)	11.7 (476)	18.2 (896)	14.1 (28)	1.3 (152)
<b>MISIONES</b> (N° DE CASOS)	8.6 (523)	12.0 (352)	16.5 (28)	1.2 (143)
<b>CENTRAL</b> (N° DE CASOS)	4.4 (1151)	6.2 (770)	2.1 (71)	1.7 (310)

\*Necesidad de servicios: mujeres fértiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no están usando método.

## CUADRO 16

**NECESIDAD DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS: PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 ANOS EN RIESGO DE EMBARAZO NO PLANEADO DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE NECESIDAD DE SERVICIOS (\*), ENSMI-98**

	<u>TOTAL DEL PAIS</u>		<u>CORDILLERA</u>		<u>MISIONES</u>		<u>CENTRAL</u>	
	NECESITA METODO		NECESITA METODO		NECESITA METODO		NECESITA METODO	
	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>TOTAL</b>	<b>17.3</b>	<b>2386</b>	<b>18.2</b>	<b>296</b>	<b>12.0</b>	<b>352</b>	<b>6.2</b>	<b>770</b>
<b>EDUCACION</b>								
0-2 anos	29.5	173	**	13	25.2	32	5.7	26
3-5 anos	22.8	560	22.5	86	16.8	89	9.5	92
Primaria Completa	19.1	731	21.1	120	12.5	101	8.0	245
Secundaria Incompleta	10.9	435	14.5	42	8.7	62	2.9	187
Secundaria Completa y +	6.5	487	0.0	35	1.8	68	6.1	220
<b>EDAD</b>								
15-19	23.9	133	**	10	**	20	0.0	30
20-24	16.4	360	18.8	36	11.9	65	4.5	121
25-29	15.9	494	24.5	61	8.2	64	6.3	175
30-34	19.8	570	15.6	72	11.4	80	9.7	183
35-39	13.5	469	6.8	69	11.6	68	5.6	147
40-44	18.8	360	21.6	48	12.7	55	5.2	114

(\*)Necesidad de servicios: mujeres fértiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no e usando metodo.

\*\*Menos de 25 casos.

## CUADRO 17

**NECESIDAD INSATISFECHA DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGUN ESTADO CIVIL Y DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS: PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 44 ANOS EN RIESGO DE EMBARAZO NO PLANEADO DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE NECESIDAD DE METODOS MODERNOS (\*), ENSMI-98**

	<u>TOTAL DEL PAIS</u>		<u>CORDILLERA</u>		<u>MISIONES</u>		<u>CENTRAL</u>	
	NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO	
	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>TOTAL</b>	<b>17.6</b>	<b>3598</b>	<b>15.3</b>	<b>476</b>	<b>14.4</b>	<b>523</b>	<b>10.5</b>	<b>1151</b>
<b>ESTADO CIVIL</b>								
Casada/Unida	26.1	2386	23.9	296	20.3	352	14.3	770
Vda./Separ./Divorciada	5.2	201	14.1	28	16.5	28	2.5	71
Soltera	3.9	1011	2.2	152	3.0	143	5.5	310

\*Necesidad de servicios: mujeres fértiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no están usando método moderno.

## CUADRO 18

**NECESIDAD INSATISFECHA DE SERVICIOS DE PLANIFICACION FAMILIAR, SEGUN CARACTERISTICAS SELECCIONADAS POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS: PORCENTAJE DE MUJERES CASADAS Y UNIDAS DE 15 A 44 ANOS EN RIESGO DE EMBARAZO NO PLANEADO DE ACUERDO CON EL CRITERIO DE NECESIDAD DE METODOS MODERNOS (\*), ENSMI-98**

	<u>TOTAL DEL PAIS</u>		<u>CORDILLERA</u>		<u>MISIONES</u>		<u>CENTRAL</u>	
	NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO		NECESITA METODO MODERNO	
	%	N	%	N	%	N	%	N
<b>TOTAL</b>	<b>26.1</b>	<b>2386</b>	<b>23.9</b>	<b>296</b>	<b>20.3</b>	<b>352</b>	<b>14.3</b>	<b>770</b>
<b>EDUCACION</b>								
0-2 anos	34.9	173	**	13	27.5	32	5.7	26
3-5 anos	33.1	560	25.0	86	23.0	89	11.6	92
Primaria Completa	26.5	731	27.0	120	17.2	101	15.1	245
Secundaria Incompleta	18.2	435	18.5	42	23.9	62	11.3	187
Secundaria Completa y +	17.7	487	13.9	35	14.7	68	17.4	220
<b>EDAD</b>								
15-19	29.1	133	**	10	**	20	0.4	30
20-24	22.1	360	21.4	36	19.2	65	6.8	121
25-29	24.2	494	29.5	61	15.9	64	15.0	175
30-34	29.9	570	23.9	72	21.6	80	18.3	183
35-39	24.3	469	13.8	69	19.4	68	17.2	147
40-44	28.0	360	27.0	48	21.3	55	15.1	114

(\*)Necesidad de metodos modernos: mujeres fertiles y sexualmente activas, no embarazadas, que no desean embarazo y no estan usando metodo moderno.

\*\*Menos de 25 casos.

## CUADRO 19A

### ATENCIÓN PRENATAL PARA NACIMIENTOS VIVOS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 1993- AGOSTO 1998, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DEPARTAMENTO DE CORDILLERA, ENSMI-98

ATENCIÓN PRENATAL	TOTAL	AREA		TOTAL DEL PAIS
		URBANA	RURAL	
<b>CONTROL PRENATAL</b>				
Si	95.2	100.0	94.2	88.0
No	4.8	0.0	5.8	12.0
<b>MESES DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL</b>				
1er trimestre	40.5	57.6	37.0	34.8
2/3 trimestre	54.1	42.4	56.5	53.2
Ningun control	5.4	0.0	5.4	12.0
<b>TOTAL DE CONTROLES</b>				
0	4.8	0.0	5.8	12.0
1	0.9	0.0	1.1	3.4
2-3	8.8	9.5	8.6	19.1
4	8.0	2.1	9.3	9.0
5 y mas	76.8	88.4	74.4	55.7
No sabe/No recuerda	0.7	0.0	0.9	0.8
<b>LUGAR DE ATENCION</b>				
Sector Publico	87.0	84.0	87.6	76.5
Sector Privado	5.9	16.0	3.8	18.1
Otro/No sabe	7.1	0.0	8.5	5.5
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>311</b>	<b>75</b>	<b>236</b>	<b>1540</b>

## CUADRO 19B

### ATENCIÓN PRENATAL PARA NACIMIENTOS VIVOS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 1993- AGOSTO 1998, DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL, DEPARTAMENTO DE MISIONES, ENSMI-98

ATENCIÓN PRENATAL	AREA			TOTAL DEL PAIS
	TOTAL	URBANA	RURAL	
<b>CONTROL PRENATAL</b>				
Si	95.9	97.8	93.9	88.0
No	4.1	2.2	6.1	12.0
<b>MESES DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL</b>				
1er trimestre	43.8	55.5	32.1	34.8
2/3 trimestre	52.0	42.0	61.8	53.2
Ningun control	4.3	2.5	6.1	12.0
<b>TOTAL DE CONTROLES</b>				
0	4.4	2.2	6.6	12.0
1	2.4	1.5	3.4	3.4
2-3	14.8	12.9	16.7	19.1
4	7.5	4.6	10.3	9.0
5 y mas	70.3	77.7	63.0	55.7
No sabe/No recuerda	0.5	1.0	0.0	0.8
<b>LUGAR DE ATENCIÓN</b>				
Sector Publico	68.7	64.3	73.1	76.5
Sector Privado	9.5	15.3	3.8	18.1
Otro/No Sabe	21.7	20.4	23.1	5.5
<b>TOTAL</b>	100.0	100.0	100.0	100.0
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>375</b>	<b>197</b>	<b>178</b>	<b>1540</b>

## CUADRO 19C

### ATENCION PRENATAL PARA NACIMIENTOS VIVOS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 1993- AGOSTO 1998, DISTRIBUCION PORCENTUAL, DEPARTAMENTO DE CENTRAL, ENSMI-98

ATENCION PRENATAL	TOTAL	AREA		TOTAL DEL PAIS
		URBANA	RURAL	
<b>CONTROL PRENATAL</b>				
Si	95.5	95.3	99.5	88.0
No	4.5	4.7	0.5	12.0
<b>MESES DE EMBARAZO AL PRIMER CONTROL</b>				
1er trimestre	55.6	56.6	39.9	34.8
2/3 trimestre	39.9	38.7	59.6	53.2
Ningun control	4.5	4.7	0.5	12.0
<b>TOTAL DE CONTROLES</b>				
0	4.6	4.9	0.5	12.0
1	1.2	1.3	0.0	3.4
2-3	5.1	4.5	14.5	19.1
4	6.2	6.4	2.8	9.0
5 y mas	82.8	82.9	82.1	55.7
No sabe/No recuerda	0.0	0.0	0.0	0.8
<b>LUGAR DE ATENCION</b>				
Sector Publico	65.2	63.3	95.3	76.5
Sector Privado	29.4	31.0	4.2	18.1
Otro/No Sabe	5.5	5.7	0.5	5.5
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>732</b>	<b>628</b>	<b>104</b>	<b>1540</b>

## CUADRO 20

**PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 93-AGOSTO 98,  
POR LUGAR DE ATENCION DEL PARTO Y TIPO DE PARTO SEGUN  
DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, SEGUN REGION Y AREA, ENSMI-98\***

LUGAR DONDE TUVO EL PARTO	TOTAL	AREA		REGION**	
		URBANA	RURAL	GRAN ASUNCION	RESTO DEL DEPTO.
<b>CORDILLERA</b>					
<b>PARTO INSTITUCIONAL</b>	<b>64.1</b>	<b>91.5</b>	<b>58.3</b>		<b>64.1</b>
Publico	57.1	75.1	53.3	*	57.1
Privado	6.9	16.4	5.0	*	6.9
<b>PARTO DOMICILIARIO</b>	<b>35.9</b>	<b>8.5</b>	<b>41.7</b>		<b>35.9</b>
En casa con partera	27.5	7.9	31.6	*	27.5
En casa con familiares/sola	4.7	0.6	5.6	*	4.7
En casa con obstetra	1.0	0.0	1.3	*	1.0
Otro		0.0	3.3	*	
<b>TIPO DE PARTO</b>					
Vaginal	82.5	82.4	82.5	*	82.5
Cesarea	17.5	17.6	17.5	*	17.5
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>*</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>311</b>	<b>75</b>	<b>236</b>	<b>*</b>	<b>311</b>
<b>MISIONES</b>					
<b>PARTO INSTITUCIONAL</b>	<b>58.4</b>	<b>73.4</b>	<b>43.7</b>		<b>58.4</b>
Publico	47.1	54.0	40.3	*	47.1
Privado	11.3	19.4	3.4	*	11.3
<b>PARTO DOMICILIARIO</b>	<b>41.4</b>	<b>26.6</b>	<b>56.3</b>		<b>41.4</b>
En casa con partera	18.2	7.6	28.8	*	18.2
En casa con obstetra	5.3	4.1	6.5	*	5.3
En casa con familiares/sola	2.7	0.7	4.8	*	2.7
Otro	15.2	14.2	16.2	*	15.2
<b>TIPO DE PARTO</b>					
Vaginal	87.9	82.7	93.0	*	87.9
Cesarea	12.1	17.3	7.0	*	12.1
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>*</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>375</b>	<b>197</b>	<b>178</b>	<b>*</b>	<b>375</b>

**CUADRO 20-CONT.**

---

<b>CENTRAL</b>					
<b>PARTO INSTITUCIONAL</b>	<b>90.6</b>	<b>91.4</b>	<b>78.7</b>	<b>94.8</b>	<b>80.5</b>
Publico	68.4	68.2	72.0	68.9	67.2
Privado	22.2	23.2	6.7	25.9	13.3
<b>PARTO DOMICILIARIO</b>	<b>9.4</b>	<b>8.6</b>	<b>21.3</b>	<b>5.2</b>	<b>19.5</b>
En casa con partera	5.3	4.3	20.5	2.9	11.0
En casa con obstetra	1.8	1.9	0.8	1.5	2.6
En casa con familiares/sola	0.7	0.7	0.0	0.0	2.3
Otro	1.6	1.7	0.0	0.8	3.5
<b>TIPO DE PARTO</b>					
Vaginal	72.6	72.2	79.7	71.2	76.2
Cesarea	27.4	27.8	20.3	28.8	23.8
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº DE CASOS</b>	<b>728</b>	<b>627</b>	<b>101</b>	<b>475</b>	<b>253</b>

---

\* Resultados para el país en Cuadro 8.4

\*\* Solamente Central queda en Gran Asuncion

**CUADRO 21**

**CONTROL DEL NIÑO SANO: PORCENTAJE DE NIÑOS LLEVADOS PARA EL CONTROL DEL RECIEN NACIDO Y ESTADO DE SALUD AL PRIMER CONTROL, NIÑOS NACIDOS VIVOS EN EL PERIODO SEPTIEMBRE 93-AGOSTO 98, POR AREA Y EDUCACION DE LA MADRE Y POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	CONTROL DEL RECIEN NACIDO		Nº DE CASOS	ESTADO DE SALUD DEL NIÑO		TOTAL
	SI	NO		SANO	ENFERMO	
<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>79.0</b>	<b>21.0</b>	<b>97.0</b>	<b>87.6</b>	<b>12.4</b>	<b>100.0</b>
<b>CORDILLERA</b>						
<b>TOTAL AREA</b>	<b>95.7</b>	<b>4.3</b>	<b>227</b>	<b>81.6</b>	<b>18.4</b>	<b>100.0</b>
Urbana	98.6	1.4	60	84.8	15.2	100.0
Rural	95.1	4.9	167	80.9	19.1	100.0
<b>EDUCACION</b>						
0-5 años	90.7	9.3	75	81.0	19.0	100.0
Primaria completa	98.3	1.7	95	77.7	22.3	100.0
Secundaria y mas	99.0	1.0	57	89.7	10.3	100.0
<b>MISIONES</b>						
<b>TOTAL AREA</b>	<b>91.9</b>	<b>8.1</b>	<b>267</b>	<b>90.7</b>	<b>9.3</b>	<b>100.0</b>
Urbana	97.8	2.2	145	90.1	9.9	100.0
Rural	86.3	13.7	122	91.3	8.7	100.0
<b>EDUCACION</b>						
0-5 años	87.1	12.9	104	88.4	11.6	100.0
Primaria completa	93.3	6.7	74	93.1	6.9	100.0
Secundaria y mas	98.6	1.4	89	91.8	8.2	100.0
<b>CENTRAL</b>						
<b>TOTAL AREA</b>	<b>98.2</b>	<b>1.8</b>	<b>568</b>	<b>92.7</b>	<b>7.3</b>	<b>100.0</b>
Urbana	98.1	1.9	480	92.4	7.6	100.0
Rural	99.1	0.9	88	96.6	3.4	100.0
<b>REGION</b>						
Gran Asuncion	99.2	0.8	360	92.9	7.1	100.0
Resto del Departamento	95.8	4.2	208	92.1	7.9	100.0
<b>EDUCACION</b>						
0-5 años	88.2	11.8	89	94.0	6.0	100.0
Primaria completa	98.5	1.5	184	93.4	6.5	100.0
Secundaria y mas	99.9	0.1	298	92.0	8.0	100.0

## CUADRO 22

### PORCENTAJE ACUMULATIVO DE MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD QUE TUVIERON LA MENARQUIA A VARIAS EDADES, POR EDAD ACTUAL EN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98

CARACTERISTICAS	EDAD A MENARQUIA							Todavía no menstruó	No recuerda/ responde	Promedio edad	Nº de Casos
	<11	11	12	13	14	15	16+				
<b>NACIONAL</b>	1.8	7.8	24.0	32.3	20.3	9.5	3.9	0.1	0.3	13.3	1361
<b>CORDILLERA</b>											
<b>EDAD</b>											
15-19	0.5	13.6	28.8	25.3	20.3	9.7	0.6	1.1	0.0	13.6	112
20-24	6.0	10.2	11.7	15.4	24.3	18.7	7.4	0.0	6.2	14.9	61
<b>MISIONES</b>											
<b>EDAD</b>											
15-19	4.6	12.8	31.2	27.7	18.2	5.6	0.0	0.0	0.0	12.6	130
20-24	3.3	14.4	13.7	31.4	21.0	15.5	0.7	0.0	0.0	13.0	86
<b>CENTRAL</b>											
<b>EDAD</b>											
15-19	2.4	7.1	35.1	44.8	8.5	1.8	0.2	0.0	0.0	12.5	193
20-24	3.6	10.5	27.1	27.1	17.8	6.7	7.1	0.0	0.0	13.2	214

## CUADRO 23

**DISTRIBUCION PORCENTUAL DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD  
POR NUMERO Y PROMEDIO DE EMBARAZOS, SEGUN EDAD Y AREA  
POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	NUMERO DE EMBARAZOS			TOTAL	PROMEDIO DE EMBARAZOS	NUMERO DE MUJERES
	0	1	2 y más			
<b>POR DEPARTAMENTO</b>						
<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>63.6</b>	<b>17.8</b>	<b>18.5</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5</b>	<b>1368</b>
<b>EDAD</b>						
15-19	82.5	13.6	3.9	100.0	0.2	766
20-24	40.5	23.0	36.5	100.0	1.0	602
<b>AREA</b>						
Urbana	69.3	17.5	13.2	100.0	0.4	854
Rural	55.7	18.3	26.1	100.0	0.7	514
<b>CORDILLERA</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>66.8</b>	<b>17.0</b>	<b>16.2</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5</b>	<b>176</b>
<b>EDAD</b>						
15-19	83.2	11.3	5.5	100.0	0.2	112
20-24	43.0	25.3	31.7	100.0	0.9	64
<b>AREA</b>						
Urbana	71.7	24.4	3.8	100.0	0.3	66
Rural	64.4	13.4	22.2	100.0	0.6	110
<b>MISIONES</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>60.5</b>	<b>16.5</b>	<b>22.9</b>	<b>100.0</b>	<b>0.6</b>	<b>217</b>
<b>EDAD</b>						
15-19	84.1	9.9	6.0	100.0	0.2	130
20-24	22.7	27.2	50.1	100.0	1.3	87
<b>AREA</b>						
Urbana	60.2	16.0	23.8	100.0	0.6	124
Rural	60.9	17.2	21.9	100.0	0.6	93
<b>CENTRAL</b>						
<b>TOTAL</b>	<b>65.6</b>	<b>20.4</b>	<b>14.0</b>	<b>100.0</b>	<b>0.5</b>	<b>408</b>
<b>EDAD</b>						
15-19	85.6	11.0	3.4	100.0	0.2	193
20-24	49.3	28.0	22.7	100.0	0.7	215
<b>AREA</b>						
Urbana	66.3	19.8	13.9	100.0	0.5	354
Rural	54.6	29.8	15.6	100.0	0.6	54

## CUADRO 24

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE REPORTARON HABER TENIDO  
RELACIONES SEXUALES, POR DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98**

CARACTERISTICAS	TUVO RELACIONES SEXUALES	TIPO DE RELACION SEXUAL		NO TUVO RELACIONES SEXUALES	TOTAL	Nº DE CASOS
		PREMARITAL	MARITAL			
<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>53.9</b>	<b>44.5</b>	<b>9.5</b>	<b>46.1</b>	<b>100.0</b>	<b>1358*</b>
<b>TOTAL - CORDILLERA</b>	<b>45.6</b>	<b>41.5</b>	<b>3.9</b>	<b>54.4</b>	<b>100.0</b>	<b>173</b>
<b>TOTAL - MISIONES</b>	<b>57.0</b>	<b>46.9</b>	<b>10.1</b>	<b>43.0</b>	<b>100.0</b>	<b>215</b>
<b>TOTAL - CENTRAL</b>	<b>52.8</b>	<b>45.8</b>	<b>7.0</b>	<b>47.2</b>	<b>100.0</b>	<b>404</b>
<b>EDAD</b>						
15-19	32.7	31.3	1.4	67.3	100.0	191
20-24	69.0	57.5	11.6	31.0	100.0	213
<b>REGION</b>						
Gran Asunción	52.9	46.6	6.3	47.1	100.0	351
Fuera de Gran Asunción	52.7	44.1	8.6	47.3	100.0	53
<b>AREA</b>						
Urbana	53.2	46.3	6.9	46.8	100.0	351
Rural	46.6	38.2	8.4	53.4	100.0	53
<b>EDUCACION</b>						
0-5 años/Primaria completa	73.3	64.5	8.8	26.7	100.0	125
Secundaria incompleta	43.4	36.5	6.9	56.6	100.0	172
Secundaria o más	52.7	46.6	6.0	47.3	100.0	107

\* Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación

## CUADRO 25

### METODO ANTICONCEPTIVO USADO DURANTE LA PRIMERA RELACION SEXUAL PREMARITAL, POR METODO, TOTAL DEL PAIS Y DEPARTAMENTO DEL CENTRAL, ENSMI-98

	TOTAL DEL PAIS	1998-CENTRAL
<b>Usuaris de Métodos de Reconocida Eficacia</b>	33.0	31.0
Condón	14.1	16.0
Píldora	4.5	3.0
Inyección	3.1	4.1
Retiro	7.9	5.3
Billings	0.7	0.3
Ritmo	2.1	2.2
Otros	0.2	0.1
<b>Usuaris de Métodos de Eficacia No Reconocida (Yuyos)</b>	0.3	0.1
<b>No Usuaris</b>	67.0	69.0
<b>TOTAL</b>	100.0	100.0
<b>N° de Casos</b>	647*	210**

\*Excluye 10 mujeres cuya primera relación fue una violación y 10 mujeres que el método usado desconocida

\*\*Excluye 7 mujeres cuya primera relación fue una violación

## CUADRO 26

ACTIVIDAD SEXUAL Y USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS POR ESTADO CIVIL,  
MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL CENTRAL, ENSMI-98

ACTIVIDAD SEXUAL	TOTAL DE MUJERES 15-24 AÑOS DE EDAD			UNIDA	NO UNIDA
	TOTAL	15-19	20-24	TOTAL	TOTAL
% sexualmente activa, total de jóvenes					
últimas 4 semanas	31.2	18.8	41.3	81.0	11.9
últimos 3 meses	40.9	25.3	53.5	97.8	18.8
<b>Número de casos</b>	<b>408</b>	<b>193</b>	<b>215</b>	<b>151</b>	<b>257</b>
% sexualmente activa, jóvenes con experiencia sexual					
últimas 4 semanas	58.8	56.1	59.8	81.1	34.0
últimos 3 meses	77.0	75.9	77.5	97.9	53.8
<b>Número de casos</b>	<b>250</b>	<b>75</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
% usó un método la última vez, sexualmente activas – 4 semanas	54.0	51.8	54.8	64.4	42.4
<b>Número de casos</b>	<b>250</b>	<b>75</b>	<b>175</b>	<b>150</b>	<b>100</b>
% que usaron método					
Inyección	32.6	26.9	34.7	44.3	12.6
Condón	27.7	24.1	29.0	22.0	37.4
Píldora	16.4	13.4	17.5	20.7	9.1
Ritmo	10.4	13.6	9.3	2.5	23.9
Retiro	6.6	20.1	1.5	1.6	14.9
DIU	5.7	1.6	7.3	8.4	1.3
Billings	0.6	0.3	0.7	0.5	0.9
<b>Total</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Número de casos</b>	<b>150</b>	<b>39</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	<b>47</b>

## CUADRO 27

**PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD QUE RECIBIERON ALGUNA LECCION, CURSO O CHARLA SOBRE EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA, POR EDAD, EN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98**

AREA DE RESIDENCIA	<u>CORDILLERA</u>		<u>MISIONES</u>		<u>CENTRAL</u>		<u>TOTAL DEL PAIS</u>	
	EDAD		EDAD		EDAD		EDAD	
	15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24	15-19	20-24
<b>TOTAL</b>	77.8	54.3	66.5	44.6	76.1	72.5	66.7	53.0
Nº de casos	112	64	130	87	193	215	766	602

## CUADRO 28

### PORCENTAJE DE MUJERES DE 15 A 24 AÑOS DE EDAD CUYO CURSO EN EDUCACION SEXUAL INCLUYO TEMAS SELECCIONADOS EN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, SEGUN TEMAS, ENSMI-98

<b>TEMAS</b>	<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b><u>CORDILLERA</u></b>	<b><u>MISIONES</u></b>	<b><u>CENTRAL</u></b>
Menstruación o regla	96.7	96.2	98.8	96.4
Aparato Reproductor Femenino	95.1	92.5	97.1	96.7
Aparato Reproductor Masculino	94.5	92.8	97.1	96.4
Desarrollo del Cuerpo en la Pubertad	94.2	86.1	96.5	97.5
Embarazo y Parto	85.8	85.5	93.9	84.6
Relaciones Sexuales	84.1	83.3	89.0	81.8
El SIDA	78.3	84.7	85.4	72.8
Enfermedades de Transmisión Sexual	77.9	73.0	80.4	78.9
Métodos Anticonceptivos	68.6	73.0	77.6	77.6
<b>Nº de Casos</b>	<b>840</b>	<b>118</b>	<b>124</b>	<b>277</b>

## CUADRO 29

### METODO ANTICONCEPTIVO CONSIDERADO MAS APROPIADO PARA JOVENES, MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD EN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98

<b>METODO CONSIDERADO MAS APROPIADO</b>	<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b><u>CORDILLERA</u> TOTAL</b>	<b><u>MISIONES</u> TOTAL</b>	<b><u>CENTRAL</u> TOTAL</b>
Condón	27.2	19.4	36.1	38.8
Pastillas	21.9	19.8	24.7	23.2
Inyección	18.0	27.8	21.5	17.6
DIU	4.9	1.0	6.5	7.0
Métodos Naturales	3.9	1.0	1.3	5.6
Yuyos	1.6	6.2	1.6	0.2
Retiro	1.1	0.0	0.0	0.6
No Sabe/No Responde	20.7	24.7	8.4	7.5
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
<b>Nº de Casos</b>	<b>800</b>	<b>84</b>	<b>131</b>	<b>250</b>

### CUADRO 30

#### OPINION SOBRE QUIEN DEBE TOMAR LA INICIATIVA PARA USAR UN METODO, POR NIVEL DE INSTRUCCION MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD EN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98

NIVEL DE INSTRUCCION Y DEPARTAMENTO	OPINION SOBRE QUIEN DEBE INICIAR USO DE UN METODO					TOTAL	N° DE CASOS
	HOMBRE	MUJER	LOS DOS JUNTOS	OTRO	NO SABE/ NO RESPONDE		
<b>TOTAL DEL PAIS</b>	<b>12.1</b>	<b>37.8</b>	<b>44.2</b>	<b>5.4</b>	<b>0.4</b>	<b>100.0</b>	<b>800</b>
<b>CORDILLERA</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>14.4</b>	<b>34.2</b>	<b>48.9</b>	<b>1.7</b>	<b>0.9</b>	<b>100.0</b>	<b>84</b>
0-5 años/Prim. completa	16.8	37.1	41.5	1.6	3.1	100.0	44
Secundaria y más	11.3	30.5	58.2	0.0	0.0	100.0	40
<b>MISIONES</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>14.8</b>	<b>47.1</b>	<b>36.9</b>	<b>0.0</b>	<b>1.1</b>	<b>100.0</b>	<b>131</b>
0-5 años/ Prim. completa	14.0	61.7	23.7	0.0	0.6	100.0	78
Secundaria y más	15.9	26.6	55.6	0.0	1.8	100.0	53
<b>CENTRAL</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>9.1</b>	<b>41.2</b>	<b>49.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.4</b>	<b>100.0</b>	<b>250</b>
0-5 años/Prim. completa	6.9	70.5	21.3	0.0	1.2	100.0	95
Secundaria y más	10.0	28.7	61.3	0.0	0.0	100.0	155

### CUADRO 31

#### PORCENTAJE DE MUJERES DE 15-24 AÑOS DE EDAD DE ACUERDO CON DECLARACIONES REFERENTES A LA FERTILIDAD, POR NIVEL DE INSTRUCCION EN DEPARTAMENTOS PRIORITARIOS, ENSMI-98

DEPARTAMENTO Y DECLARACION	TOTAL	PRIMARIA	SECUNDARIA Y MAS
<b>CORDILLERA</b>			
Una mujer puede embarazarse la primera vez que tiene relaciones sexuales	63.6	57.3	67.6
Es el hombre quien decide los hijos que debe tener la pareja	16.8	29.2	8.8
Es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio	66.5	59.0	71.3
<b>Nº de casos</b>	<b>176</b>	<b>63</b>	<b>113</b>
<b>MISIONES</b>			
Una mujer puede embarazarse la primera vez que tiene relaciones sexuales	51.7	44.3	58.1
Es el hombre quien decide los hijos que debe tener la pareja	13.1	20.8	6.6
Es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio	57.0	55.1	58.5
<b>Nº de casos</b>	<b>217</b>	<b>102</b>	<b>115</b>
<b>CENTRAL</b>			
Una mujer puede embarazarse la primera vez que tiene relaciones sexuales	74.8	70.3	76.1
Es el hombre quien decide los hijos que debe tener la pareja	12.7	20.8	10.4
Es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio	60.2	57.7	60.9
<b>Nº de casos</b>	<b>408</b>	<b>127</b>	<b>281</b>

Encuesta Nacional De Salud Materno Infantil 1998 (ENSMI-98)

**ANEXO C**

**EL CUESTIONARIO**



# PARAGUAY

## ENCUESTA DE SALUD MATERNO-INFANTIL 1998

### CUESTIONARIO DEL HOGAR

#### IDENTIFICACION

A. IDENTIFICACION GEOGRAFICA	B. IDENTIFICACION MUESTRAL
REGION _____ <input type="checkbox"/>	CUESTIONARIO N°. _____ <input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO _____ <input type="checkbox"/>	SECTOR _____ <input type="checkbox"/>
DISTRITO _____ <input type="checkbox"/>	MANZANA/MAPA _____ <input type="checkbox"/>
BARRIO (LOCALIDAD) _____	AREA EMP.(AE) _____ <input type="checkbox"/>
AREA	VIVIENDA N°. (HOGAR) _____ <input type="checkbox"/>
URBANA _____ 1	N°. DE SEGMENTO _____ <input type="checkbox"/>
RURAL _____ 3	
RURAL _____ 6	

DIRECCION DE LA VIVIENDA SELECCIONADA

Calle/Camino/Carretera: \_\_\_\_\_

Barrio: \_\_\_\_\_ Casa/Lote N°: \_\_\_\_\_ Piso N°: \_\_\_\_\_

NOMBRE DEL/A JEFE/A DEL HOGAR: \_\_\_\_\_

C. RESULTADO DE VISITAS DE LA ENTREVISTA				
Número de visita	1	2	3	4
Código de la entrevistadora	___	___	___	___
Fecha visita	Día ___ Mes ___	Día ___ Mes ___	Día ___ Mes ___	Día ___ Mes ___
Hora inicial de la entrevista	Hora ___ Min. ___	Hora ___ Min. ___	Hora ___ Min. ___	Hora ___ Min. ___
Resultado (*)	___	___	___	___
(*) Código de Resultado	Entrevista completa (Viv. y MEF)	1	No hay MEF (Viv. hecha)	5
	Moradores ausentes (Viv. hecha)	2	MEF ausente (Viv. hecha)	6
	Rechazo de vivienda	3	Rechazo de MEF (Viv. hecha)	7
	Vivienda desocupada	4	Otro: _____	8
			(especifique)	

D. OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

E. DATOS DE PROCESAMIENTO			
	Código	Día	Mes
Criticado	___	___	___
Codificado	___	___	___
Digitado	___	___	___
Verificado	___	___	___

**I. SELECCION DE LA MUJER ENTREVISTADA**

100	¿Cuántas personas (incluyendo niños) residen habitualmente en esta vivienda?	No. Total de varones	□□
		No. Total de mujeres	□□
		No. Total de personas	□□

-- LEA: **Por favor, ¿Puede decirme los nombres de cada mujer de 15 a 44 años de edad que viven habitualmente en este hogar, empezando con la de más edad?**  
 -- SI NO HAY MEF, ANOTE 00 EN 102 Y CONTINUE CON LA SIGUIENTE VIVIENDA  
 -- SI HAY MEF, COMPLETE ESTA HOJA ANOTANDO EN EL RENGLON UNO A LA MUJER DE MAYOR EDAD Y PROSIGA EN ORDEN DESCENDENTE

101	Linea de MEF	Nombre de la Mujer en Edad Fertil (MEF)	EDAD Años cumplidos	ESTADO CIVIL O CONYUGAL	NIVEL Y GRADO DE INSTRUCCION APROBADO	
					NIVEL	GRADO
				UNIDA.....1	NINGUNO	0 0
				CASADA.....2	PRIMARIO	1 1 2 3 4 5 6
				VIUDA.....3	SECUNDARIO	2 1 2 3 4 5 6
				SEPARADA.....4	FORMACION	
				DIVORCIADA.....5	DOCENTE	3 1 2 3 4 5 6
				SOLTERA.....6	SUPERIOR	4 1 2 3 4 5 6+
				NO SABE.....9	NO SABE	9
1.						:
2.						:
3.						:
4.						:
5.						:
6.						:
7.						:
8.						:

102	¿Entonces, en esta casa viven en total ..... mujeres de 15 a 44 años de edad?	Nº. de MEF □□ SI ES 00 PONER CODIGO 7 EN RESULTADO Y CONTINUE CON LA SIGUIENTE VIVIENDA
-----	---	---

**CUADRO PARA SELCCION DE LA MEF A ENTREVISTAR**

ULTIMO CODIGO DEL NUMERO DEL CUESTIONARIO	NUMERO DE MEF EN LA VIVIENDA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	2	2	4	3	6	5	4
1	1	1	3	1	4	1	6	5
2	1	2	1	2	5	2	7	6
3	1	1	2	3	1	3	1	7
4	1	2	3	4	2	4	2	8
5	1	1	1	1	3	5	3	1
6	1	2	2	2	4	6	4	2
7	1	1	3	3	5	1	5	3
8	1	2	1	4	1	2	6	4
9	1	1	2	1	2	3	7	5

NOMBRE DE LA MEF SELECCIONADA	_____
Nº DE LA LINEA DE LA MEF SELECCIONADA	□

# PARAGUAY

## ENCUESTA NACIONAL DE SALUD MATERNO-INFANTIL

1998

CENTRO PARAGUAYO DE ESTUDIOS DE POBLACION (CEPEP)

### CUESTIONARIO INDIVIDUAL

#### I. IDENTIFICACION

IDENTIFICACION GEOGRAFICA Y MUESTRAL	
CUESTIONARIO N°:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
LINEA MEF N°:	<input type="checkbox"/>
N° de SEGMENTO:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
REGION:	<input type="checkbox"/>
DEPARTAMENTO:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
DISTRITO:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
AREA (URBANA-RURAL)	<input type="checkbox"/>
BARRIO (LOCALIDAD):	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SECTOR	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
MANZANA/MAPA:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
AREA-EMPADRONAMIENTO-AE:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
N° DE VIVIENDA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

DIRECCION DE LA VIVIENDA SELECCIONADA.

Calle/Camino/Ruta: \_\_\_\_\_

Barrio/Compañía/Localidad: \_\_\_\_\_ N° de CASA: \_\_\_\_\_ Piso N°: \_\_\_\_\_

PRIMER NOMBRE DE LA MUJER ENTREVISTADA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



## II. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA ENTREVISTADA

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
199	<b>ANOTE LA HORA</b>	HORAS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> MINUTOS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
200	Por favor dígame, ¿En qué mes y año nació Ud.?	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> NO RECUERDA/ NO SABE .....99	
201	Entonces, ¿Qué edad cumplió en su último cumpleaños?	EDAD EN AÑOS..... <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE ..... 99	
<p><b>SUME AÑO EN 200 Y EDAD EN 201, Y ANOTE EL TOTAL _____</b>  <b>SI LA MUJER YA CUMPLIO AÑOS, EN ESTE AÑO, EL TOTAL TIENE QUE SER 98.</b>  <b>SI LA MUJER TODAVIA NO HA CUMPLIDO AÑOS, EL TOTAL TIENE QUE SER 97.</b>  <b>SI LA EDAD DE LA ENTREVISTADA NO ESTA ENTRE 15 Y 44 AÑOS <u>TERMINE LA ENTREVISTA Y SELECCIONE OTRA MUJER</u></b></p>			
202	¿Qué idioma hablan habitualmente la mayoría de los miembros de este hogar?	GUARANI .....1 ESPAÑOL .....2--- ESPAÑOL Y GUARANI .....3--- OTRO IDIOMA _____ .....4--- (Especifique)	--->204 --->205 --->205
203	¿Pueden hablar y entender español?	SI.....1--- NO.....2---	--->205 --->205
204	¿Pueden hablar y entender guarani?	SI.....1 NO.....2	
205	¿En dónde vivía Ud. a inicios de 1993 (hace 5 años)?	AQUI .....1--- EN OTRO LUGAR DEL PAIS.....2 EN EL EXTRANJERO .....3---	-> 207 -> 207
206	¿Cuál era el departamento de su residencia hace cinco años (1993)?  LOCALIDAD:	ASUNCION..... 1      CENTRAL ..... 12 CONCEPCION .....2      ÑEEMBUCU..... 13 SAN PEDRO.....3      AMAMBAY ..... 14 CORDILLERA.....4      CANINDEYU ..... 15 GUAIRA.....5      PTE.HAYES ..... 16 CAAGUAZU.....6      ALTO PARAGUAY ..... 17 CAAZAPA.....7      BOQUERON ..... 18 ITAPUA.....8      NS/NR ..... .98 MISSIONES .....9 PARAGUARI.....10 ALTO PARANA.....11	
207	¿Cuál fue el grado más alto que Ud. aprobó y en qué nivel de estudios?	NINGUNO                      NIVEL    GRADO 0                              0 PRIMARIO                    1           1 2 3 4 5 6 SECUNDARIO                2           1 2 3 4 5 6 FORMAC.DOCENTE        3           1 2 3 4 5 6 SUPERIOR                    4           1 2 3 4 5 6+	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
208	<p>Me gustaría preguntarle sobre su actividad laboral.</p> <p>¿Trabaja usted actualmente en algo recibiendo pago en dinero o en otra forma?</p>	<p>SI..... 1</p> <p>NO.....2--</p>	-->211
209	¿Trabaja fuera o dentro del hogar?	<p>FUERA DEL HOGAR ..... 1</p> <p>DENTRO DEL HOGAR.....2</p>	
210	En ese trabajo te desempeñas como: (LEA LAS ALTERNATIVAS 1-6)	<p>EMPLEADA/TRABAJADORA POR SUELDO O SALARIO ..... 1--</p> <p>JORNALERO..... 2--</p> <p>PATRON O EMPLEADOR ..... 3--</p> <p>POR CUENTA PROPIA..... 4--</p> <p>FAMILIAR CON REMUNERACION..... 5--</p> <p>FAMILIAR SIN REMUNERACION..... 6--</p> <p>OTRO: _____ 8--</p>	] > 213
211	¿Buscó trabajo en la última semana?	<p>SI..... 1--</p> <p>NO..... 2</p>	--->213
212	¿Por qué no trabajas ni buscas trabajo?	<p>INCAPACIDAD FISICA..... 1</p> <p>NO NECESITA TRABAJAR.....2</p> <p>AYUDA EN LA CASA .....3</p> <p>ESTA EMBARAZADA/DEJO TRABAJO ..... 4</p> <p>NO TIENE CON QUIEN DEJAR LOS NIÑOS.....5</p> <p>AMA DE CASA ..... 6</p> <p>NO LE GUSTA TRABAJAR..... 7</p> <p>CANSADA DE BUSCAR TRABAJO..... 8</p> <p>MARIDO NO QUIERE QUE TRABAJE ..... 9</p> <p>PROBLEMAS DE SALUD ..... 10</p> <p>INTERFIERE ESTUDIOS ..... 11</p> <p>OTRO _____ 20</p> <p>(ESPECIFIQUE)</p>	
213	¿Tiene Ud. seguro privado o está Ud. asegurada en el Instituto de Previsión Social (IPS)?	<p>SI - IPS ..... 1</p> <p>SI - SEGURO PRIVADO .....2</p> <p>SI - AMBOS .....3</p> <p>NO .....4</p> <p>NO SABE .....9</p>	

### III. HISTORIA DE NACIMIENTOS

**LEA A LA ENTREVISTADA:**

*Ahora deseamos obtener información de todos los embarazos y partos que Ud. haya tenido durante toda su vida, hasta la fecha.*

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
300	¿Actualmente está Ud. embarazada?	SI..... 1 NO..... 2--- NO SABE ..... 9---	↓> 303
301	En este embarazo, ¿Quería Ud. quedar embarazada entonces, quería <u>esperar más tiempo</u> o <u>no quería el embarazo</u> ?	QUERIA ENTONCES ..... 1--- ESPERAR MAS TIEMPO ..... 2 NO QUERIA..... 3--- NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9---	-> 305 -> 305 -> 305
302	¿Cuánto tiempo más hubiera querido esperar?	MESES ..... 1    _ _  AÑOS..... 2    _ _  NO SABE ..... 9    99	}> 305
303	¿Ha estado Ud. embarazada alguna vez?	SI..... 1--- NO..... 2	-> 307
304	¿Tuvo Ud. algún embarazo que terminó antes de completar su sexto mes de embarazo?	SI..... 1--- NO..... 2---	->316 ->500 (PAGINA 25)
305	¿Cuántos meses de embarazo tiene Ud.?	MESES .....    _ _	
306	¿Es/fue su primer embarazo?	SI..... 1--- NO..... 2	-> 500 (PAGINA 25)
307	Ahora, hablando de sus hijos que se encuentran vivos, ¿Cuántos hijos y cuántas hijas viven actualmente con Ud.?	A. HIJOS EN CASA            _ _  B. HIJAS EN CASA          _ _  C. TOTAL HIJOS EN CASA    _ _  <b>(SI NO TIENE ANOTE 00)</b>	
308	¿Cuántos de sus hijos y cuántas de sus hijas actualmente vivos no viven con Ud.?	A. HIJOS FUERA DE CASA    _ _  B. HIJAS FUERA DE CASA    _ _  C. TOTAL HIJOS FUERA DE CASA    _ _  <b>(SI NO TIENE ANOTE 00)</b> ---	->310

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
310	¿Tuvo Ud. hijos o hijas que nacieron vivos y que murieron, aunque hayan vivido poco tiempo?	SI..... 1 NO..... 2----	->312
311	¿Cuántos de sus hijos y cuántas de sus hijas que nacieron vivos han muerto?	A.HIJOS QUE MURIERON <input type="checkbox"/> B.HIJAS QUE MURIERON <input type="checkbox"/> C.TOTAL HIJOS QUE MURIERON <input type="checkbox"/> <b>(SI NO TIENE ANOTE 00)</b>	
312	¿Tuvo algún hijo o hija que nació muerto después de completar el sexto mes de embarazo (mortinato)?	SI .....1 NO .....2----	-> 315
313	¿Cuántos de sus embarazos terminaron en hijos que nacieron muertos?	Nº DE HIJOS QUE NACIERON MUERTOS (MORTINATOS) <input type="checkbox"/>	
314	¿Presentó el(los) niño(s) algunos signos de vida, por ejemplo, respiró o lloró?	SI ..... 1 NO ..... 2	
<p><b>SI LA RESPUESTA ES SI, CORRIJA LAS PREGUNTAS 310, 311, 312 Y 313. EXPLIQUE A LA MUJER: <i>Para nuestro estudio, queremos incluir este(os) niño(s) como nacido(s) vivo(s).</i></b></p>			
315	Hay mujeres que pierden sus embarazos antes de cumplir su sexto mes, ¿Ha perdido Ud. alguno antes de completar su sexto mes (abortos)?	SI .....1 NO .....2----	-> 317
316	¿Cuántas pérdidas (abortos) ha tenido Ud. antes de completar el sexto mes de embarazo?	No. DE PERDIDAS <input type="checkbox"/> NO SABE/NO RECUERDA      9	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
317	<p><b>ANOTE LOS TOTALES DE LAS PREGUNTAS 300, 307C, 308C, 311C, 313 Y 316</b></p> <p><b>PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS ESTEN CORRECTOS, PREGUNTE: ¿Ud. ha tenido en total ..... embarazos?</b></p> <p><b>SI EL TOTAL COINCIDE CON EL NUMERO DE EMBARAZOS, CONTINUE CON 318.</b></p>	<p>300. ACTUALMENTE EMBARAZADA <b>(SI NO ESTA EMBARAZADA MARQUE 0 AQUI)</b>..... <input type="checkbox"/></p> <p>307C. TOTAL HIJOS QUE VIVEN EN CASA..... <input type="checkbox"/></p> <p>308C. TOTAL HIJOS FUERA DE CASA ..... <input type="checkbox"/></p> <p>311C. TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS QUE MURIERON ..... <input type="checkbox"/></p> <p>313.MORTINATOS ..... <input type="checkbox"/></p> <p>316.PERDIDAS ..... <input type="checkbox"/></p>	
	<p><b>SI NO COINCIDE Y ESTO NO SE DEBE A "PARTOS MULTIPLES" INDAGUE, CORRIJA Y CONTINUE</b></p>	<p><b>SUMA TOTAL</b> ..... <input type="checkbox"/></p> <p><b>NUMERO DE PARTOS MULTIPLES</b> ..... <input type="checkbox"/></p>	
318	<p><b>ANOTE LOS TOTALES DE LAS PREGUNTAS 307C, 308C Y 311C</b></p> <p><b>PARA CORROBORAR QUE LOS DATOS ESTEN CORRECTOS, PREGUNTE: ¿Ud. ha tenido en total ..... hijos nacidos vivos?</b></p>	<p>307C. TOTAL HIJOS QUE VIVEN EN CASA <input type="checkbox"/></p> <p>308C. TOTAL HIJOS FUERA DE CASA <input type="checkbox"/></p> <p>311C. TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS QUE MURIERON <input type="checkbox"/></p> <p><b>SUMA TOTAL NACIDOS VIVOS</b> <input type="checkbox"/></p> <p><b>SI ES 00 PASE A 500 (PAGINA 25)</b></p>	

**Ahora quisiera hacer una lista de los hijos e hijas nacidos vivos que Ud. ha tenido, estén vivos o hayan muerto. Empecemos por el menor.**

**- ANOTE EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS NACIDOS VIVOS EN LA PRIMERA COLUMNA, EMPIECE POR EL MENOR EN FILA 1 Y CONTINUE EN ORDEN DE NACIMIENTOS ( DE MENOR A MAYOR)**

**- LOS DATOS DE NACIMIENTOS VIVOS MULTIPLES (GEMELOS, TRILLIZOS, ETC.) REGISTRELOS EN FILAS SEPARADAS Y UNALOS CON UNA LLAVE**

**- EN COLUMNA f., ANOTE DIAS SI LA EDAD ES MENOR DE 1 MES; ANOTE MESES SI LA EDAD ES MAYOR O IGUAL A 1 MES Y MENOR A 2 AÑOS; ANOTE AÑOS SI LA EDAD ES MAYOR O IGUAL A 2 AÑOS**

319 ¿Qué nombre le puso?	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Está vivo (a)?	d. ¿Qué edad tiene en años cumplidos? ANOTE "00" SI ES MENOS DE 1 AÑO	e. ¿En qué mes y año murió?	f. ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió?
01. ----- <b>ULTIMO NACIDO VIVO</b>	HOMBRE ....1 MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
02. ----- <b>PENULTIMO</b>	HOMBRE ....1 MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
03. ----- <b>ANTEPENULTIMO</b>	HOMBRE ....1 MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
04. ----- <b>CUARTO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1 MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
05. ----- <b>OCTAVO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1 MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
06. ----- <b>SEXTO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1 MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	SI.....1--> NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/> <input type="text"/> <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

319 ¿Qué nombre le puso?	a. ¿Hombre o mujer?	b. ¿En qué fecha nació?	c. ¿Está vivo (a)?	d. ¿Qué edad tiene en años cumplidos? ANOTE "00" SI ES MENOS DE 1 AÑO	e. ¿En qué mes y año murió?	f. ¿Qué edad tenía (NOMBRE) cuando murió?
07. ----- <b>SEPTIMO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1  MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/>	SI.....1-->  NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/>  <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/>  AÑO ..... <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/>
08. ----- <b>OCTAVO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1  MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/>	SI.....1-->  NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/>  <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/>  AÑO ..... <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/>
09. ----- <b>NOVENO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1  MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/>	SI.....1-->  NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/>  <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/>  AÑO ..... <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/>
10. ----- <b>DECIMO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1  MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/>	SI.....1-->  NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/>  <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/>  AÑO ..... <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/>
11. ----- <b>UNDECIMO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1  MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/>	SI.....1-->  NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/>  <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/>  AÑO ..... <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/>
12. ----- <b>DUODECIMO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1  MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/>	SI.....1-->  NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/>  <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/>  AÑO ..... <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/>
13. ----- <b>DECIMO TERCERO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1  MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/>	SI.....1-->  NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/>  <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/>  AÑO ..... <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/>
14. ----- <b>DECIMO CUARTO ANTERIOR</b>	HOMBRE ....1  MUJER.....2	DIA ..... <input type="text"/> MES..... <input type="text"/> AÑO..... <input type="text"/>	SI.....1-->  NO.....2- v <b>Pasa a col. e</b>	<input type="text"/>  <b>PASE A SIG. NIÑO</b>	MES ..... <input type="text"/>  AÑO ..... <input type="text"/>	DIAS..... 1 <input type="text"/> MESES ..... 2 <input type="text"/> AÑOS..... 3 <input type="text"/>

**IV.- A- SALUD EN LA NIÑEZ**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
400	<b>VEA EN 319 b. SI EL ULTIMO NACIDO VIVO OCURRIO A PARTIR DE ENERO DE 1993</b>	ANTES DE ENERO DE 1993 ..... 1---- A PARTIR DE ENERO DE 1993 ..... 2	-> 500 (PAGINA 25)
	<b>ENTREVISTADORA: ANOTE EL NOMBRE DEL ULTIMO NACIDO VIVO NOMBRE: _____</b>		
401	En la época en que quedó embarazada del último hijo que tuvo. ¿Ud. deseaba ese embarazo?	SI..... 1--- NO..... 2 NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9---	—>403 —>403
402	¿No quería tener (más) hijos o le hubiera gustado esperar un poco?	NO QUERIA MAS ..... 1 QUERIA ESPERAR ..... 2	
403	¿Le dió el pecho a <b>(NOMBRE)</b> ?	SI..... 1---- NO..... 2	-> 405
404	¿Por qué no le dió el pecho a <b>(NOMBRE)</b> ?	MADRE NO QUERIA ..... 1-- NIÑO MURIO..... 2-- NIÑO SE ENFERMO ..... 3-- NO TENIA LECHE..... 4-- SALIA A TRABAJAR ..... 5-- LA MADRE ENFERMO ..... 6-- PEZON INVERTIDO O LESIONES..... 7-- NIÑO NO QUERIA ..... 8-- OTRO _____ ..... 20-- (ESPECIFIQUE)	} > 408
405	¿Cuánto tiempo después de nacer <b>(NOMBRE)</b> empezó a darle el pecho?	MINUTOS ..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HORAS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> DIAS..... 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
406	<b>VEA EN 319 c. SI (NOMBRE) SE MURIO</b>	VIVO ..... 1 MUERTO ..... 2----	-> 408
407	¿Está dándole el pecho actualmente?	SI..... 1 NO..... 2	
408	¿A los cuántos meses después del nacimiento de <b>(NOMBRE)</b> le volvió su menstruación?	MESES ..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> EN EL MISMO MES..... 00 NO LE HA VUELTO AUN ..... 97 NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
409	¿A los cuántos meses después del nacimiento de <b>(NOMBRE)</b> volvió a tener relaciones sexuales?	MESES ..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> EN EL MISMO MES..... 00 DESPUES DE 40 DIAS ..... 90 NO HA VUELTO A TENER ..... 97 NO SABE/ NO RECUERDA ..... 99	



410	VEA 319.b. CUANTOS HIJOS NACIERON VIVOS A PARTIR DE ENERO DE 1993	_ _ _
-----	---	-------

**VEA 319 Y ANOTE EN PREGUNTAS 420 Y 421 EL NOMBRE Y ESTADO DE SOBREVIVENCIA DE CADA UNO DE LOS NACIDOS VIVOS A PARTIR DE ENERO DE 1993, AUNQUE NO ESTEN ACTUALMENTE VIVOS**

PREGUNTAS	ULTIMO NACIDO VIVO	PENULTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR	CUARTO ANTERIOR	QUINTO ANTERIOR
<b>420 NOMBRE (VEA 319)</b>					
<b>421 ESTA VIVO (VEA 319, COL. c.)</b>	SI ..... 1 NO ..... 2				
<b>422</b> En la época en que quedó embarazada de <b>(NOMBRE)</b> , ¿Quería Ud. tener ese hijo entonces, quería esperar más tiempo, o no quería más hijos?	QUERIA ENTONCES ..... 1-->424 QUERIA ESPERAR ..... 2 NO QUERIA MAS HIJOS ..... 3->424	QUERIA ENTONCES ..... 1-->424 QUERIA ESPERAR ..... 2 NO QUERIA MAS HIJOS ..... 3->424	QUERIA ENTONCES ..... 1-->424 QUERIA ESPERAR ..... 2 NO QUERIA MAS HIJOS ..... 3->424	QUERIA ENTONCES ..... 1-->424 QUERIA ESPERAR ..... 2 NO QUERIA MAS HIJOS ..... 3->424	QUERIA ENTONCES ..... 1-->424 QUERIA ESPERAR ..... 2 NO QUERIA MAS HIJOS ..... 3->424
<b>423</b> ¿Cuánto tiempo más hubiera querido esperar?	MESES ..... 1 _ _ _ ANOS ..... 2 _ _ _ NO SABE ..... 9 99				
<b>424</b> ¿Tuvo algún control prenatal cuando estaba embarazada de <b>(NOMBRE)</b> ?	SI ..... 1 NO ..... 2->431				
<b>425</b> ¿Dónde se hizo el control? ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL MINISTERIO ..... 1 SANATORIO/HOSP.PRIVADO ..... 2 HOSPITAL DE CLINICAS ..... 3 CRUZ ROJA ..... 4 ESTABLECIMIENTO DEL IPS ..... 5 HOSPITAL MILITAR O POLICIAL ..... 6 CLINICA DE LA FAMILIA-CEPEP ..... 7 FARMACEUTICO ..... 8 MEDICO NANA-CURANDERO ..... 9 CONSULTORIO DR.PRIVADO ..... 10 OBSTETRA PROFESIONAL ..... 11 PARTERA CHAE ..... 12 OTRO ..... 20 NO SABE/NO RECUERDA ..... 98	_ _ _ Código				
<b>426</b> ¿Cuántos meses de embarazo tenía cuando le hicieron el primer control?	MESES ..... _				
<b>427</b> ¿En total, cuántos controles tuvo?	No. DE CONTROLES ..... _ _ _				

PREGUNTAS	ULTIMO NACIDO VIVO	PENULTIMO NACIDO VIVO	TERCERO ANTERIOR	CUARTO ANTERIOR	QUINTO ANTERIOR
<b>428</b> ¿Cuánto tiempo le tomó, llegar desde su casa hasta el lugar donde tuvo el <u>último control</u> de <b>(NOMBRE)</b> ?	MINUTOS..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HORAS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE ..... 9 99				
<b>429</b> ¿Cuánto pagó usted por los costos de transporte para llegar de su casa al lugar donde tuvo el <u>último control</u> de <b>(NOMBRE)</b> ?	CANTIDAD EN GUARANIES ..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....999999  NO TUVO QUE PAGAR .....000000				
<b>430</b> ¿Cuánto tuvo que pagar Ud. en total por el <u>último control</u> , incluyendo medicamentos, honorarios del profesional que le atendió,hospitalización,etc.?	CANTIDAD EN GUARANIES ..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....999999  NO TUVO QUE PAGAR .....000000				
<b>431</b> Durante este embarazo, ¿Le vacunaron a Ud. contra el tétano (para proteger al niño de convulsiones después de nacer)?	SI.....1 NO.....2 NR.....9	SI.....1 NO.....2 NR.....9	SI.....1 NO.....2 NR.....9	SI.....1 NO.....2 NR.....9	SI.....1 NO.....2 NR.....9
<b>432</b> ¿En qué lugar tuvo el parto de <b>(NOMBRE)</b> ? ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL MINISTERIO .....1 SANATORIO/HOSP.PRIVADO.....2 HOSPITAL DE CLINICAS.....3 CRUZ ROJA.....4 HOSPITAL IPS.....5 HOSPITAL MILITAR O POLICIAL.....6 CLINICA/MEDICO PRIVADO.....7 ARGENTINA/ BRASIL.....8- EN CASA CON OBSTETRA PROFESIONAL. 9- EN CASA CON PARTERA CHAE.....10- EN CASA CON FAMILIARES .....11- PARTO SOLA .....12- EN CASA DE LA PARTERA .....13- OTRO .....20- NO SABE/NO RECUERDA.....99	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Código  } -> Próxima columna	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Código  } -> Próxima columna	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Código  } -> Próxima columna	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Código  } -> Próxima columna	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Código  } -> 441
<b>433</b> ¿Qué profesional le atendió?	MEDICO.....1 OBST.PROFESIONAL...2 ENFERMERA.....3 AUX.ENFERMERIA.....4 OTRO .....8 NO SABE .....9	MEDICO.....1 OBST.PROFESIONAL .2 ENFERMERA.....3 AUX.ENFERMERIA.....4 OTRO .....8 NO SABE .....9	MEDICO.....1 OBST.PROFESIONAL...2 ENFERMERA.....3 AUX.ENFERMERIA.....4 OTRO.....8 NO SABE .....9	MEDICO.....1 OBST.PROFESIONAL...2 ENFERMERA.....3 AUX.ENFERMERIA.....4 OTRO.....8 NO SABE .....9	MEDICO.....1 OBST.PROFESIONAL...2 ENFERMERA.....3 AUX.ENFERMERIA.....4 OTRO .....8 NO SABE.....9
<b>434</b> ¿El parto de <b>(NOMBRE)</b> fue normal (vaginal) o por cesárea?	VAGINAL.....1 CESAREA .....2	VAGINAL.....1 CESAREA .....2	VAGINAL .....1 CESAREA .....2	VAGINAL.....1 CESAREA .....2	VAGINAL .....1 CESAREA .....2

439	SI LA RESPUESTA A 432 = 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13 ---> PASE A 441 SI LA RESPUESTA A 432 = 1, 2, 5, 6, 7, 8, 20 o 99 ---> PASE A 440		
<b>ENTREVISTADORA: LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOLAMENTE PARA EL ULTIMO NACIDO VIVO</b>			
Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
440	¿Cuál es el nombre del lugar dónde tuvo el parto de <b>(NOMBRE)</b> y dónde queda?	NOMBRE:  DONDE QUEDA:	
441	¿Planeaba tener el parto de <b>(NOMBRE)</b> dónde tuvo?	SI ..... 1-- NO ..... 2 NO SABE/NO RECUERDA ..... 9--	->444  ->444
442	¿Dónde planeaba tener usted el parto de <b>(NOMBRE)</b> ?	ESTABLECIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD..... 1 SANATORIO/HOSP.PRIVADO ..... 2 HOSPITAL DE CLINICAS ..... 3 CRUZ ROJA ..... 4 HOSPITAL IPS ..... 5 HOSPITAL MILITAR O POLICIAL. .... 6 CLINICA/MEDICO PRIVADO ..... 7 EN CASA C/ OBSTETRA PROFESIONAL... 8 EN CASA CON PARTERA CHAE ..... 9 EN CASA CON FAMILIARES ..... 10 PARTO SOLA..... 11 EN CASA CON PARTERA..... 12 OTRO ..... 20 NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
443	¿Por qué no tuvo usted el parto de <b>(NOMBRE)</b> donde había planeado?	PORQUE AHI NO LE ATENDIERON ..... 1 PORQUE DE AHI LE REFIRIERON A OTRO LUGAR..... 2 PORQUE ESTABA CERRADO ..... 3 NO TUVO TIEMPO PARA LLEGAR ..... 4 NO TUVO TRANSPORTE ..... 5 LE PIDIERON MUCHA PLATA/ MUY CARO ..... 6 SE MUDARON DE CASA ..... 7 MIEDO DEL CENTRO DE SALUD ..... 8 VIAJANDO ..... 9 NO ESTABA LA OBSTETRA..... 10 FAMILIARES QUISO QUE TENGA OTRO LUGAR ..... 11 CAMBIO DE MEDICO ..... 12 PROBLEMA CON SEGUROS ..... 13 OTRA RAZON ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA..... 99	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
444	¿Este lugar donde usted tuvo el parto de <b>(NOMBRE)</b> es el lugar más cercano a su casa donde se ofrece atención de parto?	SI .....1-- NO .....2 CASA .....20-- NO SABE ..... 99---	->446 ->448 ->446
445	¿Por qué usted no eligió el lugar más cercano a su casa para tener el parto de <b>(NOMBRE)</b> ?	PORQUE ES DE MALA CALIDAD ..... 1 PORQUE ES MUY CARO ..... 2 PORQUE NO ME RECIBIERON ..... 3 TIENE SEGURO DE IPS ..... 4 TIENE SEGURO PARTICULAR ..... 5 DEBIA HACERSE CESAREA ..... 6 TUVO COMPLICACIONES ..... 7 CONFIABA EN LA PARTERA ..... 8 OTRA RAZON _____ 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
446	¿Cuánto tiempo le tomó, llegar desde su casa hasta el lugar donde tuvo el parto de <b>(NOMBRE)</b>	TIEMPO EN MINUTOS ..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIEMPO EN HORA ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 9 99	
447	¿Cuánto pagó Ud. por los costos de transporte para llegar de su casa al lugar donde nació <b>(NOMBRE)</b> ?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....999999 NO TUVO QUE PAGAR .....000000	
448	¿Cuánto tuvo que pagar Ud. en total por la atención del parto, incluyendo medicamentos, honorarios del profesional que le atendió,hospitalización,etc.?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....9999999 NO TUVO QUE PAGAR ..... 0000000	
449	¿Alguien distinto de su pareja le ayudó a cubrir los gastos medicos del parto de <b>(NOMBRE)</b> ?	SI ..... 1 NO ..... 2-- NO SABE/NO RECUERDA ..... 9--	->451A ->451A
450	¿Quién pagó esa parte? <b>(ENTREVISTADORA: PUEDE ENCERRAR MÁS DE UNA RESPUESTA)</b>	a. UN PARIENTE .....1 b. UN AMIGO .....2 c. EMPLEADOR/PATRON .....3 d. SEGURO PRIVADO .....4 e. IPS .....5 f. PARTIDO POLITICO .....6 g. OTROS: _____ .....8	
451	¿Cuánto pagó (pagaron) esa(s) otra(s) persona(s) por el parto?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9999999	

451A	ENTREVISTADORA: REGISTRE TODOS LOS NACIDOS VIVOS A PARTIR DE ENERO DE 1993 EN ORDEN DE MENOR A MAYOR SEGUN DATOS DE PREGUNTAS 420 Y 421			
	<u>ORDEN</u>		<u>NOMBRE</u>	<u>ESTA VIVO</u>
	ULTIMO	1	_____	SI 1 NO 2
	PENULTIMO	2	_____	1 2
	TERCERO ANTERIOR	3	_____	1 2
	CUARTO ANTERIOR	4	_____	1 2
	QUINTO ANTERIOR	5	_____	1 2

CUADRO PARA SELECCION DEL NIÑO A INVESTIGAR					
PENULTIMO DIGITO DEL NUMERO DEL CUESTIONARIO	NUMERO DE NIÑOS LISTADOS				
	1	2	3	4	5
0	1	2	2	4	3
1	1	1	3	1	4
2	1	2	1	2	5
3	1	1	2	3	1
4	1	2	3	4	2
5	1	1	1	1	3
6	1	2	2	2	4
7	1	1	3	3	5
8	1	2	1	4	1
9	1	1	2	1	2

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
452	<b>A. NUMERO DEL NIÑO SELECCIONADO:</b> _____ <b>B. NOMBRE DEL NIÑO SELECCIONADO:</b> _____ <b>C. ¿ESTA VIVO?</b> SI 1 NO 2	<input type="checkbox"/>	
453	¿Después de que nació ( <b>NOMBRE</b> ), le llevó para control médico?	SI..... 1 NO..... 2----	-> 461
454	¿Cuánto tiempo después de nacido ( <b>NOMBRE</b> ), le llevó al control por primera vez?	DIAS..... 1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> SEMANAS ..... 2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> MESES ..... 3 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 9 99	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
455	¿Le llevó porque estaba enfermo o para un control de niño sano?	ESTABA ENFERMO..... 1 PARA CONTROL NIÑO SANO ..... 2 NO SABE/NO RECUERDA ..... 9	
456	¿A dónde le llevó al control?	ESTABLECIMIENTO DEL MSP ..... 1 SANATORIO/HOSP.PRIVADO ..... 2 HOSPITAL DE CLINICAS ..... 3 CRUZ ROJA ..... 4 HOSPITAL IPS ..... 5 HOSPITAL MILITAR O POLICIAL ..... 6 CLINICA DE LA FAMILIA-CEPEP ..... 7 CONSULTORIO DR.PRIVADO ..... 8 PARTERA ..... 9 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
<b>SOLAMENTE PARA ENTREVISTADAS QUE VIVEN EN CORDILLERA, MISIONES, O CENTRAL</b>			
457	<b>FILTRO: RESIDENCIA ACTUAL</b>	<b>VIVE EN DEPTO. CORDILLERA (4), MISIONES (9), o CENTRAL (12) ..... 1</b> <b>VIVE EN OTRO DEPTO..... 2--</b>	<b>--&gt;500 (PAGINA 25)</b>
458	¿Cuánto tiempo le tomó, llegar desde su casa hasta el lugar donde se realizó el primer control post-natal de <b>(NOMBRE)?</b>	TIEMPO EN MINUTOS ..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> TIEMPO EN HORAS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 9 99	
459	¿Cuánto pagó Ud. por los costos de transporte para llegar de su casa al lugar donde se realizó el primer control post-natal de <b>(NOMBRE)?</b>	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA ..... 999999 NO TUVO QUE PAGAR ..... 000000	
460	¿Cuánto tuvo que pagar Ud. en total por el primer control post-natal, incluyendo medicamentos, honorarios del profesional que le atendió, hospitalización, etc.?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA ..... 999999 NO TUVO QUE PAGAR ..... 000000	--    -->462   --
<b>SOLAMENTE PARA ENTREVISTADAS QUE VIVEN EN CORDILLERA, MISIONES, O CENTRAL</b>			
461	<b>FILTRO: RESIDENCIA ACTUAL</b>	<b>VIVE EN DEPTO. CORDILLERA (4), MISIONES (9), o CENTRAL (12) ..... 1</b> <b>VIVE EN OTRO DEPTO..... 2--</b>	<b>--&gt;500 (PAGINA 25)</b>
462	<b>VEA 452C: ¿ESTA VIVO (NOMBRE)?</b>	SI..... 1 NO..... 2----	<b>-&gt; 500 (PAGINA 25)</b>
463	¿Vive <b>(NOMBRE)</b> con Ud. actualmente?	SI..... 1 NO..... 2----	<b>-&gt; 500 (PAGINA 25)</b>

**IV-B- CONDICIONES DE SALUD Y USO DE SERVICIOS MEDICOS EN LAS ULTIMAS 4 SEMANAS PARA NACIDOS VIVOS A PARTIR DE ENERO 1993**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA		
			SI	NO	NS/NR
466	¿Ha tenido (NOMBRE) alguno de estos síntomas o molestias en las últimas 4 semanas? (LEALE UNO A UNO)	a. NARIZ TAPADA/ MOCO LIQUIDO..... b. TOS ..... c. DOLOR DE GARGANTA..... d. RONQUERA..... e. DIFICULTAD PARA TRAGAR O ALIMENTARSE..... f. DOLOR DE OIDOS O SECRECIONES DEL OIDO..... g. RESPIRACION RAPIDA..... h. RESPIRACION DIFICIL..... i. PECHO HUNDIDO..... j. LABIOS AZULES O MORADOS.....	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
467	¿Ha tenido (NOMBRE) alguna de estas enfermedades en las últimas 4 semanas (LEALE UNO A UNO)?	a. DIARREA..... b. OTRAS ENFERMEDADES INTESTINALES/ ESTOMACALES..... c. ENFERMEDADES DEL CORAZON..... d. ACCIDENTES O ENVENENAMIENTO..... e. PROBLEMAS DENTALES..... f. ENFERMEDAD CRONICA (Diabetes, epilepsia, asma, etc.)..... g. OTROS (Especifique):	1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2	9 9 9 9 9 9 9
468	<p><b>RESPONDEN <u>SI</u> A UNO O ALGUNOS SINTOMAS EN <u>466</u> Y RESPONDEN <u>NO</u> O <u>NS/NR</u> EN <u>467</u> ..... 1</b></p> <p><b>RESPONDEN <u>NO</u> O <u>NS/NR</u> A UNA O ALGUNAS ENFERMEDADES EN <u>466</u>, O RESPONDE <u>SI</u> EN <u>467</u> ..... 2</b></p> <p><b>RESPONDEN <u>SI</u> A UNO O ALGUNOS SINTOMAS EN <u>466</u> Y RESPONDEN <u>SI</u> A UNO O ALGUNOS ENFERMEDADES EN <u>467</u> ..... 3</b></p> <p><b>RESPONDEN <u>NO</u> O <u>NS/NR</u> A TODOS LOS SINTOMAS EN <u>466</u> Y <u>NO</u> O <u>NS/NR</u> A TODAS LAS ENFERMEDADES EN <u>467</u> ..... 4</b></p>		<p>---&gt; PASE A 471</p> <p>---&gt;PASE A 469</p> <p>---&gt;PASE A 469</p> <p>---&gt;PASE A 496 (PAGINA 23)</p>		

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA		
469	¿Cuál fue el problema o enfermedad más severo?	DIARREA..... 1-- OTRAS ENFERMEDADES INTESTINALES/ESTOMACALES ..... 2-- ENFERMEDADES DEL CORAZON..... 3-- ACCIDENTES O ENVENENAMIENTO ..... 4-- PROBLEMAS DENTALES ..... 5-- ENFERMEDAD CRONICA (Diabetes; epilepsia)6-- SINTOMAS RESPIRATORIOS (los de 466) .... 7-- OTRO ( <b>VEA 467</b> )..... 8--	--->470 ] --->471		
470	Durante la diarrea, ¿Ha tenido ( <b>NOMBRE</b> ) alguno de estos síntomas o molestias? ( <b>LEALE UNO A UNO</b> )	a. MOCO Y/O SANGRE..... b. PIEL RESECA Y/O ARRUGADA ..... c. OJOS HUNDIDOS Y SIN LAGRIMAS ..... d. LABIOS SECOS..... e. VOMITOS..... f. FONTANELA HUNDIDA (<1 año).....	SI 1 1 1 1 1 1	NO 2 2 2 2 2 2	NS/NR 9 9 9 9 9 9
471	¿Hace cuánto tiempo ocurrió el problema de salud por primera vez?	SEMANAS ..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> MESES ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AÑOS..... 3 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
472	¿Por cuánto tiempo durante las últimas <u>cuatro semanas</u> ha sufrido del problema de salud?	DIAS..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> SEMANAS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
473	¿Cuándo estaba con el problema de salud ( <b>NOMBRE</b> ) ¿Obtuvo atención de salud fuera de la casa, en su casa, o no obtuvo atención ?	ATENCION FUERA DE LA CASA..... 1 ATENCION EN LA CASA ..... 2-- NO OBTUVO ATENCION..... 3--	-> 482 -> 487		
474	¿Cuál fue el primer lugar que visitó donde obtuvo atención para ( <b>NOMBRE</b> ) y dónde queda?	NOMBRE: _____ DONDE QUEDA: _____			
475	¿Cuánto tiempo le tomó llegar al lugar donde ( <b>NOMBRE</b> ) obtuvo esa atención?	MINUTOS ..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HORAS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 9 99			
476	¿Cuánto le costó el transporte para llevar a ( <b>NOMBRE</b> ) a ese lugar?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA.....999999 NO TUVO QUE PAGAR.....000000			
477	¿Cuánto tiempo ( <b>NOMBRE</b> ) esperó para ser atendido en ese lugar?	MINUTOS ..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HORAS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/NO RECUERDA..... 9 99			

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
478	¿Por qué escogió Ud. ese lugar?	DISTANCIA..... 1 REPUTACION ..... 2 EXPERIENCIA PASADA ..... 3 SUGERENCIA DE OTRA PERSONA ..... 4 EN BUSQUEDA DE MEJOR CENTRO..... 5 PRECIO A PAGAR ..... 6 DISPONIBILIDAD ..... 7 TIENE SEGUROS ..... 8 OTRO _____ 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
479	¿Cuántas visitas hizo Ud. con ( <b>NOMBRE</b> ) a ese lugar? (total de visitas no solo durante las cuatro semanas)	NUMERO ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
480	¿Fue ( <b>NOMBRE</b> ) hospitalizado?	SI..... 1 NO..... 2-- NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9--	-->482 -->482
481	¿Por cuántos días estuvo hospitalizado?	1. DIAS..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. SEMANAS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
482	¿Quién le proporcionó a ( <b>NOMBRE</b> ) la atención médica?	MEDICO(A)..... 1 FARMACEUTICO(A) ..... 2 ENFERMERA ..... 3 AUXIL. ENFERMERIA..... 4 CURANDERO(A)..... 5 ELLA MISMA ..... 6-- OTRO _____ 8 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 9	-->488
483	¿Cuánto pagó Ud. para la atención médica de ( <b>NOMBRE</b> ), incluyendo honorarios del profesional que le atendió, medicamentos, etc.?	CANTIDAD EN GUARANIES ... <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9999999 NO TUVO QUE PAGAR ..... 0000000	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
484	¿Alguien distinto de su pareja le ayudó a cubrir los costos medicos totales?	SI..... 1 NO.....2-- NO SABE/ NO RECUERDA .....9--	->488 ->488
485	¿Quién pagó esa parte? <b>(ENTREVISTADORA: PUEDE ENCERRAR MÁS DE UNA RESPUESTA)</b>	a. UN PARIENTE .....1 b. UN AMIGO .....2 c. EMPLEADOR/PATRON.....3 d. SEGURO PRIVADO.....4 e. IPS.....5 f. OTROS:.....8	
486	¿Cuánto pagó (pagaron) esa(s) otra(s) persona(s) por la atención médica?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....9999999--	] > 488
487	¿ Por qué no obtuvo atención para aliviarle?	NO LO CONSIDERO NECESARIO..... 1 DEMASIADO LEJOS ..... 2 SERVICIOS MALOS..... 3 POR DESCUIDO ..... 4 FALTA DE DINERO..... 5 DEMASIADA OCUPADA..... 6 FALTA DE TRANSPORTE ..... 7 NADIE PODIA CUIDAR A LOS NINOS..... 8 MARIDOS/PARIENTES NO LE PERMITIERON ..... 9 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
488	¿Compró medicinas para tratar el problema de (NOMBRE)?	SI..... 1 NO.....2-- NO SABE/ NO RECUERDA .....9--	-->490 -->490
489	¿Cuánto pagó por los medicamentos ?	CANTIDAD EN GUARANIES ..... <input type="text"/> NO SABE/ NO RECUERDA ..... 999999	





Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
499c	¿Quién le acompañó (NOMBRE) para obtener la vacuna?	ELLA MISMA ..... 1-- OTRA PERSONA ..... 2 NO SABE ..... 9--	--->499f --->499f
499d	¿La persona perdió algún ingreso por acompañar a (NOMBRE)?	SI ..... 1 NO ..... 2-- NO SABE ..... 9--	--->499f --->499f
499e	¿Cuánto ingreso perdió?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO SABE ..... 9999999	
499f	¿Ud. perdió algún ingreso por acompañar a (NOMBRE)?	SI ..... 1 NO ..... 2-- NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9--	--->500 --->500 (próxima página)
499g	¿Cuánto ingreso perdió?	CANTIDAD EN GUARANIES ..... <input type="text"/> NO SABE/ NO RECUERDA ..... 999999	

## V. PLANIFICACION FAMILIAR

**Ahora le voy a hacer algunas preguntas acerca de la planificación familiar; es decir, de las cosas que usan las parejas para evitar que la mujer quede embarazada**

METODO	500 Conoce o ha oído hablar de..? (SI NO HA OÍDO, PASE A SIGUIENTE METODO)		501 Alguna vez ha usado? (SI NO HA USADO, PASE A SIGUIENTE METODO)		502 Usa actualmente? (últimos 30 días)	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO
1 Píldoras o pastillas anticonceptivas	1	2	1	2	1	2
2 DIU, espiral o T de Cobre	1	2	1	2	1	2
3 Condón o preservativo	1	2	1	2	1	2
4 Inyección anticonceptiva	1	2	1	2	1	2
5 Métodos vaginales (jaleas/espumas/diafragma/cremas/ovulos/ tabletas)	1	2	1	2	1	2
6 NORPLANT o implante	1	2	1	2	1	2
7 Esterilización femenina o ligadura	1	2	1	2	1	2
8 Vasectomía o esterilización masculina	1	2	1	2	1	2
9 Métodos Billings o moco cervical	1	2	1	2	1	2
10 Ritmo, calendario o control de la temperatura	1	2	1	2	1	2
11 Retiro (él se retira cuando va a terminar)	1	2	1	2	1	2
12 Yuyos o hierbas	1	2	1	2	1	2

**ENTREVISTADORA: SI EN 501-7 LA MUJER INDICA QUE HA USADO ESTERILIZACION (CODIGO 1), PONER TAMBIEN CODIGO 1 EN LA PREGUNTA 502-7 (USO ACTUAL)**

503	<p><b>ENTREVISTADORA: VEA PREGUNTAS 501 Y 502 Y MARQUE LO CORRESPONDIENTE</b></p> <p>LA ENTREVISTADA ESTA USANDO ALGUN METODO ACTUALMENTE.....1</p> <p>LA ENTREVISTADA NUNCA HA USADO METODOS .....2</p> <p>LA ENTREVISTADA HA USADO METODOS PERO NO USA ACTUALMENTE .....3</p>	<p>--&gt;526 (P. 30)</p> <p>--&gt;515 (P. 28)</p> <p>--&gt;504</p>
-----	---	--





**SOLAMENTE PARA ENTREVISTADAS QUE HAN USADO METODOS PERO NO USAN ACTUALMENTE Y ENTREVISTADAS QUE NUNCA USARON ANTICONCEPTIVOS**

515	<b>VEA EN 300 (PÁGINA 5) SI ESTA EMBARAZADA</b>	EMBARAZADA.....1--- NO EMBARAZADA .....2 NO SABE/ NO RECUERDA .....9	->520
516	¿Cree Ud. que puede quedar embarazada?	SI .....1--- NO .....2 NO SABE .....9---	->518 ->518
517	¿Cuál es la razón por la que cree que no puede quedar embarazada?	FUE OPERADA POR RAZONES MEDICAS Y NO PUEDE TENER MAS HIJOS .....1---- MENOPAUSIA.....2---- YA PASARON 2 AÑOS O MAS QUE ESTA QUERIENDO EMBARAZARSE SIN RESULTADO.....3----  SIN VIDA SEXUAL .....4---- AMAMANTAMIENTO/POSTPARTO .....5---- OTRA .....8---- (ESPECIFIQUE)	} > 600 (PAGINA 35) -> 520 -> 520 -> 518
518	¿Porqué no está usando Ud. algún método para evitar tener hijos actualmente?	DESEA EMBARAZO .....1--- POSTPARTO O AMAMANTAMIENTO ...2--- SIN VIDA SEXUAL .....3--- FATALISMO (NO VALE LA PENA) .....4--- MIEDO A EFECTOS COLATERALES ....5 TUVO EFECTOS COLATERALES .....6 NO TIENE DINERO PARA COMPRAR ..7 FALTA DE CONOCIMIENTO DE METODOS.....8 LE QUEDA LEJOS .....9 RAZONES RELIGIOSAS .....10 EL COMPAÑERO SE OPONE.....11 POR EDAD AVANZADA .....12---  NO LE GUSTA.....13--- DIFICULTAD DE USO.....14 MALA ATENCION .....15 RAZONES DE SALUD .....16 OTRA .....20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/ NO RESPONDE .....98	} > 520          -->600 (PAGINA 35) -->520
519	¿Desea Ud. usar algún método para evitar tener hijos actualmente?	SI .....1--- NO .....2 NO SABE/NO RESPONDE .....9	->522
520	¿En el futuro le gustaría usar algún método?	SI .....1 NO .....2---  NO SABE/NO RESPONDE .....9---	->600 (PAGINA 35) ->523

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
522	¿Cuál método preferiría o está pensando utilizar Ud. (o su pareja)?	PASTILLAS ..... 1 DIU ..... 2 CONDON ..... 3 INYECCION ..... 4 METODOS VAGINALES ..... 5 NORPLANT O IMPLANTE ..... 6 ESTERILIZACION FEMENINA ..... 7 VASECTOMIA ..... 8 METODO DE BILLINGS ..... 9 RITMO ..... 10 RETIRO ..... 11 YUYOS O HIERBAS ..... 12 NO SABE ..... 99	
523	¿Sabe dónde puede ir para conseguir métodos anticonceptivos para evitar tener hijos?	SI ..... 1 NO ..... 2-----	-->600 (PAGINA 35)
524	¿A qué lugar iría?	CLINICA DE LA FAMILIA-CEPEP ..... 1 CENTRO O PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO ..... 2 HOSPITAL MILITAR O POLICIAL ..... 3 HOSPITAL DE CLINICAS ..... 4 CRUZ ROJA ..... 5 HOSPITAL/CONSULTORIO IPS ..... 6 SANATORIO/HOSP.PRIVADO ..... 7 CLINICA O MEDICO PRIVADO ..... 8 PROMOTORA COMUNITARIA-CEPEP ..... 9 FARMACIA ..... 10 PARTERA ..... 11 IGLESIA ..... 12 MERCADO ..... 13 AMIGA/VECINA/PARIENTE ..... 14 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE)	
525	¿Cuánto tiempo tardaría Ud. normalmente para llegar desde aquí a ese lugar?	MINUTOS ..... 1 <input type="text"/> HORAS ..... 2 <input type="text"/> NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9    99	

**PASE A 600  
PAGINA 35**

**SOLO PARA ENTREVISTADAS QUE USAN ACTUALMENTE**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
526	<b>ENTREVISTADORA:  MARQUE EL METODO QUE USA  (VEA 502). SI ESTA UTILIZANDO MAS  DE UN METODO, MARQUE EL  METODO MAS EFECTIVO Y PONGA EL  CODIGO DEL SEGUNDO METODO EN  527, Y VUELVA A LAS  INSTRUCCIONES DE 526.</b>	PASTILLAS ..... 1---- DIU ..... 2---- CONDON..... 3---- INYECCION..... 4---- METODOS VAGINALES ..... 5---- NORPLANT O IMPLANTE ..... 6---- ESTERILIZACION FEMENINA..... 7---- VASECTOMIA ..... 8---- METODO DE BILLINGS..... 9---- RITMO ..... 10---- RETIRO..... 11---- YUYOS O HIERBAS..... 12----	} > 533 -> 528 -> 528 } > 532 --->533
527	SEGUNDO MÉTODO	PASTILLAS .....1 DIU .....2 CONDON.....3 INYECCION.....4 METODOS VAGINALES .....5 NORPLANT O IMPLANTE .....6 ESTERILIZACION FEMENINA.....7 VASECTOMIA .....8 METODO DE BILLINGS.....9 RITMO .....10 RETIRO.....11 YUYOS O HIERBAS.....12	
528	¿En qué mes y año le operaron (a Ud. o a él)?	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
529	¿Qué edad tenía cuando le operaron (a Ud. o a él)?	EDAD EN AÑOS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA .....99	
530	¿En qué lugar le hicieron la operación?	CLINICA DE LA FAMILIA-CEPEP ..... 1---- CENTRO O PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO..... 2---- HOSPITAL MILITAR O POLICIAL..... 3---- HOSPITAL DE CLINICAS ..... 4---- CRUZ ROJA ..... 5---- HOSPITAL/CLINICA DE IPS ..... 6---- SANATORIO/HOSP.PRIVADO ..... 7---- CLINICA O MEDICO PRIVADO ..... 8---- BRASIL..... 9---- ARGENTINA..... 10--- OTRO LUGAR..... 20---- (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 99----	} > 541 (PAGINA 32)

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
532	¿Dónde recibió orientación sobre (NOMBRE DEL METODO)?	CLINICA DE LA FAMILIA-CEPEP ..... 1 CENTRO O PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO ..... 2 HOSPITAL MILITAR O POLICIAL ..... 3 HOSPITAL DE CLINICAS ..... 4 CRUZ ROJA ..... 5 HOSPITAL/CONSULTORIO IPS ..... 6 SANATORIO/HOSP.PRIVADO ..... 7 CLINICA O MEDICO PRIVADO ..... 8 PROMOTORA COMUNITARIA-CEPEP ..... 9 IGLESIA ..... 10 ESPOSO/COMPAÑERO ..... 11 AMIGA/VECINA/PARIENTE ..... 12 COLEGIO/ESCUELA/FACULTAD ..... 13 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/ NO RECUERDA ..... 98	

**PASE A 544**  
**(PAGINA 33)**

533	¿Dónde obtiene el método anticonceptivo que usa?	CLINICA DE LA FAMILIA-CEPEP ..... 1-- CENTRO O PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO ..... 2-- HOSPITAL MILITAR O POLICIAL ..... 3-- HOSPITAL DE CLINICAS ..... 4-- CRUZ ROJA ..... 5-- HOSPITAL/CONSULTORIO IPS ..... 6-- SANATORIO/HOSP.PRIVADO ..... 7-- CLINICA O MEDICO PRIVADO ..... 8-- PROMOTORA COMUNITARIA-CEPEP ..... 9-- FARMACIA ..... 10-- PARTERA ..... 11-- IGLESIA ..... 12-- MERCADO ..... 13-- AMIGA/VECINA/PARIENTE ..... 14-- CURANDERO ..... 15-- BRASIL ..... 16-- ARGENTINA ..... 17-- MACATERO(AMBULANTE) ..... 18-- OTRO ..... 20-- (ESPECIFIQUE) PAREJA/MARIDO ..... 21-- PATIO DE SU CASA ..... 22-- NO SABE ..... 99--	--> 534 --> 534 } }> 538 } --> 534 } }> 538 } }>534 -->540 -->534 --->540 --->545 --->540
-----	--	--	---

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
534	¿Cuánto tiempo esperó para ser atendido?	MINUTOS ..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HORAS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....9 99	
535	¿Recibió consejos e información sobre diferentes opciones de anticonceptivos?	SI..... 1 NO..... 2 NO RECUERDA ..... 9	
536	¿La clinica (centro, puesto) estaba limpio y confortable?	SI..... 1 NO..... 2 NO RECUERDA ..... 9	
537	¿Siente que tuvo privacidad adecuada?	SI..... 1 NO..... 2 MÁS O MENOS ..... 3 NO SABE ..... 9	
538	¿Cuánto tiempo tarda Ud. normalmente para llegar desde aquí a ese lugar?	MINUTOS ..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> HORAS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....9 99	
539	¿Cuánto le costó el transporte al lugar de destino, la última vez que compró el método?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....999999 NO TUVO QUE PAGAR .....000000	
540	¿Cuánto pagó Ud. (o su pareja) por el método la última vez que compraron?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA .....999999 NO TUVO QUE PAGAR ..... 000000	
541	¿Alguien distinto de su pareja le ayudó a cubrir los costos medicos totales?	SI..... 1 NO..... 2-- NO SABE .....9--	--->544 --->544



Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
549	¿Porqué está usando el método actual en vez del que prefiere?	FALTA DE DINERO..... 1 ES MAS PRACTICO PARA ELLA ..... 2 ES MAS BARATO..... 3 SIN DIFICULTAD DE USO ..... 4 RECOMENDACION MEDICA..... 5 RECOMENDACION (AMIGA/PARIENTE)..... 6 RAZONES RELIGIOSAS ..... 7 FALTA DE TIEMPO ..... 8 PROTECCION DEL SIDA ..... 9 ES DEFINITIVO ..... 10 PIENSA QUE HACE DAÑO A LA SALUD/EFFECTOS COLATERALES/ RAZONES DE SALUD..... 11 NO QUIERE MAS HIJOS ..... 12 ES MAS SEGURO..... 13 DESCANSO..... 14 LACTANDO/POS-PARTO ..... 15 MENSTRUACION IRREGULAR ..... 16 NO CONFIA EN LOS CENTROS DE SALUD .. 17 ESTA PROBANDO ..... 18 MIEDO ..... 19 PAREJA NO QUIERE ..... 21 TIENE PROBLEMAS DE SALUD ..... 22 DESCUIDO/FALTA DE DECISION..... 23 DISPONIBILIDAD ..... 24 FALTA DE ORIENTACION/CONSULTA CON EL MEDICO ..... 25 MARIDO NO ESTA DE ACUERDO ..... 26 LIGADURA DESPUES PROXIMO PARTO ..... 27 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE ..... 99	
550	¿Cuál fue el primer método que Ud. o su pareja usó?	PASTILLAS..... 1 DIU..... 2 CONDON ..... 3 INYECCION ..... 4 METODOS VAGINALES ..... 5 ESTERILIZACION FEMENINA ..... 7 VASECTOMIA ..... 8 METODO DE BILLINGS ..... 9 RITMO ..... 10 RETIRO ..... 11 YUYOS O HIERBAS ..... 12 NO SABE/ NO RECUERDA..... 99	
551	¿Qué edad tenía cuando comenzó a usar ese primer método?	EDAD EN AÑOS..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/ NO RECUERDA ..... 99	
552	Cuando Ud. comenzó a usar el primer método, ¿Cuántos hijos vivos tenía?	N° DE HIJOS VIVOS ..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO RECUERDA ..... 99	

**VI. PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA		
600	<p align="center"><b>ENTREVISTADORA: VEA 502 CODIGO 7 U 8 (PÁGINA 25)</b></p> <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center; width:50%; border:none;"> <b>ESTERILIZADA</b>  <b>1</b>    <b>PASE A 603</b> </td> <td style="text-align:center; width:50%; border:none;"> <b>NO ESTERILIZADA</b>  <b>2</b>    <b>PASE A 601</b> </td> </tr> </table>			<b>ESTERILIZADA</b> <b>1</b>  <b>PASE A 603</b>	<b>NO ESTERILIZADA</b> <b>2</b>  <b>PASE A 601</b>
<b>ESTERILIZADA</b> <b>1</b>  <b>PASE A 603</b>	<b>NO ESTERILIZADA</b> <b>2</b>  <b>PASE A 601</b>				
601	<p><b>Ahora quisiera hacerle algunas preguntas sobre el futuro VEA 300 (PAGINA 5): NO EMBARAZADA O NO SABE</b>  ¿Quisiera tener un (otro) hijo o preferiría no tener (más) hijos?</p> <p><b>EMBARAZADA</b>  ¿Después del hijo que está esperando, quisiera tener otro hijo o preferiría no tener más hijos?</p>	<p>QUIERE HIJO..... 1</p> <p>NO QUIERE MAS HIJOS ..... 2----</p> <p>MENOPAUSICA (ESTERIL)..... 3----</p> <p>INDECISA O NO SABE ..... 9----</p>	<p align="right">} &gt; 608</p>		
602	<p><b>NO EMBARAZADA O NO SABE</b>  ¿Cuánto tiempo quisiera esperar antes del nacimiento de un (otro) hijo?</p> <p><b>EMBARAZADA</b>  ¿Cuánto tiempo quisiera esperar después del hijo que está esperando, antes de tener otro hijo?</p>	<p>MESES ..... 1 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>AÑOS..... 2 <input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/></p> <p>PRONTO/AHORA..... 9 90--</p> <p>MENOPAUSICA (ESTERIL)..... 9 94--</p> <p>OTRO _____..... 9 96--  (ESPECIFIQUE)</p> <p>NO SABE ..... 9 99--</p>	<p align="right">} &gt; 608</p>		
603	<p>¿Siente usted que se haya operado para no tener (más) hijos?</p>	<p>SI..... 1</p> <p>NO..... 2----</p>	<p align="right">-&gt;605</p>		
604	<p>¿Por qué lo siente?</p>	<p>MUJER QUIERE OTRO NIÑO ..... 1----</p> <p>ESPOSO QUIERE OTRO NIÑO ..... 2----</p> <p>EFFECTOS SECUNDARIOS ..... 3----</p> <p>OTRO _____..... 8----</p>	<p align="right">} &gt;608</p>		
605	<p>Dadas las presentes circunstancias, si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿cree usted que volvería a tomar la misma decisión de esterilizarse?</p>	<p>SI..... 1----</p> <p>NO..... 2----</p> <p>NO SABE ..... 9----</p>	<p align="right">} &gt;608</p>		

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
608	<p><b>VEA 317 (PAGINA 7)</b>  <b>TIENE HIJO(S)</b>  <b>VIVO(S)</b>  Si pudiera volver a la época en que todavía no tenía hijos y pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿Cuántos serían?</p> <p><b>NO TIENE HIJO(S)</b>  <b>VIVO(S)</b>  Si pudiera elegir exactamente el número de hijos que tendría en toda su vida, ¿Cuántos serían?</p> <p><b>ANOTE NUMERO U OTRA RESPUESTA</b></p>	NUMERO ..... L L L OTRA RESPUESTA ..... 20 (ESPECIFIQUE) NUNCA PENSÓ ..... 90 QUE DIOS QUIERA ..... 95 NO SABE ..... 99	
609	<b>VEA 600 SI LA MUJER ESTA ESTERILIZADA</b>	<b>SI</b> ..... 1--- <b>NO</b> ..... 2	--> 700 (PÁGINA 38)
610	<b>VEA 601 Y COPIE LA RESPUESTA</b>	<b>QUIERE HIJO</b> ..... 1--- <b>NO QUIERE MAS HIJOS</b> ..... 2 <b>MENOPAUSICA</b> ..... 3--- <b>INDECISA O NO SABE</b> ..... 4---	--> 700 (PÁGINA 38) --> 700 --> 700
611	¿Por qué no desea tener más hijos?	PROBLEMAS ECONOMICOS ..... 1 POR RAZONES DE SALUD..... 2 YA TIENE SUFICIENTES HIJOS ..... 3 SE SIENTE VIEJA ..... 4 SU TRABAJO NO LE PERMITE ..... 5 NO PUEDE ATENDER LOS HIJOS ..... 6 INESTABILIDAD CONYUGAL..... 7 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE ..... 99	
612	¿Estaría Ud. interesada en operarse para no tener más hijos?	<b>SI</b> ..... 1 <b>NO</b> ..... 2--- <b>NO SABE/ NO RECUERDA</b> ..... 9---	--> 614 --> 700 (PÁGINA 38)



**VII. ADULTAS JOVENES**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
700	ENTREVISTADORA: VEA 201 (PÁGINA 3) SI LA ENTREVISTADA TIENE ACTUALMENTE	15-24 AÑOS ..... 1 25-44 AÑOS ..... 2---	--> 800 (PAG. 44)
701	¿Has asistido a alguna lección, curso, charla sobre educación sexual en la escuela o colegio?	SI ..... 1 NO ..... 2 - NO SABE/NO RECUERDA..... 9 -	└─>705
702	¿Que edad tenías cuando recibiste el primer curso? (Si no recuerda, sondear edad)	EDAD ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/ NO RECUERDA..... 99	
703	¿En qué grado o año estabas cuando recibiste ese primer curso, charla o lección?	<p align="center">NIVEL .... GRADO</p> PRIMARIO ..... 1 ..... 1 2 3 4 5 6 SECUNDARIO ..... 2 ..... 1 2 3 4 5 6 FORMAC.DOCENTE .3 ..... 1 2 3 4 5 6 SUPERIOR ..... 4 ..... 1 2 3 4 5 6+ NO RECUERDA..... 9 ..... 9	
704	¿En esa lección, curso o charla se comentó algo sobre:  (LEA ALTERNATIVAS)	<p align="right"><b>SI NO NS</b></p> a. DESARROLLO DEL CUERPO EN LA PUBERTAD (cambios externos del cuerpo) ..... 1 2 8 b. APARATO REPRODUCTOR FEMENINO ..... 1 2 8 c. APARATO REPRODUCTOR MASCULINO..... 1 2 8 d. MENSTRUACION O REGLA ..... 1 2 8 e. EMBARAZO Y EL PARTO..... 1 2 8 f. RELACIONES SEXUALES ..... 1 2 8 g. ENFERMEDADES VENEREAS..... 1 2 8 h. METODOS ANTICONCEPTIVOS..... 1 2 8 i. EL SIDA ..... 1 2 8	
705	¿Has participado en un curso o charla sobre educación sexual fuera de la escuela/colegio?	- SI..... 1 - NO ..... 2 --- - NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9 ---	└─>709
706	¿Qué institución lo dió? (SI MAS DE UNO, EL PRIMERO)	ONG ..... 1 IGLESIA ..... 2 MSP..... 3 INSTIT. EDUCATIVAS ..... 4 INSTIT./PROFESIONAL DE SALUD ..... 5 CEPEP ..... 6 SECRETARIA DE JUVENTUD ..... 7 MUNICIPALIDAD ..... 8 OTRO: ..... 20 NO SABE/NO RECUERDA..... 99	
707	¿Qué edad tenías cuando participaste la primera vez?	EDAD ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/ NO RECUERDA..... 99	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
708	¿En ese encuentro, curso o charla se comentó algo sobre:  <b>(LEA ALTERNATIVAS)</b>	<p style="text-align: right;"><b>SI NO NS</b></p> a. DESARROLLO DEL CUERPO EN LA PUBERTAD (cambios externos del cuerpo) ..... 1 2 8 b. APARAT. REPRODUCTOR FEMENINO ..... 1 2 8 c. APARAT. REPRODUCTOR MASCULINO ..... 1 2 8 d. MENSTRUACION O REGLA ..... 1 2 8 e. EMBARAZO Y EL PARTO ..... 1 2 8 f. RELACIONES SEXUALES ..... 1 2 8 g. ENFERMEDADES VENEREAS ..... 1 2 8 h. METODOS ANTICONCEPTIVOS ..... 1 2 8 i. EL SIDA ..... 1 2 8	

**AHORA VAMOS A HABLAR DE ENFERMEDADES SEXUALMENTE TRANSMISIBLES. ESTO ES QUE SE TRANSMITEN A TRAVES DE LAS RELACIONES SEXUALES.**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
709	Conoces o has oído hablar de:  <b>(LEA ALTERNATIVAS)</b>	<p style="text-align: right;">SI NO NS</p> a. SIFILIS ..... 1 2 8 b. GONORREA ..... 1 2 8 c. SIDA ..... 1 2 8 d. FLUJO VAGINAL ..... 1 2 8	

**AHORA NOS GUSTARIA HACERTE ALGUNAS PREGUNTAS PERSONALES Y QUE SON DE MUCHA IMPORTANCIA PARA NUESTRO ESTUDIO**

710	¿En qué mes y año tuviste tu primera relación sexual?	<p style="text-align: right;">MES</p> <p style="text-align: center;">AÑO</p> <p style="text-align: center;">_ _ _      _ _ _</p> NUNCA HA TENIDO ..... 2222----- NO RECUERDA ..... 9999	--> 729 (PÁGINA 43)
711	¿Qué edad tenías cuando tuviste tu primera relación sexual?	EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS ..... _ _ _ NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
712	¿Qué edad tenía la persona con quién tuviste esa relación?	EDAD EN AÑOS CUMPLIDOS ..... _ _ _ NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
713	¿Cuál era la relación con esa persona <u>en esa época</u> ?	ESPOSO/COMPAÑERO ..... 1 NOVIO ..... 2 AMIGO ..... 3 PARIENTE ..... 4 EXTRAÑO/RECIEN CONOCIDO ..... 5 VIOLACION ..... 6--- OTRO _____ ..... 20 (ESPECIFIQUE)	--> 721 (PÁGINA 42)

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
714	¿Cuánto tiempo hacía que conocías a esa persona con la que tuviste tu primera relación sexual?	MESES..... 1 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> AÑOS ..... 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO SABE/ NO RECUERDA..... 9 99	
715	¿Habías asistido a algún curso, charla o conferencia sobre educación sexual antes de tu primera relación sexual?	SI ..... 1 NO ..... 2 NO SABE/ NO RECUERDA..... 9 --	-->721
716	¿Usaste o usó la persona con la que tuviste tu primera relación sexual algún método para evitar tener hijos?	SI ..... 1-- NO ..... 2 NO RECUERDA/NO SABE ..... 9--	-> 718 --> 721
717	¿Por qué no usaron algún método para evitar tener hijos en esa primera relación?	NO ESPERABA TENER RELACIONES .1 --- NO CONOCIA NINGUN METODO ..... 2 --- LOS ANTICONCEPTIVOS HACEN MAL A LA SALUD..... 3 --- QUERIA TENER UN HIJO ..... 4 --- RELACIONES NO SATISFACTORIAS CUANDO SE USAN ANTICONCEPTIVOS ..... 5 --- QUERIA USAR PERO NO CONSIGUIO 6 --- OPOSICION DE LA PAREJA..... 7 --- PENSABA QUE NO PODIA EMBARAZARSE ..... 8-- NO TENIA DINERO .....9 --- FUE UNA RELACION HOMOSEXUAL.10 --- LE DABA VERGUENZA COMPRARLO11 --- ES RESPONSABILIDAD DE SU PAREJA .....12 --- OTRO.....20 --- (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA.....99 ---	} -> 721

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
718	¿Cuál fue el método que usaste tú o tu pareja en tu primera relación sexual?	PASTILLAS ..... 1 DIU/ESPIRAL/T DE COBRE ..... 2 CONDON..... 3 INYECCION..... 4 METODOS VAGINALES ..... 5 VASECTOMIA ..... 8 METODO BILLINGS..... 9 RITMO ..... 10 RETIRO ..... 11 YUYOS O HIERBAS ..... 12 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO RECUERDA ..... 99	
719	¿Quién te orientó en el uso de ese método (cómo supo sobre ese método)?	COMPAÑERO(A)/MARIDO/NOVIO ..... 1 MEDICO ..... 2 ENFERMERO..... 3 FARMACEUTICO..... 4 PADRES/PARIENTE ..... 5 AMIGO(A)..... 6 PROFESOR ..... 7 CURSOS MATRIMONIALES ..... 8 LIBROS/REVISTAS ..... 9 ELLA MISMA ..... 10 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
720	¿Donde tú o tu pareja consiguió ese primer método?  (EN CASO DE USAR UN METODO TRADICIONAL (RITMO, RETIRO, O BILLINGS) PREGUNTAR DONDE RECIBIO ORIENTACION O QUIEN LA ORIENTO)	CLINICA DE LA FAMILIA-CEPEP ..... 1 CENTRO O PUESTO DE SALUD DEL MINISTERIO..... 2 HOSPITAL MILITAR O POLICIAL ..... 3 HOSPITAL DE CLINICAS ..... 4 CRUZ ROJA ..... 5 HOSPITAL/CONSULTORIO IPS ..... 6 SANATORIO/HOSP. PRIVADO ..... 7 CLINICA O MEDICO PRIVADO ..... 8 PROMOTORA COMUNITARIA/CEPEP .... 9 FARMACIA ..... 10 PARTERA..... 11 IGLESIA..... 12 MERCADO ..... 13 AMIGA/VECINA/PARIENTE ..... 14 COLEGIO/UNIVERSIDAD ..... 15 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) PATIO/CASA/CAMPO..... 21 PAREJA/MARIDO ..... 22 NO SABE/NO RECUERDA..... 99	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
721	¿En tu opinión cuál es el método más apropiado para los jovenes de tu edad?	PASTILLAS ..... 1 DIU/ESPIRAL/T DE COBRE ..... 2 CONDON..... 3 INYECCION..... 4 METODOS VAGINALES ..... 5 VASECTOMIA ..... 8 METODO BILLINGS..... 9 RITMO ..... 10 RETIRO ..... 11 YUYOS O HIERBAS ..... 12 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE ..... 99	
722	¿Según tu opinión quién debe tomar la iniciativa de usar algún método anticonceptivos: el hombre o la mujer?	EL HOMBRE ..... 1 LA MUJER ..... 2 LOS DOS JUNTOS ..... 3 CUALQUIERA DE LOS DOS ..... 4 DEPENDE DE LAS CIRCUNSTANCIAS ... 5 NINGUNO DE LOS DOS ..... 6 NO SABE ..... 9	
723	¿Tuviste relaciones sexuales en las últimas 4 semanas?	SI ..... 1 -- NO ..... 2 NO RESPONDE ..... 9	-> 725
724	¿Y en los últimos 3 meses?	SI ..... 1-- NO ..... 2-- NO RESPONDE/ NO RECUERDA ..... 9--	-->726 J> 729
725	¿Cuántas veces has tenido relaciones en las últimas 4 semanas?	NÚ DE VECES ..... <input type="text"/> NO RESPONDE ..... 98 NO SABE/ NO RECUERDA ..... 99	
726	¿Qué relación tenía contigo la persona con la que tuviste tu última relación?	ESPOSO/COMPAÑERO..... 1 EX-ESPOSO/COMPAÑERO..... 2 NOVIO ..... 3 AMIGO ..... 4 PARIENTE ..... 5 EXTRAÑO/RECIEN CONOCIDO ..... 6 VIOLACION ..... 7-- OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE)	--> 729
727	¿Utilizaste o utilizó tu pareja algún método para evitar hijos la última vez?	SI ..... 1 NO ..... 2-- NO HA TENIDO OTRA RELACION ..... 3-- NO SABE/ NO RECUERDA..... 9--	] ->729

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
728	¿Qué método usaron?	PASTILLAS .....1 DIU/ESPIRAL/T DE COBRE .....2 CONDON .....3 INYECCION .....4 METODOS VAGINALES .....5 NORPLANT/ IMPLANTE .....6 ESTERILIZACION FEMININA .....7 VASECTOMIA .....8 METODO BILLINGS .....9 RITMO .....10 RETIRO .....11 YUYOS O HIERBAS .....12 OTRO .....20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA .....99	
729	¿Cuántos años tenías cuando te llegó la menstruación por primera vez?	EDAD 1ra. MENSTRUACION ..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> NO HA MENSTRUADO ..... 97 -- NO SABE/ NO RECUERDA ..... 99	->731
730	¿Cuando eso sucedió tú ya sabías lo que era la menstruación?	SI ..... 1 NO ..... 2 NO RECUERDA ..... 9	
731	¿Quién fué la primera persona que te explicó lo que era la menstruación?	PADRE Y MADRE ..... 1 PADRE ..... 2 MADRE ..... 3 HERMANO MAYOR ..... 4 HERMANA MAYOR ..... 5 OTRO PARIENTE ..... 6 AMIGO ..... 7 AMIGA ..... 8 PROFESOR(A) ..... 9 RELIGIOSO(A), MONJA, ETC ..... 10 ENCARGADA ..... 11 NUNCA LE EXPLICARON ..... 12 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO RECUERDA ..... 99	
732	¿Una mujer puede quedar embarazada la primera vez que tiene relaciones sexuales?	SI ..... 1 NO ..... 2 NO SABE ..... 9	
733	¿Es preferible que la mujer llegue virgen al matrimonio?	SI ..... 1 NO ..... 2 NO SABE ..... 9	
734	¿Es el hombre quien decide los hijos que debe tener la pareja?	SI ..... 1 NO ..... 2 NO SABE ..... 9	

**PASE A**  
**802**

**VIII. ACTIVIDAD SEXUAL Y NUPCIALIDAD**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
800	¿Ha tenido relaciones sexuales durante las últimas 4 semanas?	SI ..... 1 NO ..... 2-----	--> 802
801	¿Cuántas veces?	No. DE VECES..... <input type="text"/> NO RESPONDE ..... 98 NO SABE/ NO RECUERDA..... 99	
802	¿Cuándo empezó su última menstruación?	DIAS ATRAS .....1 <input type="text"/> SEMANAS ATRAS .....2 <input type="text"/> MESES ATRAS .....3 <input type="text"/> AÑOS ATRAS .....4 <input type="text"/> ANTES DEL ULTIMO NACIMIENTO O DEL EMBARAZO ACTUAL ..... 994 NUNCA MENSTRUO ..... 995 EN MENOPAUSIA ..... 996 NO RECUERDA..... 999	
803	¿Cuándo es más probable que la mujer pueda quedar embarazada durante el ciclo menstrual?  (ENTREGUELE LA TARJETA)	UNA SEMANA ANTES QUE LA MENSTRUACION COMIENZE ..... 1  DURANTE LA MENSTRUACION ..... 2  UNA SEMANA DESPUES QUE LA MENSTRUACION COMIENZE ..... 3  DOS SEMANAS DESPUES QUE LA MENSTRUACION COMIENZE ..... 4  TRES SEMANAS DESPUES QUE LA MENSTRUACION COMIENZE ..... 5  NO HAY DIFERENCIA, CUALQUIER TIEMPO ES IGUAL..... 6 NO SABE ..... 9	
804	¿Es Ud. unida, casada, viuda, separada, divorciada o soltera?	UNIDA ..... 1---- CASADA..... 2---- VIUDA ..... 3---- SEPARADA..... 4---- DIVORCIADA ..... 5---- SOLTERA..... 6	} -> 806
805	¿Ha estado Ud. casada o unida alguna vez?	SI ..... 1 NO ..... 2-----	-> 900 (P. 46)
806	¿En qué mes y año se casó/unió Ud. por primera vez?	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA..... 99	
807	¿Qué edad tenía Ud. la primera vez que se casó o unió?	EDAD EN AÑOS ..... <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA..... 99	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA																					
808	<b>ENTREVISTADORA: VEA 804</b>	ACTUALMENTE CASADA O UNIDA..... 1 OTRO ESTADO ..... 2---- SOLTERA..... 3----	] > 900																					
809	¿Cuál fue el grado más alto que su esposo o compañero aprobó y en qué nivel de estudios?	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>NIVEL</th> <th>GRADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NINGUNO</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRIMARIO</td> <td>1</td> <td>1 2 3 4 5 6 9</td> </tr> <tr> <td>SECUNDARIO</td> <td>2</td> <td>1 2 3 4 5 6 9</td> </tr> <tr> <td>FORMAC.DOCENTE</td> <td>3</td> <td>1 2 3 4 5 6 9</td> </tr> <tr> <td>SUPERIOR</td> <td>4</td> <td>1 2 3 4 5 6+ 9</td> </tr> <tr> <td>NO SABE</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		NIVEL	GRADO	NINGUNO	0	0	PRIMARIO	1	1 2 3 4 5 6 9	SECUNDARIO	2	1 2 3 4 5 6 9	FORMAC.DOCENTE	3	1 2 3 4 5 6 9	SUPERIOR	4	1 2 3 4 5 6+ 9	NO SABE	9	9	
	NIVEL	GRADO																						
NINGUNO	0	0																						
PRIMARIO	1	1 2 3 4 5 6 9																						
SECUNDARIO	2	1 2 3 4 5 6 9																						
FORMAC.DOCENTE	3	1 2 3 4 5 6 9																						
SUPERIOR	4	1 2 3 4 5 6+ 9																						
NO SABE	9	9																						
810	¿Trabaja su esposo o compañero actualmente en algo recibiendo pago en dinero o en otra forma?	SI ..... 1 NO ..... 2--	--> 812																					
811	¿En ese trabajo se desempeña como: (LEA LAS ALTERNATIVAS)	EMPLEADO/TRABAJADOR POR SUELDO O SALARIO ..... 1- JORNALERO ..... 2- PATRON O EMPLEADOR ..... 3- POR CUENTA PROPIA ..... 4- FAMILIAR CON REMUNERACION ..... 5- FAMILIAR SIN REMUNERACION ..... 6- OTRO: _____ ..... 8- (ESPECIFIQUE) NO SABE ..... 9-	] > 814																					
812	¿Su esposo o compañero buscó trabajo en la última semana?	SI ..... 1--- NO ..... 2 NO SABE ..... 9---	-->814 --> 814																					
813	¿Por qué su esposo o compañero no trabaja ni busca trabajo?	INCAPACIDAD FISICA ..... 1 NO NECESITA TRABAJAR ..... 2 AYUDA EN LA CASA ..... 3 NO LE GUSTA TRABAJAR ..... 4 CANSADO DE BUSCAR TRABAJO ..... 5 PROBLEMAS DE SALUD ..... 6 INTERFIERE ESTUDIOS..... 7 JUBILADO ..... 8 OTRO _____ ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE ..... 99																						
814	¿Ha conversado alguna vez con su esposo o compañero sobre el número de hijos que les gustaría tener?	SI ..... 1 NO ..... 2																						
815	¿Cree Ud. que su esposo o compañero quiere el mismo número de hijos que Ud., el quiere más o quiere menos hijos de los que Ud. quiere tener?	MISMO NUMERO DE HIJOS..... 1 MAS HIJOS ..... 2 MENOS HIJOS..... 3 NO SABE ..... 9																						

**IX. VIVIENDA**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
900	¿Qué parentesco o relación tiene Ud. con el jefe del hogar?	ELLA ES JEFE DEL HOGAR ..... 1 ESPOSA O COMPAÑERA ..... 2 HIJA ..... 3 HERMANA ..... 4 OTRO PARIENTE ..... 5 OTRO NO PARIENTE ..... 6 EMPLEADA DOMESTICA ..... 7 OTRO: ..... 8 (ESPECIFIQUE)	
901	¿Es esta vivienda propia, alquilada, cedida, prestada, u ocupa este hogar bajo otra condición?	PROPIA ..... 1 ARRENDADA/ALQUILADA ..... 2 GRATUITA O POR SERVICIO ..... 3 OTRA: ..... 8 (ESPECIFIQUE)	
902	¿De cuántas piezas dispone su vivienda para dormir?	NUMERO DE DORMITORIOS ..... <input type="text"/>	
903	¿Cuál es el principal combustible o energía que utilizan para cocinar?	GAS ..... 1 CARBON ..... 2 LEÑA ..... 3 ELECTRICIDAD ..... 4 KEROLEN,ALCOHOL,ETC ..... 5 NO COCINAN ..... 6 OTRA: ..... 8 (ESPECIFIQUE)	
904	¿Cuál es la fuente principal de abastecimiento de agua para uso doméstico?	AGUA DE TUBERIA EN LA CASA ..... 1 AGUA DE TUBERIA EN EL PATIO O LOTE ..... 2 CANILLA PUBLICA ..... 3 POZO CON BOMBA DE MANO ..... 4 POZO CON BOMBA ELECTRICA ..... 5 POZO SIN BOMBA DE MANO ..... 6 RIO,MANANTIAL,AGUA DE SUPERFICIE ..... 7 CAMION,TANQUE,OTRO VENDEDOR ..... 8 ALJIBE ..... 9 OTRA: ..... 8 (ESPECIFIQUE) NO SABE ..... 99	
905	¿Qué tipo de servicio sanitario/baño tiene este hogar?	BAÑO MODERNO CONECTADO A RED PUBLICA ..... 1 BAÑO MODERNO CON POZO CIEGO ..... 2 LETRINA TIPO MUNICIPAL ..... 3 LETRINA COMUN ..... 4 OTRA: ..... 8 (ESPECIFIQUE)	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA																
906	¿Tiene en su hogar? <b>LEALE UNA A UNA</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">SI</td> <td style="text-align: right;">NO</td> </tr> <tr> <td>a. ENERGIA ELECTRICA .....</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>b. TELEFONO .....</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>c. RADIO .....</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>d. VIDEO .....</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>e. TELEVISOR .....</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>f. HELADERA .....</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>g. LAVARROPA.....</td> <td>1 2</td> </tr> </table>	SI	NO	a. ENERGIA ELECTRICA .....	1 2	b. TELEFONO .....	1 2	c. RADIO .....	1 2	d. VIDEO .....	1 2	e. TELEVISOR .....	1 2	f. HELADERA .....	1 2	g. LAVARROPA.....	1 2	
SI	NO																		
a. ENERGIA ELECTRICA .....	1 2																		
b. TELEFONO .....	1 2																		
c. RADIO .....	1 2																		
d. VIDEO .....	1 2																		
e. TELEVISOR .....	1 2																		
f. HELADERA .....	1 2																		
g. LAVARROPA.....	1 2																		
907	¿Algún miembro de su vivienda tiene?: <b>LEALE UNA A UNA</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">SI</td> <td style="text-align: right;">NO</td> </tr> <tr> <td>a. AUTO PARTICULAR.....</td> <td>1 2</td> </tr> <tr> <td>b. MOTOCICLETA.....</td> <td>1 2</td> </tr> </table>	SI	NO	a. AUTO PARTICULAR.....	1 2	b. MOTOCICLETA.....	1 2											
SI	NO																		
a. AUTO PARTICULAR.....	1 2																		
b. MOTOCICLETA.....	1 2																		

**SOLO PARA LAS ENTREVISTADAS QUE VIVEN EN LOS DEPARTAMENTOS DE MISIONES, CENTRAL, Y CORDILLERA**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
908	<b>FILTRO: RESIDENCIA ACTUAL</b>	<b>VIVE EN DEPTO. CORDILLERA (4), MISIONES (9), o CENTRAL (12)..... 1</b>  <b>VIVE EN OTRO DEPTO..... 2---</b>	<b>---&gt;1200 (PÁGINA 57)</b>
909	¿Cuántos son los ingresos mensuales totales del hogar?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ _ "/> NO SABE..... 9999999	
910	¿Cuántos son los gastos mensuales totales del hogar?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ _ "/> NO SABE..... 99999999	
911	¿Cuántos son los gastos semanales en alimentos y bebidas?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ _ "/> NO SABE/NO RECUERDA..... 9999999	
912	¿Cuántos son los gastos semanales en transporte público?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text" value=" _ _ _ _ _ _ _ _ "/> NO GASTA NADA..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA..... 9999999	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
913	VEA 903	USAN CARBON (2)/LEÑA (3)..... 1 NO USAN CARBON/LEÑA ..... 2---	--->915
914	¿Cuántos son los gastos semanales en leña/carbon?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO GASTA NADA..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA..... 9999999	
915	¿Cuántos son los gastos mensuales en el combustible o energía que utiliza para cocinar?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO GASTA NADA..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA..... 9999999	
916	VEA 907	TIENE AUTO o MOTOCICLETA..... 1 NO TIENE AUTO o MOTOCICLETA ..... 2---	--->921
917	¿Cuántos son los gastos semanales en gasolina?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO GASTA NADA..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA..... 9999999	
918	¿Cuánto ha gastado en mantenimiento del vehiculo en el último año?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO GASTÓ NADA ..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA..... 9999999	
919	¿Ha comprado algún miembro del hogar un vehiculo en los últimos 12 meses?	SI .....1 NO ..... 2---	--->921
920	¿Cuánto le costó en los últimos 12 meses?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA..... 9999999	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
921	VEA 906a.	TIENE ENERGIA ELECTRICA..... 1 NO TIENE ENERGIA ELECTRICA ..... 2--	--->923
922	¿Cuántos son los gastos mensuales en energía eléctrica?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO GASTA NADA ..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA ..... 9999999	
923	¿Cuántos son los gastos mensuales de agua para el uso domestico?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO GASTA NADA ..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA ..... 9999999	
924	VEA 906b.	TIENE TELEFON O..... 1 NO TIENE TELEFONO ..... 2--	--->926
925	¿Cuántos son los gastos mensuales en teléfono?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO SABE..... 9999999	
926	¿Cuántos son los gastos mensuales en vivienda? (ALQUILER O PRESTAMOS)	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO TIENE GASTOS ..... 0000000 NO SABE..... 9999999	
927	¿Cuánto ha gastado los miembros del hogar en la compra de ropa durante los últimos seis meses?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO GASTÓ NADA..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA ..... 9999999	
928	¿Cuántos son los gastos anuales de educación de la familia?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO GASTÓ NADA..... 0000000 NO SABE/NO RECUERDA ..... 9999999	
929	¿Ha comprado algún miembro del hogar algún electrodoméstico (heladera, televisor, etc.) o muebles (cama, ropero, mesa, etc.) en los últimos seis meses?	SI ..... 1 NO ..... 2--	--->1000
931	¿Cuánto le costó en los últimos seis meses?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 9999999	

**X. CONDICIONES DE SALUD Y USO DE SERVICIOS PARA LOS DE 6 AÑOS O MAS**

Información Personal de los miembros del Hogar

1000. Residentes habituales en la vivienda (SOLAMENTE 6 AÑOS O MAS)	a. Relación con el jefe de hogar	b. Edad	c. Sexo	d. Estado Civil	e. Educación	f. Seguro médico	g. Estado de salud	h. Enfermedades Recientes	i. Numeración de personas con respuesta "Si" en 1000h
Por favor dígame el nombre de las personas que habitualmente viven en esta vivienda en orden de mayor a menor.	¿Cuál es la relación de (NOMBRE) con el jefe de hogar?	¿Qué edad cumplió en su último cumpleaños	¿Es (NOMBRE) hombre o mujer?	¿Es (NOMBRE) casado, separado, viudo, divorciado, soltero?	¿Cuál fue el grado más alto que (NOMBRE) aprobó y en qué nivel de estudio?	¿Tiene (NOMBRE) Seguro médico?	¿Cómo describiría Ud. la condición de salud de esta persona en los últimos 6 meses?	¿Durante las últimas 4 semanas ha tenido (NOMBRE) algún malestar, enfermedad, accidente, o problema de dental, en general cualquier problema de salud?	Numera 1 hasta X las personas enfermas
01.	<input type="checkbox"/>	____	H M 1 2	<input type="checkbox"/>	Nivel Grado ____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sí No 1 2	
02.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
03.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
04.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
05.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
06.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
07.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
08.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
09.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
10.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
11.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
12.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
13.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	
14.	<input type="checkbox"/>	____	1 2	<input type="checkbox"/>	____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 2	

**a. Relación con jefe de hogar:**

Ella es jefe de hogar	1
Esposa o compañera	2
Hija/Hijo	3
Hermana/o	4
Otro pariente	5
Otro no pariente	6
Empleada domestica	7
Otro	8
No Sabe	9

**d. Estado Civil**

Unido(a)	1
Casado(a)	2
Viudo(a)	3
Separado(a)	4
Divorciado(a)	5
Soltero(a)	6
No Sabe	9

**e. Educación**

Ninguno	0
Primario	1
Secundario	2
Formac. Docente	3
Superior	4
No Sabe	9

Nivel	Grado
0	0
1	123456 9
2	123456 9
3	123456 9
4	123456+ 9
9	9

**f. Seguro Médico**

IPS	1
Privado	2
Ambos	3
No	4
No Sabe	9

**g. Estado de Salud**

Muy Bueno	1
Bueno	2
Regular	3
Maló	4

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1001	VEA CUADRO ANTERIOR (1000)	NO HAY PERSONA ENFERMA..... 1-- HAY PERSONA(S) ENFERMA(S)..... 2--	--->1100 (Página 57) ->Cuadro de selección (abajo)

CUADRO PARA SELECCION DEL ENFERMO(A) A INVESTIGAR						
ULTIMO DIGITO DEL NUMERO DEL CUESTIONARIO	NUMERO DE ENFERMOS LISTADOS					
	1	2	3	4	5	6
0	1	2	2	4	3	5
1	1	1	3	1	4	6
2	1	2	1	2	5	1
3	1	1	2	3	1	2
4	1	2	3	4	2	3
5	1	1	1	1	3	4
6	1	2	2	2	4	5
7	1	1	3	3	5	6
8	1	2	1	4	1	1
9	1	1	2	1	2	2

1002 Total de enfermos listados	<input type="text"/>
1002A Numero de enfermo seleccionado:	<input type="text"/>
NOMBRE DE ENFERMO	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA		
1003	<b>SELECCIÓN DE ENFERMO(A)</b>	ENTREVISTADA ..... 1-- OTRA PERSONA ..... 2	--> 1005		
1004	¿Que hace (NOMBRE)?  (LEALE UNO A UNO)	TRABAJA FUERA DE CASA? ..... 1 TRABAJA EN EL HOGAR? ..... 2 NO TRABAJA..... 3 ESTUDIA..... 4 ESTUDIA Y TRABAJA..... 5 NO SABE ..... 6			
1005	¿Cuál fue el (los) problema(s) de salud que (usted / NOMBRE) sufrió? (LEALE UNO A UNO)	a. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS..... b. ENFERMEDADES INTESTINALES/ESTOMACALES ..... c. ENFERMEDADES DEL CORAZON ..... d. ACCIDENTES O ENVENENAMIENTO ..... e. PROBLEMAS DENTAL..... f. ENFERMEDAD CRONICA (Diabetes, alcoholismo, epilepsia, hipertensión) ..... g. PROBLEMAS GINECOLOGICOS ..... h. OTROS _____ ..... (ESPECIFIQUE)	SI 1	NO 2	NS 9
1005L	<b>FILTRO</b>	SI SE REPORTA SOLA UNA ENFERMEDAD EN P. 1005..... 1 SI SE REPORTAN MÁS DE UNA ENFERMEDAD EN P.1005..... 2	--> 1006 --> 1005M		
1005M	¿Cuál fue el problema o enfermedad <u>más</u> <u>severo</u> ?	ENFERMEDADES RESPIRATORIAS..... 1 ENFERMEDADES INTESTINALES/ESTOMACALES ..... 2 ENFERMEDADES DEL CORAZON ..... 3 ACCIDENTES O ENVENENAMIENTO ..... 4 PROBLEMAS DENTAL..... 5 ENFERMEDAD CRONICA (Diabetes, alcoholismo, epilepsia, hipertensión) ..... 6 PROBLEMAS GINECOLOGICOS ..... 7 OTROS _____ ..... 8 (ESPECIFIQUE)			
1006	Cuándo estuvo enferma(o) ¿Faltó a sus actividades normales ?	SI..... 1 NO ..... 2--	-->1008		
1007	¿Cuántos días faltó a sus actividades normales ?	DIAS..... <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/ RECUERDA..... 99			
1008	<b>SELECCIÓN DE ENFERMO(A)</b>	ENTREVISTADA ..... 1 OTRA PERSONA ..... 2 --	--> 1014		

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1009	¿Quién cuidó/atendió a Ud. durante la enfermedad?	ELLA MISMA..... 1-- OTRA PERSONA ..... 2 NO SABE/NO RECUERDA ..... 9--	--> 1012 --> 1012
1010	¿La persona perdió algún ingreso por cuidar/atender (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2-- NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9--	--->1012 --->1012
1011	¿Cuánto ingreso perdió?	CANTIDAD EN GUARANIES .                     NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9999999	
1012	¿Ud. perdió algún ingreso durante la enfermedad?	SI..... 1 NO..... 2-- NO SABE/NO RECUERDA ..... 9--	--->1021 --->1021
1013	¿ Cuánto ingreso perdió?	CANTIDAD EN GUARANIES                     - NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9999999-	└─> 1021
1014	¿Quién cuidó/atendió a (NOMBRE) durante la enfermedad?	ELLA MISMA (ENTREVISTADA) ..... 1-- OTRA PERSONA ..... 2 NADIE ..... 3-- NO SABE/NO RECUERDA ..... 9--	--> 1017 --> 1019 --> 1019
1015	¿La persona perdió algún ingreso por cuidar/atender (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2-- NO SABE/NO RECUERDA ..... 9--	--->1019 --->1019
1016	¿ Cuánto ingreso perdió?	CANTIDAD EN GUARANIES                     - NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9999999-	└─> 1019
1017	¿Ud. perdió algún ingreso por acompañar a (NOMBRE)?	SI..... 1 NO..... 2-- NO SABE/NO RECUERDA ..... 9--	--->1019 --->1019
1018	¿ Cuánto ingreso perdió?	CANTIDAD EN GUARANIES                     NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9999999	
1019	¿La persona enferma perdió algún ingreso durante la enfermedad?	SI..... 1 NO..... 2-- NO SABE/NO RECUERDA ..... 9--	-->1021 -->1021
1020	¿Cuánto ingreso perdió?	CANTIDAD EN GUARANIES                     NO SABE/ NO RECUERDA ..... 9999999	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1021	¿Hace cuánto tiempo ocurrió el problema de salud por primera vez?	1. DIAS..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. SEMANAS..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 3. MESES..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 4. AÑOS..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 9. NO SABE/ RECUERDA..... 99	
1022	¿Por cuánto tiempo durante las últimas cuatro semanas ha sufrido del problema de salud?	1. DIAS..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 2. SEMANAS..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/ RECUERDA..... 99	
1023	Cuando estaba con el problema de salud (usted / <b>NOMBRE</b> ) ¿Obtuvo atención de salud fuera de la casa, en su casa, o no obtuvo atención ?	ATENCION FUERA DE LA CASA ..... 1 ATENCION EN LA CASA ..... 2-- NO OBTUVO ATENCION ..... 3--	-->1032 (PAGINA 55) -->1037 (PAGINA 56)
1024	¿Cuál fue el primer lugar que visitó (Ud./ <b>NOMBRE</b> ) donde obtuvo atención y dónde queda?	NOMBRE: _____ DONDE QUEDA: _____	
1025	¿Cuánto tiempo le tomo a (usted/ <b>NOMBRE</b> ) llegar al lugar dónde obtuvo esa atención?	MINUTOS.....1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> HORAS.....2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA .....9 99	
1026	¿Cuánto le costó a (usted/ <b>NOMBRE</b> ) el transporte para llegar a ese lugar de destino?	CANTIDAD EN GUARANIES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 999888 NO TUVO QUE PAGAR ..... 000000	
1027	¿Cuánto tiempo (usted/ <b>NOMBRE</b> ) esperó para ser atendido en ese lugar?	MINUTOS.....1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> HORAS.....2 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA .....9 99	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1028	¿Por qué (usted/ <b>NOMBRE</b> ) escogio ese lugar?	DISTANCIA ..... 1 REPUTACION ..... 2 EXPERIENCIA PASADA ..... 3 SUGERENCIA DE OTRA PERSONA..... 4 EN BUSQUEDA DE MEJOR CENTRO ..... 5 PRECIO A PAGAR ..... 6 DISPONIBILIDAD ..... 7 TIENE SEGUROS ..... 8 OTRO: ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
1029	¿Cuántas visitas hizo (usted/ <b>NOMBRE</b> ) a ese lugar? (total de visitas no sólo durante las cuatro semanas)	NUMERO ..... <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA ..... 99	
1030	¿Fue (usted/ <b>NOMBRE</b> ) hospitalizado?	SI.....1 NO.....2-- NO SABE/NO RECUERDA .....9--	└─> 1032
1031	¿Por cuántos días estuvo hospitalizado?	1. DIAS..... <input type="text"/> <input type="text"/> 2. SEMANAS ..... <input type="text"/> <input type="text"/>	
1032	¿Quién le proporcionó (usted/ <b>NOMBRE</b> ) la atención médica?	MEDICO(A) ..... 1 ENFERMERA ..... 2 AUXI. ENFERMERA ..... 3 FARMACEUTICO(A) ..... 4 CURANDERO(A) ..... 5 PERSONA ENFERMA.....6-- FAMILIAR.....7-- OTRO .....8 (ESPECIFIQUE) NO SABE/NO RECUERDA ..... 9	-->1037 -->1037
1033	¿Cuánto pagó (usted/ <b>NOMBRE</b> ) por la atención médica (incluyendo medicinas)?	CANTIDAD EN GUARANIES. <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE ..... 9999999 NO TUVO QUE PAGAR ..... 0000000--	-->1037
1034	¿Alguien distinto de su pareja/padres le ayudó a cubrir los costos medicos totales?	SI..... 1 NO.....2-- NO SABE ..... 9--	└─> 1037

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1035	¿Quién pagó esa parte? <b>(ENTREVISTADORA: PUEDE ENCERRAR MAS QUE UNA RESPUESTA)</b>	a. UN PARIENTE .....1 b. UN AMIGO .....2 c. EMPLEADOR/PATRON.....3 d. SEGURO PRIVADO .....4 e. SEGURO SOCIAL (IPS) .....5 f. OTROS .....6 (ESPECIFIQUE)	
1036	¿Cuánto pagó/pagaron esa(s) otra(s) parte(s) (terceros) por la atención médica?	CANTIDAD EN GUARANIES. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] NO SABE/NO RECUERDA .....9999999	]-> 1038
1037	¿ Por qué no obtuvo atención para aliviarle?	NO LO CONSIDERO NECESARIO ..... 1 DEMASIADO LEJOS ..... 2 SERVICIOS MALOS ..... 3 POR DESCUIDO ..... 4 FALTA DE DINERO ..... 5 DEMASIADA OCUPADA ..... 6 FALTA DE TRANSPORTE ..... 7 NADIE PODIA CUIDAR A LOS NINOS ..... 8 MARIDOS/PARIENTES NO LE PERMITIERON ..... 9 OTRO ..... 20 (ESPECIFIQUE) NO SABE ..... 99	
1038	¿Compró (Ud./NOMBRE) medicinas?	SI .....1 NO .....2-- NO SABE .....9--	-->1040 -->1040
1039	¿Cuánto pagó (Ud./NOMBRE) por los medicamentos ?	CANTIDAD EN GUARANIES ..... [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] NO SABE/NO RECUERDA ..... 999999	
1040	¿Cómo ha cambiado el estado de salud de (Ud./NOMBRE) después del problema de salud?	NO HA CAMBIADO..... 1 HA MEJORADO .....2 HA EMPEORADO .....3 NO SABE/NO RECUERDA .....9	

**XI. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE SALUD**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1100	¿Cuál es el centro de atención de salud que utiliza con más frecuencia?	NOMBRE DEL LUGAR: _____  DONDE QUEDA: _____	
1101	¿Es este centro de atención el más cercano a su hogar?	SI ..... 1--- NO ..... 2	--->1200
1102	¿Cuál es el centro de atención de salud más cercano?	NOMBRE DEL LUGAR: _____  DONDE QUEDA: _____	
1103	¿Por qué no utiliza con más frecuencia el centro de atención de salud más cercano?	HORARIO INCONVENIENTE ..... 1 NO OFRECEN SERVICIOS ..... 2-- MALA ATENCION/BAJA CALIDAD DE SERVICIOS ..... 3-- ESCASEZ DE MATERIALES ..... 4-- DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL MEDICO ..... 5-- MUY CARO ..... 6-- TIENE SEGUROS ..... 7-- OTRO ..... 8--	} > 1200
1104	¿Por qué no considera conveniente el horario del centro más cercano?	NO ESTA ABIERTO LOS FINES DE SEMANA .....1 NO ABRE EN HORARIOS NOCTURNOS .....2 ABIERTO CUANDO YO TRABAJA .....3 OTRAS RAZONES (ESPECIFIQUE): _____.....8	

**XII. MALTRATOS PSICOFISICOS**

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1200	Pensando en su niñez o adolescencia. ¿Alguna vez vió o escuchó a sus padres o padrastros maltratarse físicamente?	SI.....1 NO.....2 NO RESPONDE .....3 NO SABE/NO RECUERDA. ....9	
1201	¿Recuerda usted haber recibido maltratos físicos de alguna persona?	SI..... 1 NO..... 2-- NO RESPONDE ..... 3 NO SABE/NO RECUERDA. .... 9	→ 1204
1202	¿Cuántos años tenía usted la primera vez que alguien le maltrató físicamente?	AÑOS..... <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA .....98	
1203	¿En qué mes y año alguien le maltrató físicamente por última vez?	MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> NO SABE/NO RECUERDA .....98	

**AHORA ME GUSTARIA PREGUNTARLE SOBRE ASPECTOS DE LA RELACION DE PAREJA. TAMBIEN QUISIERA ASEGURARLE QUE SUS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES.**

1204	<b>FILTRO (VEA 804; PAG.44)</b>	<b>SI LA MUJER NUNCA HA ESTADO CASADA/UNIDA-----1</b> <b>SI LA MUJER ESTA CASADA/UNIDA ACTUALMENTE -----2</b> <b>SI LA MUJER ESTUVO CASADA/UNIDA PREVIAMENTE -----3</b>	<b>→1208</b> <b>→1205A</b> <b>→1205B</b>																																										
1205A	Quien toma/tomaría la decisión en su casa -- <b>Usted, su esposo/compañero, ambos de acuerdo, u otra persona</b> -- sobre lo siguiente?	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ella</th> <th>Esposo/ comp.</th> <th>Ambos</th> <th>Otro</th> <th>NS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A) VISITAS FAMILIARES....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>B) ALIMENTOS QUE COCINAR DIARIAMENTE .....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>C) CUANDO UN HIJO NECESITA IR AL MEDICO.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>D) COMO DISCIPLINAR LOS HIJOS.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>E) USO DE ANTICONCEPTIVOS....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>F) COMO GASTAR EL INGRESO DE LA FAMILIA.....</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>		Ella	Esposo/ comp.	Ambos	Otro	NS	A) VISITAS FAMILIARES....	1	2	3	8	9	B) ALIMENTOS QUE COCINAR DIARIAMENTE .....	1	2	3	8	9	C) CUANDO UN HIJO NECESITA IR AL MEDICO.....	1	2	3	8	9	D) COMO DISCIPLINAR LOS HIJOS.....	1	2	3	8	9	E) USO DE ANTICONCEPTIVOS....	1	2	3	8	9	F) COMO GASTAR EL INGRESO DE LA FAMILIA.....	1	2	3	8	9	
	Ella	Esposo/ comp.	Ambos	Otro	NS																																								
A) VISITAS FAMILIARES....	1	2	3	8	9																																								
B) ALIMENTOS QUE COCINAR DIARIAMENTE .....	1	2	3	8	9																																								
C) CUANDO UN HIJO NECESITA IR AL MEDICO.....	1	2	3	8	9																																								
D) COMO DISCIPLINAR LOS HIJOS.....	1	2	3	8	9																																								
E) USO DE ANTICONCEPTIVOS....	1	2	3	8	9																																								
F) COMO GASTAR EL INGRESO DE LA FAMILIA.....	1	2	3	8	9																																								
1205B	Cuando usted vivía con su ex-esposo/compañero, quien tomaba /tomaría la decisión en su casa -- <b>Usted, su ex-esposo/compañero, ambos de acuerdo, u otra persona</b> --sobre lo siguiente?  <b>(LEALE UNO A UNO)</b>																																												

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA			
			Frecuent.	A veces	Nunca	NS
1206	Cuando dos personas se casan o conviven, ellos comparten los buenos y malos momentos. En su relación con su (ex) esposo/compañero, podría decirme si las siguientes situaciones le suceden (sucedian) frecuentemente, a veces, o nunca?	<p>A) A SU (EX) ESPOSO/ COMPAÑERO LE GUSTA PASAR TIEMPO LIBRE CON USTED.....</p> <p>B) SU (EX) ESPOSO/ COMPAÑERO LE CONSULTA SU OPINION EN DIFERENTES TEMAS....</p> <p>C) SU (EX) ESPOSO/ COMPAÑERO ES CARIÑOSO CON UD.....</p> <p>D) SU (EX) ESPOSO/ COMPAÑERO LE RESPETA SUS DERECHOS.....</p>	<p>1 2 3 8</p> <p>1 2 3 8</p> <p>1 2 3 8</p> <p>1 2 3 8</p>			
1207	Algunas veces una esposa/compañera puede hacer cosas que molestan a su esposo/compañero. Por favor, dígame si Ud. cree que un esposo/compañero tiene razón o no tiene razón a pegarle a su esposa/compañera en alguna de las siguientes situaciones:	<p>A) SI ELLA DESCUIDA DE LA CASA O DE LOS NIÑOS.....</p> <p>B) SI ELLA SALE SIN AVISARLE.....</p> <p>C) SI SE NIEGA A TENER RELACIONES SEXUALES CON EL.....</p> <p>D) SI EL SOSPECHA QUE ELLA ANDA CON OTRO.....</p>	<p>Tiene razón</p> <p>No tiene razón</p> <p>NS</p> <p>1 2 9</p> <p>1 2 9</p> <p>1 2 9</p> <p>1 2 9</p>			

1208	<b>AHORA LE QUIERO PREGUNTAR SOBRE ALGUNAS COSAS QUE TAL VEZ HAYAN PASADO ENTRE USTED Y UN COMPAÑERO O EX-COMPAÑERO. ESTO INCLUYE MARIDOS, NOVIOS, PAREJAS, ETC.</b>
------	--

1209	¿Ud. y su esposo/compañero/novio pelean (o peleaban SI NO ESTA UNIDA ACTUALMENTE) algunas veces?	<p>SI ..... 1</p> <p>NO ..... 2</p> <p>NUNCA TUVO NOVIO/PAREJA ..... 3--</p> <p>NO SABE/NO RECUERDA ..... 9</p>	-->1214
1210	¿Su esposo/compañero/novio le ha insultado alguna vez?	<p>SI ..... 1</p> <p>NO ..... 2</p> <p>NO SABE/NO RECUERDA. .... 9</p>	

Nº	PREGUNTAS Y FILTROS	CATEGORIAS Y CODIGOS	PASE A PREGUNTA
1211	¿Su esposo/compañero/novio le ha golpeado alguna vez?	SI..... 1 NO..... 2-- NO SABE/NO RECUERDA. .... 9--	—>1214 └─
1212	La última vez que su esposo/compañero le golpeó, ¿él había tomado alguna bebida alcohólica?	SI..... 1 NO..... 2 NO SABE/NO RECUERDA. .... 9	
1213	¿Cuando su esposo/compañero le golpea (golpeaba) a quién acude (acudía)?	AUTORIDAD (COMISARIA)..... 1 FAMILIAR ..... 2 AMIGA/O ..... 3 VECINA/O..... 4 A NADIE ..... 5 OTRO..... 8	

1214	Hora de finalización de la entrevista	HORA..... [ ][ ] MINUTOS..... [ ][ ]
------	---------------------------------------	---

**AGRADEZCA A LA MUJER POR HABERLE DADO SU TIEMPO, REGRESE A LA PRIMERA PAGINA Y ANOTE EL CODIGO DE RESULTADO. GRACIAS**

**ASEGURESE QUE HA TRANSCRITO LA INFORMACION DE IDENTIFICACION GEOGRAFICA Y MUESTRAL DEL CUESTIONARIO DEL HOGAR AL CUESTIONARIO INDIVIDUAL**

## NOTAS DE ENTREVISTADORA